


21

696

75568

Bind







J-24

QL
696
2558X
Birds

CONSPECTUM AVIUM PICINARUM

EDIDIT

[Carl Jacoby]

CAROLUS J. SUNDEVALL
Custos Musei Zool. Stockholmiensis.



STOCKHOLMIAE 1866.

SAMSON & WALLIN.

STOCKHOLMIÆ, MDCCCLXVI.
P. A. NORSTEDT & FILII.

PRÆMONENDA.

Inter aves, hodie, vix ulla pars melius nobis cognita est quam familia Picorum, quod studio assiduo unius viri præcipue debemus. Clarissimus Malherbe, consul urbis Metz, magnam vitæ partem in cognitionem harum avium impedit; omnes species earum, usque ad 1862 cognitas, vel descriptas, vel in museis europeis asservatas, labore pertinaci lustravit et diligentissime descripsit; omnia synonyma earum collegit et studio critico optime dijudicavit. Vitæ rationem, omnemque harum avium historiam ex natura et ex libris plenissime cognovit; quæ omnia in opere magno: *Monographie des Picidées* (2 voll. fol. reg. c. tabb. color. 121, Metz 1859—62, in fasciculis 24 edito) exposuit. Gravissimum igitur laborem peregit viamque aliis munivit; quo labore monumentum, omni laude majus, sibi condidit.

Opere hoc finito id mihi proposui ut ex illo distributionem harum avium geographicam cognoscerem eamque cum formis, coloribus, vitaque earum compararem. Quod vero, primo experimento, non ex sententia successit. Minus enim hanc rem, quam exactam specierum cognitionem et distinctionem, quæsierat el. auctor, quare cito inveni, species Picorum in ordinem systematicum, paullum mutatum redigendas, easque, in hanc finem, novo studio cognoscendas esse. Simul vero in mentem venit, opus, ceterum egregium, propter molem immanem et pondus voluminum, valde incommodum esse ad usum, et, epitomen ejus, seu expositionem brevem, utilissimam fore, præsertim si ita conscriberetur, ut affinitas specierum melius eluceret et descriptiones earum, etsi minus completæ, differentias tamen specificas evidentius indicarent. Rem igitur aggressus sum ut fieret ejusmodi epitome, quod, ope talis fili ariadnei, facilius erat negotium. Species circiter 100 Picorum, tum in musæo stockholmiensi asservatas, denuo perquisivi et cum opere Malherbiano comparavi; descriptiones reliquarum ex eodem opere excerpti. Multa vero dubia remanserunt, præcipue de forma et affinitate, ideoque de loco systematico Picorum, habitu vel picturâ quadam peculiari insignium, qui non præsto erant. Anno vero sequenti, 1863, mensibus augusti et septembri, itinere instituto, musea ornithologica principalia visitavi: Bremense, Lugdunense, Britannicum, Parisiense, Francofurthanum et Berolinense, quæ omnia mihi summa benevolentia aperta fuere, ubi formas Picorum, mihi incertas vel ignotas, fere omnes inveni, et descriptiones permultas, quantum sufficeret tempus, corrigere potui. Novam igitur redactionem epitomes inceptæ deinde aggressus sum, quam hodie, qualis facta est, in publicum edo.

Interea aliud opus, quodammodo ejusdem naturæ, de Picis editum est: Sectio 2:da Partis 4:æ Musei Heineani a Cabanis et Heine, 1863; quod nuper impressum, Berolini, quum jam redditurus essem, ab altero

auctorum accepi. Hoc opus, ubi species, post opus Malherbei cognitæ, adduntur omnisque synonymia exponitur, perutile mihi fuit; doleo vero nondum completum esse; nam circiter quarta ejus pars, complectens Tribus nostras 12—15, 18, 19, 21, 23 et 4, 26, 29 et 30, adhuc inedita restat. Speramus hanc partem cito divulgatam fore; sed tamen opusculum nostrum non propterea superfluum censemus, quod magis usui tironum adaptatum est. Alterum vero, synonymia copiosissima locupletatum, sed characteribus familiarum generumque carens, multisque speciebus non descriptis, ad usum ornithologorum jam peritorum accommodatus erit.

Pici, etsi genus maxime naturale et ab omnibus aliis bene distinctum constituentes, diu tamen in multa genera minora distributi sunt. Initium divisionis fecerunt Lacepede (*Picooides!*) et Koch ("Dendrocopos", Syst. Bayr. Zool. 1816. Cf. Mus. Hein. Pici p. 30 Not.). Swainson et Boie, 1824—37, genera numerosa considerunt; alii opus continuaverunt; Bonaparte numerum usque ad 60 auxit et in Museo Heineano, 1863, adhuc plura accidunt. In parte hujus operis jam publicata 48 genera enumerantur, unde colligi licet, numerum eorum in opere integro fere ad 70 auctum fore, qui numerus sane magnus appareat. Hoc vero genus, veluti pleraque magna et naturalia, si dividitur, non in subgenera pauca, sed in numerosa, parva, parum distincta, dissolvitur. Sic Psittacus, Cuculus, Bucco, Alcedo, Trochilus, Columba, Strix etc. etc. Ipse Picos in 30 Tribus, quæ vim fere subgenerum habent, divisi, nec in pauciores redigere potui. Si vero Pici in subgenera, nominibus propriis appellanda, distribuendi essent, vix fieri potuit quin multo plura admitterentur; qua de re cf. Synopsin subgenerum infra datam. Subgenera enim 42 ibi exposita, quodammodo naturalia et picturâ formâque distincta, divisioni Picorum satisfacere nobis videntur. Dissectio autem generis, si placet, ad libitum continuari potest, nec ullus est limes. Quælibet enim subdivisio generis, etiam plane artificialis, nomine donari et genus proprium haberri potest, qui mos hodie prævalet.

Hæc vero divisio, dum modum non superat, sæpe utilis est. Diversæ enim generis majoris formæ bene et breviter nominibus propriis designantur. In generibus magnis, ab initio male constitutis, et in iis, quorum subgenera typum generalem minus evidenter exhibent, necessaria est divisio, ut formæ variæ, affines vel alienæ, agnoscantur et rite separantur vel conjugantur; e. gr. in Turdo, Sylvia, Lanio etc. auctorum veterum. In genere quodam magno, sed maxime naturali, e. gr. Pico, divisio utilis est, ut species ejus rite inter se comparentur; sed denominatio sectionum, i. e. fabricatio generum, multo minoris est momenti. Præterea, nomine Pici jam ab antiquis temporibus totum hoc genus, non vero una ejus forma designabatur, ex quo intelligitur dissensio auctorum recentiorum, qua hodie incertum est cuinam subgeneri proprium esset hoc nomen. *Picus* enim Swainsonii typum habet *P. robustum*; *Picus*, Gray List, et Malh., *P. majorem*; *Picus*, Gray Catal., *P. martium*. Koch vero, ante reliquos, Picum proprium habuit *P. viridem*, quem morem sequuntur auctores Mus. Heineani (p. 30, nota). Illud igitur commodum, quod ex usu nominis generalis Pici, omnibus cogniti et nulli dubio obnoxii, capitur, in hoc opusculo dimittere nolui, quare species omnes nomine Pici vocavi.

Malherbe quoque, in magno suo opere, Picos in subgenera distribuit, quæ tamen, quia nimis pauca, (tantum sc. 19) minime naturalia sunt. (Quorum expositionem in indice Malherbiano, his præmonendis suffixo, videas.) Totum vero genus Pici unum atque integrum habet. Negat igitur, duas ejus species eodem nomine speciali designandas esse; nomen enim Pici ante omne nomen speciale intelligendum censem; quam doctrinam adprobavi et adoptavi. Divisiones igitur generis, non vero subgenera nominata, h. l. exposui. — Sed in usum aliorum, præter indicationes generum minorum, suis locis datas, synopsin eorum in fine opusculi subjunxi. Nomina subgenerica omnia in Museo Heineano accepta, eti non omnia hæc subgenera adprobanda censemus, ibi allata sunt, quæ cum correcta et rite formata sint, multis horrendis, hybridis vel barbaris, antiquis datis, sunt præferenda.

In opusculo nostro præterea pauca et præcipue de terminologia sunt observanda.

Pectus hominis est pars corporis, sterno suffulta; i. e. pars ventris, supra (s. ante) abdomen sita. *Pectus* igitur in avibus idem, sive pars corporis inferioris, a pedibus ad extremitatem sterni antican; quæ pars plerumque, nomine haud rejiciendo, "Venter anterior", appellata est. *Venter* igitur anterior idem est ac *pectus*. — Pars vero corporis, ante sternum, ideoque ante *pectus* sita, in avibus sursum adscendens, est *regio gutturalis* s., brevitatis ergo, *guttur*; in quo tres subdivisiones distinguimus: *gulam*, supremam, sub capite sitam; — *jugulum* (s. *guttur medium*), — et *guttur infimum*, (s. *jugulum infimum*), quæ pars sola, sed falso, hucusque *pectus* appellari solita est. — Hæc nostra terminologia non solum cum terminis anatomicis, sed etiam cum notissima illa terminologia, ab Illiger constituta, convenit. In regione gutturali infimo, in Columbis, Gallinis aliisque avibus, situs est *saccus oesophagi* (suet. Kräva. Kroë; germ. Kropf; angl. Crop; gall. Jabot), latine *ingluvies* dicendus, quo vocabulo, pro synonymo *gulæ*, minus bene usus est Illiger. Ex hoc vero *sacco*, cum in plerisque avibus desit, ista regio superficie appellari nequit. — Quid sit *epigastrium avium*, incertum est, etsi plerique hoc verbo pro *guttura infimo* vel *pectore* abutantur. *Epigastrium* hominis est regio abdominis antica, *infra*, s. *pone* sternum sita. *Avium* igitur *epigastrium* inter pedes quærendum, vel idem est ac *venter medius*; sed vocabulum istud in ornithologia potius rejiciendum.

Digitos ex numero ordinis appellamus: *digitus primus* est *hallux*, biarticulatus et proprio internus. *D. secundus* (dig. 2) est anterior, interior, articulis 3 compositus; *d. tertius* est proximus, 4-articulatus, in plerisque avibus *medius*; *d. quartus* est *extimus*, 5-articulatus, in Picis retroversus. *Digiti* 2, 3 et 4 semper a nobis ita appellantur, etiam ubi *primus* (*hallux*) deest (*Struthio* tantum *tertium* *quartumque* habet).

Rectrices in Picis tantum 10 numeramus; parva enim, extima, non est *rectrix vera*, sed *rectrix spuria* s. *accessoria* dicenda. Situ, supra proximam, semper a reliquis differt et potius *tectrix* firmior, perfectius explicata, habenda est. Non comparanda est cum *remige prima*, *spuria*, quæ situm *remigis primæ* semper tenet. Nobis igitur *rectrix extima* semper est extima inter veras, s. *majores* (s. a medio caudæ 5:ta); quod h. l. observasse velim, ne oriatur confusio. Malherbe *rectrices* 12 numerat, quod, in descriptionibus, ambages et sæpe confusionem affert.

Proportio remigum primariarum in Picis vix ullius est momenti ad sectiones definiendas. Plerisque enim penna 4—5 vel 4—6 subæquales et ceteris longiores inveniuntur. Etiam, fere in omnibus, remiges 3—7 v. 8 extus sinuate sunt. Majoris vero momenti interdum est ratio longitudinis primariarum ad cubitales; qua ratione, quia cubitales fere semper sibi similes inveniuntur, longitudine primariarum definiri potest. De qua re conf. divisiones Tribus 1:mæ.

Vocabula: *fascia* et *fasciatus*, semp̄ strias latiores, transversales designant; *stria*, *striatus*, *striolatus*, non ulterius definita, picturam longitudinalē denotant.

Mensuram plerumque nullam aliam, præter longitudinem alæ (a flexura carpi ad apicem) afferimus; quæ sola est in avibus certa et facillime adhibenda; ceteræ omnes fallaces vel difficiliores. Rostrum et tarsus plerumque, in sp. ejusdem generis naturalis, minus differunt, nisi pro ratione corporis; has vero partes, ob limites indefinitas, noui nisi difficilius recte metiri possumus; interdum tamen utiles sunt hæ mensuræ. Cauda paullo magis, quam ala, variat, plerique vero eam summa negligentia metiuntur. Longitudo hujus partis vix nisi uno modo certe haberi potest: ab ostio glandulæ supracaudalis, quæ semper, ut verrucula vel spinula, supra basim rectricum, in cute siccata, etiam per plumas, digito observatur. — *Avium longitudo totalis* inter omnes mensuras maxime fallax. Multum enim variat secundum collum magis minusve inflexum vel extensem, et, in cute siccata, præterea, secundum statum cutis, vel varium ejus præparandi modum. Tamen, in Picis plerisque, et in avibus plerisque, cauda colloque mediocri instructis, longitudine totalis avis mortuæ, libere laxaque in terra vel in mensa jacentis, subæqualis est duplici longitudini alæ.

Utimur solo genere mensuræ scientificæ totique mundo communis systemate metrico, *millimetris* expresso, quæ subdivisionibus non egent. Pedes, pollices et linea singularum gentium nimis differunt, nec nisi difficilius comparantur.

Quo facilior sit recognitio operis malherbiani et aditus ad descriptiones ejus maxime completas, indicem ejus h. l. subjungimus, qualis in illo opere, II, 297—301, invenitur, additis tamen indicationibus iconum, patriæ et numeri cuiusque speciei in opusculo nostro. Sectiones ab auctore acceptas, literis *a*, *b* etc. signavimus; nomina vero specierum, quas ille incertas, dubias vel spurias habet, sed tamen, in suo opere, haud aliter ac species bene cognitas et distinctas descripsit, parenthesi dimidia præcludimus; e. gr. (atratus, I, 72.

Index operis Malherbel.

	PICUS.	Malh. Vol. I.	Patria.	Conspl. nostri:	
1 (MEGAPICUS Malh.)					
a)	imperialis	Vol. I pag. 2	tab. 1	Am. sept. mo 1	
	principalis	— 4	— 1	” . 2	
b)	magellanicus	— 8	— 2	merid. . 3	
c)	boiei	— 10	— 3	trop. . 9	
	grayi	— 13	— 5	” . 8	
	malherbi	— 15	— 6	” . 5	
	albirostris	— 17	— 4	” . 4	
	guatimalensis	— 19	— 7	” . 6	
	scateri	— 22	— 35	” . 7	
	robustus	— 23	— 3	” . 11	
	rubricollis	— 25	— 8	” . 10	
	trachelopyrus	— 26	— ”	” . 10 b	
	haematoxaster	— 27	— 9	” . 12	
	validus	— 28	— ”	As. mer. . 13	
2 (DRYOPICUS Malh.)					
a)	martius	1 pag. 31	— 10	Eur. . 22	
b)	pileatus	— 34	— 11	Am. sept. . 18	
	galeatus	— 38	— ”	trop. . 17	
	lineatus	— 39	— 12	” . 14	
	fuscipennis	pag. {165 et} 186	tab. 61	” . 15	
	erythrops	pag. 42	tab. 12	” . 16	
c)	scapularis	— 44	— 10	” . 14 b	
	leucogaster	— 47	— 13	As. mér. . 19	
	hodgsonii	— 49	— ”	” . 20	
	gutturalis	— 51	— 15	” . 23	
	fulvus	— 53	— 14	” . 24	
	funebris	— 54	— 15	” . 25	
3 (Picus prop. Mh.)					
a)	major	I pag. 56	— 16	Eur. As. . 53	
	cabanisi	— 60	— 17	As. med. . 57	
	mandarinus	— 61	— ”	” . 56	
	gouldii	— 62	— ”	” . 55	
	luciani	— 63	— ”	l. inc. . 54	
	numidicus	— 65	— 18	Afr. sept. . 58	
	himalayensis	— 67	— 19	As. med. . 59	
	assimilis	— 69	— ”	” . 60	
	majoroides	— 70	— 16	” . 62	
	(atratus	sp. dubia	— 72	— 0	” . 67
	(scindeanus	sp. inc.	— 73	— 0	” . 60 b
	harrisii	— ”	— 20	Am. sept. . 42	
	villosus	— 75	— 21	” . 41	
	(canadensis = præc.	— 78	— ”	” . 41 var.	
	(martini = id.	— 82	— 22	” . sub 41	
	(phillipsii = id.	— 84	— 21	” . ” .	
	(euvieri	sp. dubia	— 85	— 22	” . 41 var.
	(auduboni	” . ”	— 87	— ”	sub 41
	(undosus	” . ”	{89 et} {185}	— 0	” . 39 nota

(Picus propr. contin.)		Malherbe.	Patria.	Cons. nostri
— leuconotus.....	I pag. 89	tab. 23	Eur.	n:o 65
— uralensis.....	— 92	— "	As. sept.	. 66
— medius.....	— 93	— 20	Eur.	. 88
— syriacus.....	— 95	— "	As. med.	. 61
— macei.....	— 96	— 24	— mer.	. 68
— analis.....	— 99	— "	— "	. 69
— nuttalli.....	— 100	— "	Am. sept.	. 47
— ? lucasanus.....	— 166	— 0	—	. 47 b
— cactorum.....	— 102	— 25	— trop.	. 94
— jardini.....	— 103	— "	— sept.	. 43
— cathphorius.....	— 104	— 22	As. med.	. 63
— marattensis.....	— 105	— 24	— mer.	. 91
— brunnifrons.....	— 107	— 18	— "	. 89
— stricklandi.....	— 108	— 28	Am. sept.	. 48
— lignarius.....	— 109	— 26	" Amer.	. 49
— waglerii.....	— 112	— 29	" trop.	. 51
— minor.....	— 113	— 26	Eur.; Alg.	. 71
— kamtschatkensis.....	— 115	— "	As. sept.	. 72
— scalaris.....	— 116	— 27	Am. sept.	. 46
— (bairdi..... var. pr:s.....	— 118	— "	—	. 46 b
— pubescens.....	— 119	— 29	— "	. 44
— (leucurus..... sp. dubia.....	— 122	— 0	— "	. 45 d
— (medianus..... var.....	— "	— 0	— "	sub 44
— (gairdneri..... "	— 123	— 0	— "	. 45
— (meridionalis..... "	— 124	— 0	— "	sub 44
— (turati..... sp. dubia.....	— 125	— 29	— "	. 45 c
— feliciae.....	— 127	— 28	As. med.	. 61 b
— callonotus.....	— 129	— 30	Am. trop.	. 99
b) — hyperythrus.....	— 130	— "	As. med.	. 90
— ruber.....	— 132	— 31	Am. sept.	. 97
c) — querulus.....	— 134	— "	— "	. 52
— borealis..... var. pr:s.....	— 136	— 0	" "	sub 52
— bicolor.....	— 137	— 4	" trop.	. 50
— variegatus.....	— 139	— 33	As. mer.	. 84
— (freniger = præc.....	— 141	— 0	— "	sub 83
— (canicapillus..... sp. dubia.....	— "	— 0	— "	. 84 b
— mitchelli.....	— 142	— 32	— "	. 77
— moluccensis.....	— 143	— 32	— "	. 85
— nanus.....	— 145	— 33	— "	. 83
— pygmæus.....	— 147	— 34	— "	. 78
— semicoronatus.....	— 148	— "	— "	. 76
— auritus.....	— 150	— 35	— "	. 74
— meniscus.....	— 151	— "	— "	. 81
— otarius.....	— 152	— "	— "	sub 83
— (gymnophthalmus.....	— 153	— 0	— "	. 82
— kisuki.....	— 154	— 36	med.	. 80
— temminckii.....	— 155	— "	mer.	. 86

4 (SPHYRAPICUS.)

— varius.....	I pag. 157	— 37	Am. sept.	. 98
— thyroideus.....	— 162	— "	" "	. 95
— williamsoni.....	— 163	— 36	" "	. 96

5 (PICOIDES La C.)

— europeus.....	I pag. 170	— 38	Eur.	. 36
— arcticus.....	— 175	— 39	Am. sept.	. 40
— americanus.....	— 176	— "	— "	. 39
— dorsalis.....	— 179	— 0	— "	. 38
— crissoleucus.....	— 180	— 40	As. sept.	. 37
— lecontii.....	— 182	— "	Am. sept.	sub 44
(Sp. spuriae).....	— 184	— 0		. 39 nota

INDEX OPERIS MALHERBEI.

IX

		Malherbe.	Patria.	Conspl. nostri
6 (MICROPICUS.)				
— concretus.....	I pag. 187	tab. 41	As. mer.	n:o 26 b
— hartlaubi.....	— 189	— "	— "	. 26
— canente.....	— 190	— 42	— "	. 27
7 (DENDROPICUS.)				
— biarmicus.....	I pag. 193	— 42	Afr. mer.	. 122
— schoensis.....	— 195	— "	— or.	. 123
— fulviscapus.....	— 196	— 43 bis	— mer.	. 124
— hemprichi.....	— 194	— 43	— or.	. 126
— hartlaubi.....	— 201	— 44	— "	. 125
— desmursi.....	— 202	— 42	— "	. 129
— lafresnayi.....	— 204	— 44	— occ.	. 127
— (africanus..... sp. inc.)	— 205	— 0	—	. 123 b
— obsoletus.....	— 206	— 45	— or.	. 92
— minutus.....	— 208	— "	— occ.	. 130
8 (PHAIOPICUS.)				
a) — rufinotus.....	Vol. II pag. 1	tab. 46	As. mer.	n:o 246
— jerdoni.....	— 3	— 47	— "	. 247
— brachyurus.....	— 5	— 46	— "	. 248
— badiosus.....	— 6	— 0	— "	. 251
— (sordidus..... sp. dubia.....)	— 8	— 0	— "	sp. inc. 5
— pectoralis.....	— "	— 47	— "	post. 253
b) — tristis.....	— 10	— 48	— "	. 254
— jugularis.....	— 11	— 0	— "	sp. inc. 4
— grammithorax.....	— 12	— 48	— "	. 254 b
9 (CELEOPICUS.)				
a) — rufus.....	II pag. 13	— 50	Am. trop.	. 242
— verreauxi.....	— 14	— 51	— "	. 240
— fraseri.....	— 16	— 43bis	— "	sub 244
— multifasciatus.....	— "	— 50	— "	. 243
— (loricatus = præc.)	— 18	— 0	— "	. 244
— grammicus.....	— "	— 51	— "	. 241
— lugubris.....	— 19	— 54	— "	. 233
— flavescentis.....	— 21	— 53	— "	. 232
— ochraceus.....	— 23	— 54	— "	. 234
— (flavicolli..... sp. inc.)	— 24	— 0	— "	post 245
— castaneus.....	— 25	— 50	— "	. 239
— (semicinnam. sp. inc.)	— 26	— 0	— "	sub 238
— jumana.....	— 27	— 55	— "	. 237
— reichenbachi.....	— 28	— 56	— "	. 236
— (smaragdinicollis sp. compos.)	— 30	— 0	— "	. "
— exalbidus.....	— 30	— 55	— "	. 238
— cinnamomeus.....	— 32	— 56	— "	. 235
b) — multicolor.....	— 34	— 52	— "	. 231
— tinnunculus.....	— 36	— "	— "	. 230
c) — pyrrhotis.....	— 37	— 49	As. mer.	. 134
— porphyromelas.....	— 39	— "	— "	. 135
10 (MESOPICUS.)				
a) — pyrrhogaster.....	II pag. 41	— 58	Afr. occ.	. 131
— capensis.....	— 42	— 62	— mer.	. 132
— goertae.....	— 45	— 63	— occ.	. 133
— (immaculatus = pr.)	— 47	— 0	— "	sub 132
— (poicephalus = id.)	— 48	— 0	— "	sub 133
— spodocephalus.....	— 49	— 63	— or.	. 133 a
b) — fumigatus.....	— 51	— 57	Am. trop.	. 103
— caboti.....	— 53	— "	— "	. 104
— oleagineus.....	— 54	— "	— "	. 102
— kirtlandi.....	— "	— 58	— "	. 114
— cassini.....	— 55	— "	— "	. 113
— affinis.....	— 56	— 61	— "	. 109

(Mesopicus contin.)	Malherbe.	Patria.	Cons. nostri
—? <i>tænionotus</i> II pag. 58 tab. 0	Am. trop.	n:o	116
— <i>passerinus</i> — 59 — 62	— "		115
— <i>spilogaster</i> — 62 — 0	— "		121
— <i>murinus</i> — " — 58	— "		119
— <i>adspersus</i> — 64 — 60	— "		121
— <i>olivinus</i> — 65 — 59	— "		118
— <i>selysi</i> — 67 — 62	— "		110
— <i>nigriceps</i> — 68 — 59	— "		120
— <i>kirkii</i> — 70 — "	— "		106
— <i>ceciliae</i> — 71 — 60	— "		107
— <i>hæmatostigma</i> — 72 — 61	— "		111
— <i>sanguineus</i> — 74 — 60	— "		105
— <i>sanguinolentus</i> — 76 — 43 bis	— "		100
11 (INDOPICUS.)			
— <i>sultaneus</i> II pag. 77 — 64	As. mer.		219
— <i>delesserti</i> — 79 — "	— "		"
— <i>strictus</i> — 80 — 65	— "		b
— <i>goensis</i> — 82 — 66	— "		223
— <i>hæmatribon</i> — 84 — 68	— "		221
— <i>philippinarum</i> — 85 — 66	— "		220
— <i>carlotta</i> — 87 — 67	— "		222
12 (BRAHMAPICUS.)			
— <i>erythronotus</i> II pag. 90 — 69	As. mer.		227
— <i>puncticollis</i> — 92 — 70	— "		226
— <i>bengalensis</i> — 93 — 69	— "		224
13 (CHLOROPICOIDES.)			
a) — <i>tiga</i> II pag. 97 — 71	As. mer.		228
— <i>intermedius</i> — 99 — 0	— "		" b
— <i>rubropygialis</i> — 100 — 70	— "		" c
— <i>shorii</i> — 101 — 71	— "		229
b) — <i>rafflesii</i> — 102 — 72	— "		165
c) — <i>grantii</i> — 104 — 72	— "		136
14 (CHLOROPICUS.)			
a) — <i>flavinucha</i> II pag. 106 — 73	As. mer.		166
— <i>chlorolophus</i> — 108 — 74	— "		169
— <i>puniceus</i> — 110 — 74	— "		168
— <i>mentalis</i> — 112 — 75	— "		167
— <i>xanthoderus</i> — 114 — "	— "		170
— <i>miniatius</i> — 116 — 76	— "		171
b) — <i>viridis</i> — 118 — 79	Eur.		175
— <i>vaillantii</i> — 122 — 82	Algier.		177
— <i>canus</i> — {124 et} tab. 81	Eur. As. sept.		181
— <i>(karelini)</i> sp. <i>dubia</i> — 126 tab. 0			181
— <i>guerinii</i> — 127 — 80	As. med.		180
— <i>avokera</i> — 128 — "	— mer.		176
— <i>occipitalis</i> — 129 — 77	— "		178
— <i>squamatus</i> — 131 — 78	— "		173
— <i>dimidiatus</i> — 133 — 76	— "		172
— <i>striolatus</i> — 134 — 77	— "		174
c) — <i>polyzonus</i> — 136 — 83	Am. trop.		31
— <i>aurulentus</i> — 137 — 84	— "		28
— <i>capistratus</i> — 140 — 83	— "		32
— <i>chryschloris</i> — 141 — 84	— "		30
— <i>erythropsis</i> — 143 — 87	— "		33
— <i>chlorocephalus</i> — 144 — 86	— "		34
— <i>leucolæmus</i> — 145 — 85	— "		35
d) — <i>percussus</i> — 147 — 86	— "		138

15 (CHRYSOPICUS.)

		Malherbe.	Patria.	Consp. nostri
a)	— gabonensis	II pag. 149 tab. 91	Afr. occ.	n:o 184
	— nivatus	— 151 — 92	— " .	164
	— brachyrhynchus	— 152 — 91	— " .	182
b)	— chrysurus	— 153 — 94	— mer.	188
	— maculosus	— 156 — 92	— occ.	183
	— caroli	— 157 — 91	— occ.	163
c)	— nubicus	— 159 — 93	— or.	192
	— æthiopicus	— " — 94		
	— notatus	— 162 — 95	— mer.	191
	— punctuligerus	— 164 — 92	— occ.	193
	— variolosus	— 165 — 95	— mer.	186
	— calliaudi	— 167 — 0	— " .	sub 188
	— capricorni	— 169 — 0	— " .	187
	— brucei	— 170 — 93	— " .	190
d)	— aeruginosus	— 171 — 90	Am. trop.	199
	— canipileus	— 173 — "	— " .	196
	— rubiginosus	— 174 — 89	— " .	197
	— perspicillatus	— 176 — 114	— " .	post 199
e)	— atricollis	— 178 — 88	— " .	213
	— cayannensis	— 179 — 87	— " .	205
	(guttifer)	— 181 — 0	— " .	207
	— icteromelas	— 182 — 88	— " .	208
	— chlorozostus	— 184 — 84 bis	— " .	211
	— melanoleucus	— 185 — 89	— " .	212
	— melanochlorus	— 187 — 84 bis	— " .	210
	— chrysomelas	— 189 — 89	— " .	209

16 (MELAMPICUS.)

a)	— dominicanus	II pag. 217 — 101	Am. trop.	189
b)	— erythrocephalus	— 209 — 97	— sept.	140
	— portoricensis	— 205 — "	— trop.	141
	— formicivorus	— 199 — 99	— sept.	145
	— flavigula	— 202 — "	— trop.	146
	— xantholarynx	— 204 — 100	— ?	147
	— torquatus	— 214 — 96	— sept.	148
c)	— hirundinaceus	— 192 — 98	— trop.	143
	(meropirostris = pr.)	— 197 — 0	— " .	—
	(melanocephalus =)	— 195 — 0	— " .	—
	— rubrifrons	— 196 — 98	— " .	142
d)	— flavifrons	— 207 — 100	— " .	144
	— herminieri	— 198 — "	— " .	149

17 (XENOPICUS.)

—	albolarvatus	II pag. 221 — 101	Am. sept.	87
---	--------------------	-------------------	-----------	----

18 (ZEBRAPICUS.)

a)	— superciliaris	II pag. 223 — 102	Am. trop.	161
	— elegans	— 225 — "	— " .	160
	— pucherani	— 227 — 103	— " .	162
	— hypopolius	— 228 — "	— " .	159
	(gerini)	— 231 — 0	— " .	162
b)	— striatus	— " — 107	— " .	150
	— carolinus	— 234 — 103	— sept.	155
	— radiolatus	— 237 — 104	— trop.	151
	— aurifrons	— 240 — "	— " .	153
	— santa cruzi	— 241 — 105	— " .	sub 152
	— erythrophthalmus	— 243 — "	— " .	152
	— kaupii	— 245 — 106	— " .	156
	— tricolor	— 247 — "	— " .	158
	— rubriventris	— 248 — 107	— " .	sub 158
	(aurocapillus)	— 250 — 0	— " .	post 162

19 (GEOPICUS.)		Malherbe.	Patria.	Coussp. nostri
a) — campestris.....	II pag. 251	tab. 188	Am. trop.	n:o 214
— agricola	— 254	— "	— austr.	. 215
— auratus	— 255	— 109	— sept.	. 201
— ayresii	— 260	— 0	— "	. 201 b
— chrysoides	— 261	— 109	— "	. 202
— mexicanus	— 262	— 110	— "	. 203
— rubicatus	— 265	— "	— "	. 204
— rivolii	— 267	— 112	— trop.	. 200
— chilensis	— 269	— 111	— austr.	. 217
— rupicola	— 271	— 113	— trop.	. 216
— fernandinæ	— 273	— "	— "	. 218
b) — arator	— 274	— 111	Afr. mer.	. 195

S:a 277 nomina, quorum 246 sp. bene cognitas et 31 sp. incertas vel spurias designant.

Distributio Picorum Geographica.

Hæc partim ex ipsa expositione speciali appetet. Dispositio enim systematica plerumque cum geographicā congruit. Subdivisiones (vel si mavis, subgenera) Picorum insipientes, mox animadvertisimus, omnes species cujusque divisionis, ubi plures adsunt, non solum inter se ita similes esse, ut plerunque vix nisi varietates unius appareant, sed etiam, omnes unam regionem terrae naturalem inhabitare, ubi facilius ab uno loco ad alterum migrare potuerint. Observamus etiam, illas præsertim species paullo magis a typis differre, quæ ad limites regionis inveniuntur. Si vero eadem forma subgenerica in regionibus diversis bene distinctis, invenitur, species cujusque regionis notâ quadam peculiari et constanti, saepius vero levissima, differunt. — Sic Pici nigrovirii (Tribus nostra 5:ta) americanî constanter a sp. veteris orbis dignoscuntur, quod characteribus divisionum indicavimus: sp. tridactylæ veteris orbis rectrices utrinque duas, americanæ utrinque tres, albovarias habent. Sp. tetracactylæ majores veteris orbis abdomine rubro ab americanis differunt. Sp. utriusque orbis meridionalès in genere parvæ, plerumque fuscantes sunt; maxime vero meridionales rectrices medias albomaculatas habent (de quibus, cf. divisiones Tribus 4:ta). — *Picus major* æque in Asia media et septentrionali ac in Europa invenitur; sed reliquæ species (vel varietates) ejusdem divisionis regiones minores, ad ambitum territorii magni sitas, inhabitant: ut Chinam, Himalayam, Persiam, Syriam, Africam septentrionalem (*P. syriacus* et sp. ei affines in his numerantur). Eodem modo, in America septentrionali *P. villosus* et *P. pubescens*, per plures formas maxime affines, vel vix distinctas, in Mexico et California representari videntur.

Pleræque Tribus Picorum non nisi unam partem telluris principalem inhabitant; tantummodo Tribus nostræ 1, 5 et 6 in duabus simul inveniuntur, sc. America septentrionali et Europa cum Asia. Aves autem harum regionum formâ vel picturâ paullum diversâ dignoscuntur. Differentiae tamen inter Picos Americanos et Picos veteris orbis harum Trium minores sunt, quam quæ Tribus diversas designarent.

Quia igitur Tribus pleræque non nisi unam partem telluris principalem inhabitant, necesse accidit, ut aliae regiones alias Tribus Picorum contineant et ut Pici ejusdem regionis plerumque ipso habitu agnoscantur; distributio vero Tribuum in tabula suffixa apparet. Videmus quoque partes telluris principales, secundum distributionem Picorum, easdem esse, quas in plerisque disquisitionibus zoologico-geographicis invenire solemus. Hæ vero sunt:

1:o. America tota; quam primam nuncupamus, quia ceteras regiones numero Picorum longe antecellit. Praeter Tribus tres, americanæ cum regione secunda communæ, hæ unice americanæ sunt: Tr. 4, 7, 12, 13, 14, 15, 22—26 et 29. Species vero ibi cognitæ sunt 132.

2:o. Regio Europæo-Asiatica, seu terra continens cum insulis sundicis et Africa maxime septentrionali. Hic enim tractus s. Numidia et Mauretania, hodie Tunis, Algier et Marocco, tota sua natura, ab Africa reliqua differt. Pici species 3, ibi inventæ, affines sunt europæis: *P. minor*, idem ac europæus; *P. numidicus*, maxime affinis *P. majori*, et *P. algirus*, medius inter *P. viridem* et *P. canum*. Regioni Europæo-Asiaticæ, maximæ omnium, præter specias numerosas Tribuum 1, 5 et 6, hæ Tribus integræ peculiares sunt: 2, 3, 10, 11, 17, 18, 19, 27, 28, 30; ibi vero species 90 hue usque numerantur.

3:o. Africa propria, a desertis magnis meridiem versus sita, formas Picorum sibi peculiares tantummodo continent. Hæ vero sunt: sp. 2 anomalaæ Tribus 6:tæ, Tribusq. 8, 9, 16, 20 et 21 totæ. Species ibi cognitæ sunt 32.

4:o et 5:o. Madagascar et Australiæ (cum insulis moluccanis et Polynesia) Picis omnino carent.

Regio hyperborea, ultra limites arborum et silvæ (cum Groenlandia et Islandia) Picos nullos alere potest; sed in regione silvatica boreali Pici adsunt ejusdem formæ, ac ii qui in eodem continentí vigent. Pici autem nigroværii, veteris orbis et americanæ, ceteros, septentriones versus, numero excedunt. Ibi sp. tridactylæ seriem parvam circumpolarem, qualem *Lagopus*, *Canis lagopus*, *Tarandus*, his tamen magis meridionalem constituant. In Europa *Picus minor* et *P. tridactylus* in ultimis fere silvis, circa 70° lat:s inveniuntur; in Asia et America Pici ut videtur nulli ultra 60—62° cogniti sunt.

Subdivisiones regionum telluris principalium, præsertim secundum climata, indicatae sunt habitatione diversarum Picorum Tribuum sectionum; limites tamen minus definiti sunt et pro variis Tribubus variant. Tamen, in *America* regio septentrionalis distingui potest, quæ nullam formam habet peculiarem, sed species plures insigniores Tribuum plurium: *P. principale*, *pileatum*, sp. *nigrovaryas* 3dactylas, *P. villosum* et pubescens, *P. varium*, *carolinum*, *erythrocephalum*, *auratum*; quorum tamen plerique septentriones versus non longè procedunt. Regioni mexicanæ peculiares sunt multi Pici nigroværii parvi et fere omnes Pici albofasciati. Regio meridionalis tropica insignior est Picis passeriniis, flavifasciatis, fulvicristatis et ceteris, Regio campestris maxime meridionalis præsertim paucitate Picorum et sp. campestribus a reliquis differt.

In regione Europæo Asiatica, tota pars septentrionalis et media unam subdivisionem geographicam componit, subtribubus Pici majoris et Pici viridis insignem; Asia meridionalis alteram constituit,


Picis brevicaudatis, flavinuchalibus, sultaneis, europalliatis et acutirostribus definitam. Tertia pars hujus regionis est Africa septemtrionalis, de qua nuper locuti sumus.

Africa propria, secundum Picos, vix in regiones minores dividi potest.

Synopsis distributionis Picorum geographicæ.

		Numerus sp. in		
		Amer.	Eur.—As.	Afr. pr.
Series 1. <i>Angusticolles</i> (35 sp.)				
Tribus 1 principales.....	sp. 22			
— Sectio prior	12	1		.
— — posterior	5	4		.
Tr. 2 squamicipes	Ind. sp. 3	.	3	.
Tr. 3 parvicaudati	id. " 2	.	2	.
Tr. 4 auricipites	trop. " 8	25	10	0
Series 2. <i>Securirostres</i> (103 sp.)				
Tr. 5 nigrovarii	sp. 52			
Sect. 1 tridactyli	3	2		.
— 2 et 3 tetradact. albiventres	12	34		.
— 4 nigriventres	1	.		.
Tr. 6 intermedii	sp. 11	5	4	2
Tr. 7 passerini	trop. " 23	23	.	.
Tr. 8 fulviscapi	" 9	.	.	9
Tr. 9 menstrui	" 3	.	.	3
Tr. 10 fuscorubidi	Ind. " 2	.	2	.
Tr. 11 debilipedes	id. " 2	.	2	.
Tr. 12 subvirides	Cuba " 1	45	44	14
Series 3. <i>Ligonirostres</i> (80 sp.)				
Tr. 13 dominicanus	trop. sp. 1	1	.	.
Tr. 14 nigropicti	(trop.) " 10	10	.	.
Tr. 15 albofasciati	(Mexic.) " 12	12	.	
Tr. 16 guttiventres	occid. " 2	.		2
Tr. 17 mesospili	Ind. " 1	.	1	.
Tr. 18 flavinuchales	Ind. " 7	.	7	.
Tr. 19 virides	(temp.) " 8	.	8	.
Tr. 20 chrysuri	" 15	.	.	15
Tr. 21 arator	" 1	.	.	1
Tr. 22 canipilei	trop. " 4	4	.	.
Tr. 23 rivolii	" 1	1	.	.
Tr. 24 aurati	(septemir.) " 4	4	.	.
Tr. 25 flavifasciati	trop. " 9	9	.	.
Tr. 26 campestres	" 5	46	16	18
Series 4. <i>Nudinares</i> (36 sp.)				
Tr. 27 sultanei	Ind. sp. 5	.	5	.
Tr. 28 europalliati	" 6	.	6	.
Tr. 29 fulvicristati	trop. " 16	16	.	.
Tr. 30 acutirostres	Ind. " 9	16	9 20	0
S:a sp. cogn.		254	132	90
				32





CONSPECTUS PICORUM.

Familia naturalis

A V E S P I C I N A E

digito qvarco definite retroverso; basi linguæ longissime extensili.

Rostrum minus crassum, rectum, vel non nisi levissime arcuatum, apice acuto, vel plerumque cuneato, non deflexo; maxillis æqualibus.

Lingua ipsa perparva: plana, brevissima, angusta, acuta, subcornea, hamulis retroversis, tenuissimis armata. Basis vero linguæ, in statu retracto, cylindrum brevem exhibens, cornibus hyoïdeis longissimis, tenuibus, multiarticulatis composita. Hæc vero cornua, inter cutem et cranium, ad latera occipitis in verticem adscendunt et in multis Picis usque ad basim rostri extendentur, semper vero magis minusve oblique procedunt. Ope tegminis muscularis et cutis oris extensilis, basis linguae extra rostrum longissime exseri potest, cornua descripta retrahendo. — Hæc structura Picariis peculiaris; nam in Trochilis, Nectariniis pluribusque, non solum basis extensilis, sed ipsa lingua elongata, vario modo formata.

Rectrices 10, æquales, vel mediae gradatim, paullo longiores. — Accedunt vero plumæ duæ, rectricibus similes, sed minimæ, rectrices spuriae dicendæ potiusque tectrices firmiores habendæ: supra basim rectricum lateralium impositæ.

Genera tria principalia hoc referenda: *Picus*, cauda elastica, acuta; *Picumnus*, cauda molli, brevissima, et *Iynx*, cauda molli, mediocri, obtusa.

Genus I. PICUS L.

a reliquis differt rectricibus firmioribus, gradatis, acutis, scapo crasso, forti, elastico insignibus.

Synopsis subdivisionum generis:

Series 1 *Angusticolles*:

collo angusto, elongato; naribus setis tectis. (Rectrices nigræ vel fuscescentes, immaculatae).

Tribus 1 *Principales*: rostro valido, carinis nasalibus altis, late inter se distantibus; cauda elongata. Majores, colore principaliter nigro. Sp. 1—22.

Tr. 2 *Squamicipites*: rostro valido, carinis nasalibus obsoletis, prope culmen sitis; plumis capitis collique brevissimis, rigidis. Majores colore nigricantes. Sp. 23—25.

Tr. 3 *Parvicaudati*: rostro forti, carinis fere ut in Tr. 6ta formatis; cauda brevi, obtusiore. Parvi, fuscescentes. Sp. 26—27.

Tr. 4 *Auricipites*: rostro breviore, carinis altis, minus distantibus. Sp. minores, colore virentes, capite praesertim flavo vel rubropicto.

Series 2 *Securirostres*

collo non angustato; naribus setis tectis; rostro valido, cuneato, carinis nasalibus inter se latissime distantibus.

Tr. 5 *Nigrovarii*: nigri, albovarii, rostro fortissimo, non compresso, lateribus apicis bicarinatis. Sp. mediae vel minores, interdum fuscescentes, non virescentes. 30—87.

Tr. 6 *Intermedii*: similes praecedentibus, rostro paullo debiliore, medio compresso, lateribus apicis vix carinatis. Sp. 88—98.

Tr. 7 *Passerini*: parvi, virentes vel rubri, rostro breviore, sed forti et ut in praecedentibus formato. Sp. 99—121.

Tr. 8. *Fulviscapi*: minores vel medii, fuscescentes, maculati, scapis remigum et rectricum flavis. Sp. 122—130.

Tr. 9 *Menstrui*: virentes, ventre medio longitudinaliter rubro vel flavidio. Sp. subminores, 131—133.

Tr. 10 *Fuscorubidi*: submajores, fuscescentes, sordidius rubropicti. Sp. 134—5.

Tr. 11 *Debilipedes*: sp. mediae, fuscovirentes, paullum rubidopicti, pedibus tridactylis, minoribus. Sp. 136—7.

Tr. 12 *Subvirides*: medii, purius virides, tetradactyli. Sp. 138 sola. — Obs. haec tribus et 2 praecedentes habitu et pictura caudae similes sunt *Picis viridibus* (Tr. 19) eisque affinibus; differunt carinis rostri.

Series 3 *Ligonirostres*

collo non angustato; naribus tectis. Rostri carinae nasales juxta culmen sitae (vel saltem culmini quam tomiis propiores); plerumque antice obsoletae.

*) Americani, scapis fuscis.

Tr. 13 *Dominicani*: medii, nigri et albi, non fasciati; carinis rostri latius distantibus. Sp. 139.

Tr. 14 *Nigropicti*: subminores, nigri, rubro vel flavo alboque picti. Sp. 140—149.

Tr. 15 *Albofasciati*: subminores, superne albido nigroque fasciati. Sp. 150—161.

Tr. 16 *Guttiventres*: minores, fuscovirides, subtus alboguttati. Sp. 162 et 3.

**) Veteris orbis, scapis fuscis.

Tr. 17 *Mesospili*: sp. mediae magnit:s, virens, pedibus 3-dactylis; cauda tota nigra; maculis remigum perpaucis albis, non marginalibus. Sp. 164.

Tr. 18 *Flavinuchales*: medii, virides vel rubro tincti, crista occipitis rubra vel virente, cerycicis flava. Sp. 165—171.

Tr. 19 *Virides*: majores, non cristati, virides (vel canescentes), uropygio flavescente. Sp. 172—9.

***) *Flaviscapi* veteris orbis.

Tr. 20 *Chrysuri*: minores vel medii, virentes, gastræo nigrovario; cauda obsoletius vel vix fasciata. Sp. 180—194.

Tr. 21 *Aratores*: sp. cognita fuscescens, tergo ventreque rubro indutis; rostro longiore, leviter curvato, apice obtuso. Sp. 195.

****) *Flaviscapi* americanæ.

Tr. 22 *Canipilei*: minores, fuscolutescentes, pileo fuscocinereo; (plerumque) postice late rubro. Sp. 196—9. — (*Simillimi Chrysuris*, sect. 1).

Tr. 23 *Rivolii*: sp. cogn. submajor, dorso alisque rubris, gutture infimo squamoso-picto; rostro longiore. Sp. 200.

Tr. 24 *Aurati*: grisecentes capite fere concolore, uropygio albo, fascia antepectorali maculisque corporis nigris. Rectrices superne nigræ, subtus, fere ad $\frac{3}{4}$, flavæ vel rubræ, scapo concolore. Sp. 201—4.

Tr. 25 *Flavifasciati*: medii, nigri, flavifasciati, pileo utriusque sexus nigro, postice late rubro; rostro subbreviore, cuneato. Sp. 205—13.

Tr. 26 *Campestres*: majores, superne nigricantes, albido-fasciati, uropygio albido; rostro longiore, sœpe obtuso. Sp. 214—18.

Series 4 *Nudinares*.

Nares apertæ, plumis setosis carentes. Collum et rostrum varia.

Tribus 27 *Sultanei*: majores, cristati, superne luteo vel rubro nitentes, rostro valido, superne recto, apice cuneato, carinis nasalibus late distantibus. Sp. 219—23.

Tr. 28 *Auropallati*: medii, cristati, superne luteo vel rubro nitentes, rostro debiliore, culmine subcurvato, carinis prope culmen sitis. Digitus 1 perparvus vel nullus. Sp. 224—9.

Tr. 29 *Fulvicristati*: medii, flavo vel rufo et nigro-picti; pileo flavo, fulvo vel rufescente, plumis longis, firmioribus cristato. Rostrum apice plus minusve cuneatum; digitus 4 tertio brevior. Sp. 230—45.

Tr. 30 *Acutirostres*: minores, rufi vel fusci, crista brevi, occipitali; rostro brevi, convexo, apice acuto! carinis obsoletis. Digitus 4:us tertio subæqualis vel longior; hallux plerisque minutus. Sp. 246—254.

PICI SPECIES.

Series 1. Pici Angusticolles

plumis colli brevibus, adpressis (quare collum angustum et elongatum apparet). Nares setis densis tectæ. Rostrum semper forte, rectum, apice cuneatum.

TRIBUS 1. Pici principales

rostro capiti æquali vel longiori, valido, carinis nasalibus inter se late distantibus, altis, acutis: — Sp. magnæ vel maximæ, nigræ, plerumque albo et, in capite, rubro-pictæ. Cauda longior (circiter $\frac{2}{3}$ alæ æqualis), nigra, unicolor, pennis valde gradatis, apice elongato instructis. Ala quoque magna. Furca menti longius ante nares, non vero ante medium suturæ, desinit.

Sectio Prior. Digitus quartus tertio multo longior. Rostrum validius, carinis nasalibus latissime distantibus; furca menti vix ante $\frac{1}{3}$ suturæ extensa. — Genus *Campophilus* Gray, Agass.; — *Megapicus!* Malh. (correctius *Megalopipo*); — species hodie in multa genera distributæ, quæ v. infra.

1:o. SPECIES AMERICANÆ
crista occipitis (plerumque) rubra, acuta. Cauda non brevior quam $\frac{2}{3}$ alæ.

a) Sp. maximæ, alis longis præditæ: penna cubiti prima $\frac{3}{4}$ alæ non excedit. Rostrum crassum, capite multo longius. Venter omnium niger. (Pleræque extra-tropicæ).

1. *PICUS imperialis* Gould Z. Proc. 1832, 140; — Malh. Mon. Pic. I p. 2, tab. 1; — *Campoph. imp.* Mus. Hein. IV, Heft. 2, p. 101; — niger pennis cubiti scapulisque albis. Crista occipitis *maris* rubra, *feminae* nigra longissima, apice recurva. — Maximus Picorum omnium: longitudo totalis 660 mm; Alæ 310—320 mm. Latera colli non albolineata. Plumæ nasales nigræ. Remiges omnes basi, intus, nigræ; primariae ultimæ apice albæ. Rostrum album. (Mus. Britann.). — Habitat in *California*; quasi forma occidentalis, major, pro sequenti.

2. *PICUS principalis* L. S. N. X. (Catesby, I, 16); — Lth. 3; — Malh. I, p. 4, t. 1; — *Camp. princ.* Mus. Hein. 100; — niger, linea colli laterali, per scapulas ducta, pennisque cubiti albæ. — Similis præcedenti; paullo minor, ala 250 mm, colloque lineato. Plumæ narium albæ. Remiges et diff. *sexus* ut prioris. Rostrum album. — Ex *America septentrionali* calidiore, orientem versus: Texas, Ludoviciana et cet. (Mus. Stockh.).

2 b. Varietas s. stirps insularis: *Camp. bairdii* Cassin Philad. Proc. 1863, 322; — simillimus P. principali sed paullo minor: ala 236 mm (9 $\frac{1}{4}$ poll. angl.); linea colli alba usque ad basim rostri continuata (in P. principali non ante oculum extensa). Plumæ nigræ, ante cristam maris, longiores quam plumæ cristæ rubræ (in altero, plumæ nigræ rubris breviores). Hab. in *Cuba* (Cassin).

3. *PICUS magellanicus* King Z. Journ. 1828; — Malh. I. 8, t. 2; — *Iopocrantor magell.* M. Hein. 99; — niger pennis cubiti intus apice albis. *Mas* capite colloque, cum crista, rubris; *femina* capistro solo rubro. — Crista utriusque sexus longa, recurva. Rostrum nigrum. Ala 215—220 mm. — Habitat in America maxime meridionali, prope *fretum magellanicum*. (Mus. Britann. Berol.).

b) Sp. magnæ, alis brevioribus instructæ.

(penna cubiti prima $\frac{4}{5}$ vel $\frac{5}{6}$ alæ attingit). Rostrum capite paullo longius. Venter (præter sp. 9) pallidus, plerisque fasciatus. (Incolæ zonæ torridæ).

1. *Collo utrinque linea alba, ad scapulas ducta, picta.*
(*Scapaneus* Mus. Hein. 90).

*) Remiges intus albæ (non maculatæ).

4. *PICUS melanoleucus* Gm. — Lath. sp. 7 (ex Gen. Syn. I, 558, n:o 6 t. 25: *femina* juv. in spir. vini decolorata); — Mus. Hein. 90 (*Scap. mel.*); — *P. albirostris* Vieill. Enc. 1304; — Malh. I, 17, t. 4; — niger, ventre fulvo-albido, nigrofasciato; rostro (senioris) albo; tergo guttureque totis nigris. Caput rubrum; in *mare* macula auris alba, superne nigra; loris plumisque in basi maxillæ inferioris albis, genis rubris; — in *femina*, crista superne fronteque nigris; vitta genarum lata, alba, nigromarginata, a rostro incepta, cum linea colli contigua. — Remiges intus pure albæ. Linea colli per scapulam, ad dorsum medium extensa. Ala circiter 190 mm. — *Brasilia, Guyana* (Mus. Stockh.).

5. *PICUS malherbei* Gray Genera (Campeph.); — Malh. I, 15, t. 6; — Mus. Hein. 93 (*Scap.*); — præcedenti simillimus, differt rostro fusco; ventre magis rufescente, fasciis nigris paullo latioribus picto. Præterea diff. *sexus*, magnitudo omnisque descriptio prioris. — *Bogota* (Mus. Stockh. Malh.).

6. *PICUS guatimalensis* Hartl. Rev. Zool. 1844, 214; — Malh. I, 19, t. 7; — Mus. Hein. 92 (*Scap.*); — similis duobus præcedentibus; differt vero: facie tota rubra, absque pictura alba, remigibusque intus pallide flavis. Rostrum albidum. Venter albidus, nigrofasciatus. Ala 180 mm. *Mas* capite toto cum gula rubro; *femina* pileo gulaque nigris; capite reliquo rubro, immaculato. — *Mexico* (Mus Stockh.; Berol.).

7. *PICUS sclateri* Malh. I, 22 et 165; ♀ t. 8 (sign. P. malherbei); ♂ t. 35; — Mus. Hein. I. c.; — Iterum simillimus P. melanoleuco (n:o 4); differt vero: tergo fulvo, nigrofasciato. Caput *maris* rubrum, linea laterali angusta, alba, ab angulo oris incepta; — *feminæ* rubrum (etiam superne), linea laterali, (ut in n:o 4) latissima. — Gula utriusque sexus nigra; rostrum fuscens. — *Ecuador* (Mus. Berol.).

“) Remiges nigræ, intus albomaculatae.

8. PICUS *pollens* Bonap. 1845; — Mus. Hein. 94 (Scap.); — *P. grayi* Malh. 1849; — Mon. I, 13, t. 5; — niger ventre fulvo, minus crebre nigrofasciato; linea colla, a naribus ad scapulas ducta, dorsoque medio et postico albis. Pileus cristatus, *maris* ruber, *femina* niger. — Guttur, cervix et latera capitum nigra. Remiges fere omnes apice brevi maculisque pogonii interni fere 4 albis. Ala 175 mm. — *Bogota* (M. Stockh., Berol.). — Sp. a precedentibus paullum differens: ala vix longior qv. in sp. *javana* (n:o 13): pennæ cubiti $\frac{1}{3}$ alæ fere attingunt.

2. *Collo non abolineato, vel linea non ad scapulas ducta.*
(*Phloeoceastes* Mus. Hein.).

9. PICUS *boiei* Wagl. Syst. sp. 3; — Malh. I, 10, t. 3; — *Phl. boiei* Mus. Hein. 97; — niger, ventre concolor, dorso marginaque carpi albis; capite cum gula rubro. *Mas*, macula auris alba, superne nigra; *femina*, fronte cristaque superne nigra; vitta a naribus, sub oculis ducta, alba, nigromarginata. Rostrum album. Remiges basi, intus, pallide rufæ. Ala 185 mm. — *Brasilia* (Malh.; ipse non vidi).

10. PICUS *rubricollis* Gm. (Buff.; Pl. Enl. 612); — Lth. 6; — Malh. I, 25, t. 8; — Mus. Hein. 96 (Phl.); — niger, dorso concolor; capite colloque toto rubris; ventre rufo immaculato. — *Mas*, macula auris parva, fusca, vel nigra albaque; *femina*, vitta a naribus ad aures ducta, alba, nigromarginata. Rostrum albidum. Remigum pogonum internum, a basi ultra medium, saturate rufum, scapo ibi concolor. Pog. externum nigrum, sed (saltem in mare seniore) juxta scapum angustius rufum. Ala 180 mm. — *Guyana* (Mus. Stockh.); *Brasilia septentr.* (M. Hein. ex Mus. Berol.)

10 b. Forma occidentalis? *P. trachelopyrus* Malh. p. 26, t. 8; — Mus. Hein. I. c.; — a *P. rubricollis* non differt nisi pogonio remigum externo, a basi ad medium, rufo, non nigromarginato. *Bolivia*, *Peru* (Malh. — Mihi ignotus).

Conf. obs. de *P. rubricollo* et *P. trachelopyro*, Mus. Hein. p. 97, nota, ubi specimina *brasiliensis* pro tertia forma hujus avis, pectore antico rubro agnoscenda, habentur.

11. PICUS *robustus* Freyr. Licht. Verz. 1823, 10; — Malh. I, 23, t. 3; — Mus. Hein. 95 (Phl.); — niger, ventre fulvo nigroque fasciato; dorso medio et postico fulvo-albido (antico nigro-obtecto); capite colloque rubris, crista occipitali brevi, rotundata, (fere ut in sp. 13). Diff. sexus ut in priore: *mas*, macula auris parva, fusca, infra albomarginata; *femina*, vitta a naribus ad aures ducta, alba, nigromarginata. — Rostrum albidum. Remiges nigræ, pogonio interno fasciis 4 v. 5 latis, rufis; externo et scapo totis nigris. Crista occipitis sat brevis. Ala 175 mm. (Mus. Stockh.). — *Brasilia*; et *Regio platensis* (Paraguay Az.).

12. PICUS *haematoxaster* Tschudi Fn. Per. — Malh. I, 27, t. 9; *Cnipharchus haem.* Mus. Hein. 98; — niger, pileo cum cervice tergoque rubris. Vitta pone oculos brevis nigra, inter lineas 2 latas, flavas sita. Linea hæc inferior, a naribus orta, in *mare* brevis; in *femina*, per

collum superius continuata. Guttur totum nigrum. Gastræum reliquum in *juvene* fulvum, nigrofasciatum, in *adultis* rubrum. Remiges nigrae, intus maculis 3, vel 2, albis, magnis. Rostrum fuscum. — *Peru, Ecuador, Nova Granada* (Malh.; mihi ign.).

2:do. SPECIES VETERIS ORBIS

erista occipitis brevissima rotundata, vel vix ulla. Cauda paullo brevior quam $\frac{2}{3}$ alæ. Ala rotundata, brevior quam in plerisque americanis: penna cubiti prima $\frac{7}{8}$ longitudinis alæ attingit. Alarum tectrices inferiores, in sp. cognita fuscae, pallidimaculatæ; (in sp. americanis albidae, unicolores. Sexus colore differunt: femina fuscescens. Mira antem conformitas partium omnium cum Picis americanis supra descriptis. — (Genus *Xylolepes* Mus. Hein. 108).

13. *PICUS validus* Reinw. Temm. Col. 378 et 402; — Wagl. Syst. sp. 13; — Malh. I, 28, t. 9; — Mus. Hein. 108 (*Xylolepes*); — remigibus fuscis, fasciis 4 rufis, latis, per utrumque pogonium scapulae pictis. Macula ante apicem quoque rufa. — *Mas.* caput, collum totusque venter dilutius rubra, plumis mollibus, nitidis, basi fuscis. Gula et latera capitis, infra oculos, nitide lutea, linea malari interjecta pallide rubida, parum apparente. Alæ, scapulae et cauda fusco-nigræ, remigibus rufofasciatis. Dorsum totum, cum uropygio, plumis basi pallidis, apice rubris, (sed, ut in *P. robusto* pluribusque americanis, a scapularibus alisque fere occultandis). Rostrum pallide fuscum, flavidum. Ala 145 mm. (M. Sthm.).

Femina fuscescens, remigibus ut in mare pictis. Caput superne obscure fuscum, gula pallida. Dorsum totum fulvoalbidum; Alæ antice et scapulae nigrofuscæ. Gastræum et collum dilutius fusca. Ala 158 mm. (M. Stockh.).

Habitat in *Java, Borneo, Malacca, Sumatra*.

Sectio Posterior: Digitus 4:tus tertio brevior. Carinæ rostri nasales inter se paulo minus late distant: ad nares, culmini, quam tomiis, paullulo propiores. Gen. *Dryocopus* rec. (post Boie, typo *P. martio*); — *Dryopicus!* Malh., — *Picus* propr. Gray, List. (typo *P. martio*).

1:mo. SP. AMERICANÆ

Crista occipitis acuta, rubra; collo utrinque albolineato; remigibus intus tectricibusque inferioribus totis albis, immaeulatis. Similes americanis præcedentibus, a quibus tamen differunt digito 4to breviore, rostroque paulo breviore, longitudinem capitis vix excedente,] quare furca menti sub media sutura desinit.

) Ventre pallido, nigrofasciato (*Ceophloeus* Mus. Hein. 85).

14. *PICUS lineatus* L. XII (Briss. IV, 31); — Lth. 5 (Pl. Enl. 717); — Wagl. Syst. sp. 8; — Malh. I, 39, t. 12; — Mus. Hein. 86; — niger ventre fulvescenti-albido, crebre, irregulariter nigrofasciato. Rostrum fuscum. Linea colli, a naribus incepta, ante oculos fulvescens, in genis angusta, per scapulares continuata, ibique latior. Remiges intus albæ, parum flavidæ tinctæ. Gula albida, nigrostriolata; jugulum nigrum. Capitis latera, pone oculos, nigrocinerea. Dorsum totum nigrum. *Mas*

pileo, toto vittaque malari rubris; *femina*, pileo cum crista rubro; fronte et regione malari nigris. Ala 190—200 mm. — *Brasilia, Guyana*, (Paraguay?).

Var. occidentalis: *Ceophyl. mesorhynchus* Mus. Hein. 86; — paullo minor: ala 175 mm (mus. Stockh.; 185 mm, mus. Hein.); ala subtus paullo magis, quam in P. lineato, flavotincta. De cetero differentias nullas invenio; color rostri idem. *Caracas* (M. Stockh.); *Costarica* (Mus. Berol.). — Obs. Hæc forma a Cabanisio, Journal 1862, 176, ut varietas sequentis, inter eum et P. lineatum intermedia, exponitur.

14 b. *PICUS scapularis* Vig. 1829; — Malh. I, 44 t. 10; — Mus. Hein. l. c. — Simillimus P. lineato, sed minor: ala 170—180 m.m. (Malh.; 6 p. 7 lin. = 173 mm., Mus. Hein.), rostro albo. — *Mexico* (Mus. Berol.).

15. *PICUS fuscipennis* Scaler Z. Proc. 1860 (Dryoc.:); — Malh. I, 165 et 186, t. 61; — Mus. Hein. 87; — a P. lineato differt colore fuscescente, pro nigro, praesertim alarum caudæque, ventreque transversim fuscomaculato (nec fasciato). Etiam minor: ala 166 mm (Sel. et Mus. Hein.; 130 m.m. Malh., forte lapsu?). — Scapulae albæ et reliqua pictura sexusque differentia, ut i P. lineato. *Ecuador*. (Non vidi).

16. *PICUS melanotis* Natt. in Mus. Vindob (Malh.); — *P. erythrops* Cuv., Valenc. Dict. 1826; — Malh. I, 42, t. 12; — Mus. Hein. 88; — vitta scapulari nulla alba. Capitis latera, pone oculos, obscure cinerea, paullo nigriora quam in P. lineato. Ceterum huic similis. Ala 190 mm. — *Brasilia* (Mus. Stockh. ♀; M. Berol. et Hein. An etiam "Mexico", Malh?).

Obs. Nomen *erythrops*, hunc Picum male designans, propter confusionem c. nomine aliis speciei evitandum (P. erythrops, — opis, — opes, infra n:o 33).

17. *PICUS galeatus* Natt. Temm. Pl. Col. 171; — Malh. I, 38, t. 11; — Mus. Hein. 89; — subsimilis P. lineato; differt tergo albo, scapulis non albis, linea colli alba, per latera capitis, linea cinereâ, fuscovariâ, usque ad nares continuata, remigibusque intus rufescensibus. *Mas* pileo toto, cum crista nuchaque, vittaque malari longa, rubris. *Femina* pileo antice fulvogriseo, fuscostriolato, sed crista rubra; vitta malari a pictura capitis lateralí vix distincta. — Alæ cum dorso anteriore et guttur inferius nigra. Gula fulvogrisea. Venter fulvo-albidus, nigrofasciatus. Ala 165 mm. — *Brasilia interior* (Malh.; mihi ignotus).

**) Ventre nigro (nec aliter diversus. — *Phloeotomus* Mus. Hein. 102).

18. *PICUS pileatus* L. X (Catesb. 17); — Lath. sp. 4 (Pl. Enl. 718); — Malh. I, 34, t. 11; — Mus. Hein. l. c.; — niger ventre concolore; linea colli alba a naribus ad latera pectoris ducta. Crista rubra. *Mas* pileo toto vittaque malari rubris; *femina* fronte, late, vittaque malari nigris; pileo medio cum crista rubris. — Vitta pone oculos lata, nigricans, superne albomarginata. Gula alba, medio leviter fuscostriolata (sed vix in mare seniore). Plumæ ventris, praesertim laterales, margine albido, angusto fimbriatæ. Scapulae non albæ. Præcedentibus major: ala 230—250 mm, rostro, a fronte, 50; æqualis P. martio. — Habitat in *America septemtrionali*, fere inter 25°—45° lat:s, a mari atlantico

ad pacificum (ex insula Quadra M. Sthm.). Picum martium in America repræsentare videtur. Specimina meridionalia paullo minorata.

2:do. SP. VETERIS ORBIS.

Crista nulla; collo non lineato; remigibus totis nigris. Rostrum capite paullo longius, validum et ut in præcedentibus formatum.

*) Ventre albo.

Rostri pedumque forma et proportio ut in Americanis. Thripoanax M. Hein. 105.

19. PICUS leucogaster Reinw. Temm. Pl. col. 501. — Malh. I, 47 tab. 13. — *P. javensis* Horsf. L. Tr. XIII, (sed obs. *P. jav.* Ljungb.); — *Thr. jav.* M. Hein. l. c. — Niger ventre albo. *Mas* pileo toto vittaque malari parva rubris; *femina* occipite tantum rubro; vitta malari nigra. — Ala circa 240 mm. Crissum nigrum. Latera capitinis et gula albido-striolata. — *Java* (Mus. Brit. Berol.).

20. PICUS hodgsoni Jerd. Malh. I, 49, t. 13. — M. Hein. l. c. — Niger ventre tergoque albis. Crissum nigrum. Diff. *sexus* ut in priori. Latera capitinis et gula vix albovaria. Ala ♂ 220; ♀ 230 m.m. Rostrum paullo validius quam præcedentis. — *Malabarica*. (Mus. Brit.).

20 b. *Thr. jerdoni* Mus. Hein. l. c. (ex obs. sub *P. hodgsoni*, Jerd. Ind. I, 285), "similis *P. hodgsoni*; differt vero aliis subtus latius albisi". — *Pegu* (mihi ignotus).

**) Ventre nigro.

21. PICUS hodgei. *Mulleripicus hodgei* Blyth; Jerd. Ind. 285; — *Thripoanax hodgei* Mus. Hein. l. c. — Toton niger, præter picturam capitinis rubram, ut in 2 præcedentibus, in *mare* et *femina* diversam. Reliquis minor: ala (7", M. Hein.) circiter 180 mm. — *Ins. Andamanæ*. Avem non vidi, quare de affinitate ejus judicare nequeo).

22. PICUS martius L. — Malh. I, 31, t. 10. — *Dryocopus martius* Mus. Hein. 103. — Supra subfuscus niger. *Mas* pileo toto, *femina* occipite solo, rubro. Vitta malaris non distincta, nec ulla pictura distincta, præter capitinis, adest. Rostrum albidum, superne apiceque cæruleo infuscatum. Ala circa 240 mm. — Habitat in *Europa* tota et in tota *Asia septentrionali* (Pallas), frequens in monte *Stanovoi* (Middend.), ad ostia fluminis *Amur* (Schrenck), in *Japonia* (Fn. Jap.). — Forma paullum a præcedentibus differt. Pedes præsertim, pro mole corporis, parvi et tenues; sed unguis non minores quam præcedentium. Hinc unguis internus (2:us) digito suo longitudine æqualis; hallucis longior quam ipse digitus. Rostrum longius, furca menti breviore quam sutura dimidia, carinis nasalibus culmini paullulo prioribus, quam in reliquis.

'TRIBUS 2. *Pici squamicipites*.

Rostrum capite longius, validum, apice valde cuneatum; carinis nasalibus prope culmen sitis, parum elevatis, antice evanescientibus. Caput et collum plumis perparvis, angustius oblongis, subrigidis et adpressis den-

sissime tecta. — Species magnæ vel maximæ, nigrocinerascentes, alis caudaque longis, ut in præcedentibus formatis. Pedes magni, digito 4:to breviore quam 3:tio. Rostri culmen leviter arcuatum; maxilla inferior basi crassior; furca menti longius ante medium suturam extensa. Setæ nasales parvæ. Pluinae parvæ capitis collique summo apice pallidæ, unde hæ partes punctatae, quasi pulvere inspersæ, apparent; sed macula auris fusca, immaculata. Remiges et rectrices totæ nigræ. — (Mulleripicus, Lichtensteinipicus et Hemilophus Bonap. — Alophonerpes R:bch; Mus. Hein. 106). — *Malayasiatici*.

23. *PICUS pulverulentus* Temm. Pl. Col. 389 (Livr. 65, 1825). — *P. gutturalis* Valenc. (1826); — Malh. I, 51, t. 15; — *Al. gutt.* Mus. Hein. l. c. — Cinereo-niger gula fulva, plumis capitis collique puncto apicis pallido. Macula malaris in *mare* rubra, in femina nulla. Ala, ♂ 230, ♀ 220 mm, c. 175; r. a fr. 55. (Mus. Stockh.). *Arracan, Malacca* (Blyth), *Sunatra*.

24. *PICUS fulvus* Qu. & Gaim. Astrol. — Malh. p. 53 t. 14; — Mus. Hein. l. c. — Nigrofuscus gastræo toto fulvescente; capite colloque pallidipunctatis. *Mas* a femina differt facie, pone oculos usque, rubra. Ala 180 m.m. — *Celebes* (Mus. Brit.).

25. *PICUS funebris* Valenc. Dict. 1826; — Malh. p. 54, t. 15. — Mus. Hein. l. c. — Nigricans gastræo paullo dilutiore, fusco; capite colloque albopunctatis. *Mas* facie obscure rubra. Ala 160 m.m. — *Insulæ Philippinæ* (Mus. Brit.).

TRIBUS 3. *Pici parvicaudati*

Pici parvi vel minimi; cauda brevi (longit. $\frac{1}{3}$ alæ parum excedente), parum vel vix gradata, pennis apice rotundatis, scapis vero crassis, firmis, apice elasticis. — Digi, pro mole corporis, inter Picos maximi: extensio eorum (cum unguibus) longitudinem alæ dimidiā fere æquat; 4:tus tertio multo longior. Rostrum conico-acutum, a medio, compresso, attenuatum, apice vero acute cuneato. Carinæ nasales validæ, latissime distantes. Furca menti sub media sutura desinit. Caput pro Picis magnum, large cristatum, collo tenui. — Sexus picturæ vel colore capitis paullum dissimiles, sed vitta malaris in sp. cognitis neque differt, nec distincta appetet. Sp. *Asiæ meridionalis*. — (Hemicercus Swains. Strickland; Mus. Hein. 175. — Mieropicus! Malh.),

26. *PICUS sordidus* (Eyton 1845); — Mus. Hein. (Hemic.) 177. — *P. hartlaubii* Malh. I, 189, t. 41. — Fuscus dorso aliquæ nigris, plumis fulvo-albido limbatis; uropygio fulvo-albido. *Mas* pileo toto, cum plumis nasi cristaque, fulvescenti-rubro. *Femina* capite toto, cum crista, colore fusco, pectori concolore. — Rostrum nigrofuscum. Caput, collum, pectus ad pedes usque et tergum obscure cinereofusca, in *mare* adulto obscuriora. Vitta cervicis longit. fulvoalbida. Abdomen plumis late albidolimbatis. In lateribus colli, infra genas, adsunt vestigia obsoleta lineæ albidae. Rectrices nigræ; mediae in ♀ macula transversa,

alba, in medio margine interno notatae. Ala circa 85 mm; Cauda 30; Dig. med. c. ungue 22; digiti extensi 48. — ♂ *junior* (Singapore, m. Sthm.) colore corporis feminæ similis. Pileus, a naribus ad occiput, nitidius ruber; sed crista tota, colore genarum fusca. — *Sumatra, Malacca*. (Observandum tamen specimina maris veteris adesse, quæ ex Java orta dicuntur: alterum in Mus. Stockh., Parisiis, 1833 emtum: alterum in Leydensi).

26 b. *P. concretus* Temm. Pl. Col. 90. — Malh. I, 187, t. 41. — M. Hein. 178. — Simillimus præcedenti, a quo vix differt nisi pileo *maris* antico, usque ad verticem medium, fusco flavescente. Cervix quoque eodem colore latius tingi videtur. Crista paullo dilutius rubra appetat. *Feminas* vero utriusque distinguere non potui. — Tantummodo in *Java* et *Borneo* inventus. An re vera patria et colore a præcedente differat, ulterius inqvirendum.

27. *PICUS canente* Less. Voy. Belang. III, 240; — Malh. I, 190, t. 42; — Jerd. Ind. I, 280 (Hemic.); — Mus. Hein. l. c. — nigrofuscus gula vittaque ab angulo oris ad alas ducta fulvo-albidis; fronte cum vertice medio, *Maris* fulvoalbida, *Feminæ* nigra, albidopunctata. — Caput cum crista, cervix et dorsum medium nigra; interscapulum et uropygium albida. Jugulum et pectus cinerascentia (in habitu recenti paullum fulvo virenti-tincta). Ala nigra tectricibus parvis albidis; mediis albidis, apice lato nigro, tenuissime albidomarginato; postremis albidis, fasciis 1 v. 2 latis, nigris. Remiges nigræ, intus albidæ. Ala circiter 90 m.m. — Habitat in utrâque peninsula *Indiae*.

a) Orientalis, ex Arracan et Tenasserim peninsulae orientalis; paullo major: Ala 94 m.m. (3 p. 7 lin.) Mus. Hein. 176.

b) Occidentalis, ex Malabar; *Picus cordatus* Jerd. Madr. Journ. 1840; — *Hemic. cordatus* Gray; — Mus. Hein. 174; — semper paullo minor dicitur: ala (3 p. 5 lin. =) 89½ mm. Mus. Hein. — Nullam aliam differentiam, nisi magnitudinis, exiguum, inter has duas formas invenerunt auctores; nec ipse in speciminibus, quæ in Museis: Bremensi, Lugdunensi, Britannico et Berolinensi adsunt, observavi. Differentiam vero multo majorem in magnitudine, vel longitudine totali invenisse crediderunt, (hujus, 157 m.m.; illius, 189; sc. 6 poll., et 7 p. 3 lin., Mus. Hein.), quæ tamen nihil docet. Longitudo enim totalis, inter omnes mensuras avium, maxime fallax, in avi integra, collo magis minusve extenso, in cute avis præparata vel farcta, secundum extensionem cutis vel varium modum ejus præparandi vel fariendi, multum differt.

TRIBUS 4. *Pici auricipites*.

Fuscovirentes, luteomicantes, subtus maculis fasciisve crebris, flavoalbidis picti; capite flavo et rubidotincto. — Species minores, non cristatae, rostro forti, brevi, cônico, recto; medio vix vel non compresso; apice acute cuneato. Carinæ nasales plerumque validæ, sed culmini propriores. Remiges intus *rufopictæ*. Rectrices fuscovirentes, immaculatae,

sed apice nigriores; acutæ et gradatae. Scapi pennarum supra subtusque fuscescentes (nec flavescentes). Digitus 4:us, tertio brevior.

Sp. *Americæ* merid. tropicæ, pictura et statura sat similes Picis passerinis; a quibus tamen formâ rostri, et plumis colli brevioribus differunt. — *Chloropicus!* pars, Malh.; — *Chrysopicus!* Bonap.; — *Craugastus* Mus. Hein. IV, 157.

a) Remiges intus rufomaculatae.

28. *PICUS aurulentus* Ill. Licht. Verz. 1823. — Temm. Pl. Col. 59; — Malh. II, 137, t. 84. — *P. auratus* Vieill. N. D.; Enc. 1305 (nec Linn.); — Mus. Hein. 158. — Fuscovirens, subtus virentifuscus fasciis crebris, flavescentibus; gula flava. Linea flava ab oculo ad latera cervicis, aliaque a naribus ducta, vittam postocularem, latam, fuscam, cingunt. Vitta malaris utriusque sexus rubra. Fasciæ remigum fere 8, angustæ, rufæ, extus intusque apparent; sed in pennis cubiti marginem externum non attingunt. Pileus *maris* ruber; *feminae* virescens, occipite solo rubro. — Ala circa 128 m.m. cauda 75. — *Brasilia* (M. Stockh.).

29. *PICUS callopterus*; — *Chloronarpes call.* Lawrence Ann. Lyc. N. York VII, 476. — Mus. Hein. 159. — Remiges rufæ, maculis fasciisve paucis, nigricantibus; primariae apice fuscæ. Supra virens, uropygio fusciore. Venter flavo et nigricantifasciatus, postice pallide rufus; antice (jugulo?) virens, maculis triangularibus flavis. Gula fulva, fusco-maculata. Linea a rostro, sub oculis, flava. Rectrices fuscescentes margine virentes; laterales, utrinque 2, juxta scapum medium rufæ. Specimen cognitum, *Mas* dictum, fascia occipitis rubra, pileo virentifusco. Ala 106 mm. — *Panama*. (Lawr.).

b) Remiges intus rufæ, non maculatae.

30. *PICUS chrysochlorus* Vieill. N. D. — Enc. 1320; — Malh. II, 141, t. 84 (et *P. brasiliensis*, Steph., Malh. t. 85). — Mus. Hein. 159. — Fuscovirens, subtus cerebro flavo fuscoque fasciatus; lateribus capitis, ante et pone oculos, virentifuscis, linea infra oculos (ab ang. oris ad latera colli) gulaque flavis, interjecta vitta malari. Pileus et vitta malaris in *Mare* rubri, in *Femina* toti viridifusci. — Minor: ala 120—125 m.m.; cauda 80. — *Brasilia* (Malh.).

31. *PICUS polyzonus* Valenc. — Malh. 136, tab. 83. — Mus. H. — Simillimus præcedenti, sed. major: ala 150 m.m.; neque alia differentia describitur. Ne similitudinem quidem horum Picorum apud auctores memoratam inveni; eos vero in museis comparare ipse neglexi. *P. polyzonum* ♀ Berolinii vidi. — *Brasilia*.

(Obs. In iconibus Malherbei citatis, vitta malaris in mare sp. præcedentis postice fuscovirens, in mare *P. polyzoni* tota rubra exhibetur).

32. *PICUS capistratus* Natt. — Malh. II, 140, tab. 83; — Mus. Hein. — *P. polyzonus* Temm. Wagl. — Picturâ et omni re similis 2 præcedentibus, præter gulam, totam fasciatum (ut venter). Ala: ♂, 138 mm. (M. Hein.); ♀ 130 (Mus. Berol.). Fasciæ gastræi paullo angustiores et nigriores quam in *P. polyzono*. *Brasilia septentr.*

33. *PICUS erythrops* Vieill. N. Dict.; et Enc. 1320 ("erythropsis"); — *P. erythrops* Wagl. sp. 53; — *erythropsis* Malh. II, 143, t. 87. — Mus.

Hein. p. 158 (nomine correcto). — Supra fuscovirens, immaculatus; subtus flavoalbidus, fasciis nigris, crebris, angustis, paullum flexuosis. Caput lateribus nitide luteum, immaculatum. *Mas* pileo gulaque cum regione malari rubris; *femina* pileo luteo, postice rubro; gula lutea; regione malari concolori, leviter rubro tineta. — Ala, ♂ 110, ♀ 107 mm. — *Brasilia* (M. Sthm.).

34. *PICUS flavigula* Bodd. (Pl. Enl. 784); Mus. Hein. (Craugastus) l. c. — *P. chlorcephalus* Gm. — Malh. 144, t. 86; — *P. icterocephalus* Lath. — Fuscovirens, gastræo fusciore, creberime albido maculato: maculis majusculis; anticis rotundatis, reliquis transversis. Caput cum gula flavissimum, lateribus, pone oculos, immaculatum. *Mas* pileo rubro, et vetus, stria malari rubra; *femina* occipite solo rubro. — Ala 112 m.m. — *Guyana*; *Brasilia septentr.* (M. Sthm.).

35. *PICUS leucolæmus* Malh. II, 185, tab. 85. — Mus. Hein. l. c. — Fuscovirens, lateribus capitis flavis, circa oculos infuscatis; gula alba. Gastræum reliquum: antice fuscum, guttis albidis, oblongis, definitis; deinceps fuscoque fasciatum. *Mas*, pileo vittaque malari rubris; *femina* pileo postice tantum rubro; antice et vitta malari viridifuscis. — Ala 124 m.m. — *Bolivia*; *Brasilia interior* (Malh.).

Series 2. Pici securirostres.

Rostrum validum, apice valde cuneato, carinis nasalibus latissime distantibus. Collum, plumis non parvis tectum, minus angustum appareat. Nares plumis setosis tectæ. — Rostrum plerumque capite brevius, culmine recto, acute carinato, minus elevato, ad latera plano. Carinæ supra nares sitæ sat altæ, in basi rostri longius a carina media, quam a tomiis distantes, et circa medianam suturam tomia attingentes. Furca menti parum ante nares et parum ante $\frac{1}{3}$ suturæ exit. — Digitus 4:us ceteris plerumque longior (præter sp. quasdam Tribuum 6 et 10—12). Pedum cutis et alarum tectrices oscininae.

TRIBUS 5. Pici nigrovareii

supra nigri, paullum albovarii; subtus albidi linea (malari) nigra ab angulo oris ad latera colli ducta. Rostrum fortissimum, non compressum, maxilla superiore apice, utrinque, bicarinata.

Species minores; vel fere medie magnit:is (*P. leuconotus* omnium fere maximus). Crista nulla. Pileus *maris* ruber vel rubropictus; *femina* plerumque niger. Regio malaris in ♂♀ non differt. Remiges nigrae, maculis marginalibus pure albis, utrinque 4, sed in primariis maximis (3:tia et paucis seqq.) fere 6 (basalis saepè obsoleta. In *P. tridactylo* 8, accedunt enim maculæ apicis). Cauda gradata, acuta, nigra; plerumque pennis mediis immaculatis; lateralibus, utrinque 2 vel 3, extus oblique albis, nigrofasciatis. Rostri carinæ altæ, evidentes; inferior quoque acuta.

Apex max. sup:s, lateribus, ad $\frac{1}{3}$ rostri, carinis 2 longitudinalibus, parallelis, intervallo concavo separatis, instructus. Carina superior est continuatio carinæ nasalis. Digitus 4:us tertio multo longior. — Incolæ præsertim zone temperatae (et subfrigidæ) septemtrionalis, utriusque orbis (nulla vero in africa propria). — In zona torrida septemtrionali (India, Mexico) pauca species minores, fuscae, vel picturæ paullum aberrantes, inveniuntur. — Dryobates Boie; Picus propr. Malh.; 12 genera, Mus. Hein.

Sectio 1. Species tridactylæ (halluce nullo).

Species præsertim septemtrionales veteris novique orbis, rostro latoire, paullum depresso, carinis nasalibus a culmine longius, quam in reliquis Picis, distantibus. Pictura capitis ventrisque rubra nulla, sed plumæ pilei duriusculæ, subrigidæ, apice, plerumque, in vertice maris flavæ, feminæ albæ. Juniores quoque vertice flavo ornati. Latera capitis nigra: vitta postoculari nigra latissima, inter lineas 2 albas, superiorem angustum, interdum obsoletam, inferiorem longam. — Apternus Swains.; — Picoides Lac.; Malh.; — Tridactylia Steph.; Mus. Hein. IV, 25.

*) Sp. veteris orbis: rectricibus 6 mediis totis nigris.

36. PICUS tridactylus L. — *Picoides europaeus* Less.; — Malh. I, 170, t. 38. — *Trid. hirsuta* Steph.; Mus. Hein. l. c. — Latera corporis maculis crebris nigris, antice longitudinalibus, posterius transversis, variegata. — Crissum quoque paullo nigromaculatum. Lineæ 2 albæ in lateribus capitis, distinctæ, angustæ; superior in dorsum exiens. Dorsum totum, cum cervice tergoque, album, nigro-varium (plumis extus basique nigris). Rectrices laterales, utrinque 2, extus late, oblique albis, fasciis fere 4 sub-integris, nigris. Ala circa 124 mm. — Plaga verticis maris flava, feminæ alba, nigromixta. Maculæ nigrae in corpore Junioris majores, fere confluentes. — Habitat in Europa septemtrionali et in alpinis Europæ mediæ.

37. PICUS crissoleucus Brandt, Malh. I, 180, t. 40; — *P. camtschensis* (Bonap), — Mus. Hein. p. 25 (sed obs. P. kamtsch. n:o 72). — Similius præcedenti, a quo differt lateribus corporis crisoque fere immaculatis. Dorsum album vix nigromixtum. Plaga pilei (σ flava, φ albida) major, a rostro ad occiput extensa. Rectricum lateralium fasciæ nigrae interruptæ; vix nisi 3: apicis evanescens. Ala σ 125; φ 121, M. Sthm. ex Archangel; 131 m.m., Mus. Hein., Sibiria. Usque ad mare japonicum (ad Ostia flum:s Amur, Schrenck) invenitur; incertum vero an etiam in Kamtschatka. — Proprie habendus est *P. tridactylus* var. orientalis.

Obs. Nomen *crissoleucus* minus sane correctum, sed h. l. vix ad exemplum Mus. Hein. rejiciendum. Vocabulum enim "crissum", etsi dubiae formæ, tamen usui acceptum et originis græcæ (*κρισσός*). Optime sane in nomen pure græcum mutaretur, qs. *P. leucopygus*.

**) Sp. americanæ; rectricibus mediis tantum 4, vel 2, totis nigris.

38. PICUS dorsalis Baird, Report 1858, 100 (Picoides); — Malh. I, 179. — Mus. Hein. 26. — Dorso albo plumis mediis basi tantum

nigris. Uropygium quoque longitudinaliter albomaculatum. Ceterum similis *P. americanus* videtur. Plumæ vero crissi totæ albæ. Ala (5 poll. Angl.) 127 mm. — Unicum specimen cognitum, ♂, in montibus *Rocky mountains* inventum. (Baird).

39. *PICUS americanus*. *Picoides amer.* Brchm V. Deutschl. 1831; — Malh. p. 176, t. 39; — Apt. amer. Swains. Classif. 1837. — *P. hirsutus* Wagl. Syst. n:o 102 (ex. Vieill.). — *Trid. undulata* Steph. in Shaw. Gen. Z. IX (ex Vieill.); — Mus. Hein. 28^o). — Dorsum eum tergo nigrum, maculis parvis, transversis, albis varium. Latera corporis tota crebre nigrofasciata. — In habitu recenti hiemali, presertim juniores, sat similis sp. europee, plumis quoque cervicis albofimbriatis. Plumæ dorsi mediæ fasciis 2 abbreviatis limboque albis. Hæ fasciæ in senioribus angustæ, in junioribus late, maculiformes; sœpe contiguae, interjectis fasciis interruptis nigris. Seniores, habitu vernali, nigriores, dorso antico vix maculato, cervice toto nigro; linea capitis laterali inferiore tenui, abbreviata; superiore obsoleta, non nisi striola tenuissima, pone oculum reicta. Rectrices laterales, utrinque 2, albæ, tantum pogonio interno basim versus nigro, subfasciato. Rectrix 3:tia nigra, apice oblique albida. In juniore etiam 4:ta margine apicis, et 5:ta (media) maculis paucis marginalibus, albis. Cauda, in seniore et juniore, a resina arborum, apice rufescens. Pileus niger, in *mare*, plaga verticis flava, in seniore, minore, intensius colorata; in *femina* totus albomaculatus, vel, habitu æstivali, punctata. Ala ♂ 117, ♀ 113 mm. (Mus. Sthm.; 115 M. Hein. — Habitat in *America septemtrionali*, fere a 40^o vel 43^o, boream versus.

40. *PICUS arcticus* Sw. — Malh. p. 175, t. 39. — Mus. Hein. l. c. — Pileus feminæ et dorsum nigra, immaculata. In reliquis, utroque sexu, simillimus præcedenti, veteri, cum quo eandem regionem inhabitat. Ala ♂♀ 126 m.m. (M. Sthm.; 130 Malh., M. Hein.).

Obs. Pici species tres, h. l. descriptæ, vix differunt nisi maculis albis dorsi in sp. prima majoribus, in ultima nullis. Si vero status sp. mediæ, pro ætate annique tempore varios, inspexeris, differentias exigugas invenies. Junior *P. arctici* mihi ignotus, nec descriptum inveni.

^{*)} Nomen specificum: "americanus", inter nomina huic Pico data, solum adhibendum; reliqua enim ambigua vel adulterata. — Nomen *P. hirsutus* (Vieill. Am. Sept.; N. Dict., et Enc. 1324) huic quidem (sp. americanae) adsignatum; sed specimen europæum descriptum. Nomen igitur a *Stephensio* (G. Zool.) pro sp. europæa, a *Waglero* pro americana adhibitum. — Alterum nomen: "*Undulatus*" Vieill. II. citt. Enc. 1319, ineptum, cum in deser. Vieillotii expressis verbis dicitur, digitos "non 3, sed 4", pileumque rubrum esse. Hæc descriptio non ex avi, sed ex iconе, Pl. Enl. 553, desumpta est. Quæ vero icon *P. americanum* nostrum exhibere videtur, pileo vero alieno, rubro, adsuto; vel forte ex deser. Brissonii, IV, 54 n:o 2, colorata, pedibusque alienis, 4dactylis, donata. — Ex eadem iconе, nomineque Vieillotiano, lapsu calami mutato, habemus nomina *P. undosus* Cuv. et *P. undatus* Temm. — Nomen Apt. *cayicensis* R.bch. oritur a nomine: "*P. varius cayensis*" Briss. l. cit. Specimina enim in Mus. Realmuriano, a Brissonio descripta, ex Cayana (lapsu, pro Canada) missa credebantur.

Sectio 2. Species tetradactylæ americanæ

digitis 4; ventre albido, nulla parte rubro; pileo nigro, vel rubro-picto (nec pallescente postice nigrocincto).

1:o. *Vitta postocularis lata nigra*a) *Gastræo* fere immaculato, albo vel albido.

Notæum, inter scapulas alasque nigras, longitudinaliter album. Rectrices medieæ tota nigrae, laterales albæ. Color notæi pure niger (nec fuscus) maculis albis. — Hi Pici picturæ similes sunt sp. tridactylis, præter pileum *Maris* senioris, occipite rubro; junioris, vertice plus minusve rubro. Plumæ istæ rubrae, basi nigricantes, apice longo, rubro, puncto intermedio albo ornatae. Hab. in *America septemtr.* — (*Dryobates* Boie; *Mus.* Hein. 62).

41. *PICUS villosus* L. (Catesby 19 et Kalm. Itin.); — Malh. I, 75, t. 21; — *Mus. Hein.* — Niger dorso longitudinaliter albo, tectricibus pennisque alarum albomaculatis; rectricibus lateralibus albis, immaculatis, extima tota alba; 2:da basi nigra; 3:tia extus, oblique dimidiato-alba; reliquæ (4 medie) tote nigrae. — Ala 120—130 mm. Pileus niger, in *Mare* seniore fascia occipitis, medio breviter interrupta, rubra. Remiges maximæ (3—6) extus maculis 7 albis: prima a tectricibus occultata, ultima ad apicem pennæ sita. Maculae remigum circa 5 mm latæ; tectricum paullo majores. Uropygium nigrum, immaculatum. *Gastræum* album, (sed plerumque sorde corticis arborum inquinatum); lateribus haud nigromaculatum.

Juvenis, ala nondum completa, ideoque sat brevi: rostro tumido, convexo, apice parum cuneato; pileo nigro, ♂♀ plagiæ verticis magna, rubra (*P. martinæ* Audub.; Malh. p. 82, t. 22), vel plumis sparsis rubris, vel etiam luteis (*P. phillipsii* Aud.; Malh. 84, t. 21: Var. major; — *P. auduboni* Trudeau; Audub.; Malh. 87, t. 22: Var. minor). — Habitat in *America septentrionali* fere inter 30° et 50° lat:s (vel forte latius boream versus dispersus?).

Hæc sp., ut plures aliae, variat: in regione frigidiore, septentrionali, major et, præsertim in habitu hiemali magis alba; in tepidiore, meridionali et occidentali, minor et obscurior (Malh. II. citt.; Baird, Report, Washington 1858, p. 84). Hinc:

Var. major, septentrionalis; ala circa 130 mm; culmen rostri 30 mm. (M. Sthm.; 28, M. Hein.); pictura vero nulla re a var. media differre videtur. Plumæ dorsi, ut in illa, majore parte albæ, basi extusque nigrae etc.; *P. canadensis* Gm.; — Lath. 17; — Malh. I, 78, t. 21. — *P. leucomelas* Bodd. (Pl. enl. 345, 1); — *Mus. Hein.* 67.

Var. media; ala ♂ 125, ♀ 123 mm, rostri culmen, ♂ 30; Wisconsin, M. Sthm. Alii, ex Pennsylvania?, paullo minores. In hac, ut in var. majore, rectrix media proxima (ab extima, 4:ta), saepe, juxta apicem, plus minusve albonotata (♂♀ ex Wisconsin, M. Sthm.).

Var. minor: meridionalis et occidentalis, ala 120 mm. vel paullo minor (sed "4 p. 3 lin." = 111 mm, *Mus. Hein.* 66, Nota: veris. lapsu calami, vel specimen juvenile?). Maculae alarum paullulo minores quam præcedentis, sed multo majores quam seqventis; *gastræum* plerumque sordidius; plumæ dorsi quædam latius et sinuatim nigrae. Culmen

rostri ♂ 27 imm. *California* M. Sthm. — *P. auduboni* Sw. (etiam *P. and.* Trud.; v. supra); — *P. cuvieri* Malh. 85, t. 22, ♀, ala 115 mm. — Huc etiam referendus videtur *P. hyloscopus* Mus. Hein. 69, Nota; specimen ventre inquinato.

42. *PICUS harrisii* Audub.; Malh. I, 73, tab. 20; — Mus. Hein. 68. — Simillimus *P. villosi*, differt vero pictura alba minore minusque pura. Remiges maximae (4—6) maculis externis parvis (non ultra 3 mm latis), tantum 5 v. 6: basalis occultata; nulla ad apicem sita. Tectrices tantum 3—5 seriei mediae striola alba, in medio apicis pictæ; tectr. majores minoresque omnes et pennæ cubiti 2 v. 3 postremæ immaculatæ. Gastræum totum albido griseum, plerunque inquinatum. Rectrices ut præcedentis; sed, penna a laterc 3:a apice multo brevius albida; 4:ta semper tota nigra. Magnitudo variat; ala 123 mm. Malh.; 126, Baird; 129 M. Sthm. Rostri proportio ut in precedenti et eodem modo variabilis. Diff. sexus et aetatis ut præcedentis. — America Septentr., ad occidentem: *California*; *Ins. quadra* (Mus. Stockh.).

43. *PICUS jardinei* Malh. I, 103, t. 25. — Mus. Hein. 69. — Supra niger, alis antice immaculatis; plumis dorsi, inter scapulas, apice albis; gastræo toto sordide albido griseo. Parvus: Ala, ♂ 117, ♀ 112 mm (junioris? circa 100). Mus Berol. — Differentia sexus et aetatis ut in *P. villosi*. (Mas junior, in Mus. Berol., plaga verticis maxima, splendide rubra, albomixta). Simillimus *Pico harrisii*, vix ab eo distinctus; idem habetur a Cabanis, Journ. 1862, 175. Remiges et rectrices ut in eo pictæ. Striolæ paucæ nigrae ante latera pectoris observantur, quales etiam in *P. harrisii* adsunt. — *Mexico*.

44. *PICUS pubescens* L. — Malh. I, 119, t. 29; — Mus. Hein. 62. — Rectrices laterales utrinque 2 albæ, nigrofasciatæ; 3:ta fere dimidiata alba; 4:ta ad apicem albido marginata; media tota nigra. Parvus: ala circa 92 mm. (♂ 96; 95; ♀ 93; 88, M. Sthm.). Picturæ, præter caudam, similis *P. villosi*. Dorsum eodem modo album; alarum tectrices et remiges ut in illo albomaculatae; gastræum album, sed, præsertim in meridionalibus grisescenti-inquinatum. Striolæ nullæ ad latera pectoris. *Mas* senior fasciæ occipitis rubra, non interrupta; plumis, ut in præcedentibus, tricoloribus. Fasciæ rectricum angustæ, maxime variables, plerunque 2: apicalis integra, altera late interrupta. In ♀ juniore plerunque 3, latiores, sed prima tantum constat macula interna. — *America Septentr. sylvatica*, tota.

Huc referendi sunt: *P. medianus* Sw.; Malh. p. 122; "remige 2:da longiore quam 7:a" et pileo albomaculato; — et *P. meridionalis* Sw.; Malh. p. 124; specimen gastræo inquinato. — *P. lecontei* Jones; Malh. 182 t. 40, habendum est *P. pubescens* cui amissus est hallux; unicum specimen, ♂, in Georgia inventum dicitur.

45. *PICUS gairdneri* Audubon; — Baird, Report 91; — Malh. p. 123 (icone nulla). — Simillimus *P. pubescens*; differt pennis cubiti ultimis et tectricibus alæ, extus, non vel parum albonotatis; gastræo infuscato (inquinato?), ad latera striolis obsoletis fuscis notato. Rectrices laterales, utr. 2, fasciis duabus, nigris, integris. Ala 95—120 mm. —

California, Oregon. (Hæc avis, teste cl. Baird, a *P. pubescenti* eodem modo (patriâ et picturâ) differt, ac *P. harrisii* a *P. villoso*, et eodem jure sp. *distincta* habetur. Specimina meridionalia (*californica*) typica habentur; reliqua (ex Oregon) paullum differre dicuntur, suntque:

45 b. *P. homorus* Mus. Hein. 65 (Dryobates; — ex Baird, in deser. cit. præcs, var. *septentrionalis* ex *Oregon* et *Washington* Territ.): exacte mediū dicitur inter *P. gairdneri* propr. (e California) et *P. pubescentem*. Subtus purius albus; maculæ albæ remigum et tectricum majores et plures quam in *P. gairdneri*, minores et pauciores quam in *P. pubescente*. Tamen non rite descriptus et, ut insufficienter cognitus, iterum examinandus. Hic, in Mus. Hein. multo major dicitur Pico *gairdneri* (ala hujus 92 mm, illius 109); quæ vero differentia in expositione Bairdii non certe elucet.

Pici species omnino incertæ, vix a *P. pubescenti* distinctæ, sed ulterius examinandæ, sunt:

45 c. *P. turatii* Malh. I, 123, t. 29. — Simillimus *P. pubescenti*, a quo vix distinctus videtur; sed paullo minor dicitur (ala 87 mm), maculis albis fere majoribus; vitta postoculari et v. malari paullulo brevioribus, neque cum nigredine cervicis confluentibus. — E *California*. Malh.

45 d. *P. leucurus* Princ. Paul de Würtemb., Hartlaub Naumannia 1852, 2 p. 55. — Malh. I, 122. — "Cauda tota alba", "affinis *P. gairdneri* Aud." nec ulterius descriptus. Ex montibus "*Rocky mount.*" dictis. [An cauda albinismo vel defectu alba?].

b. *Gastræo sordide albido, nigromaculato.*

Sp. parvæ, superne fuscae vel nigræ, dorso medio scapulisque (præter sp. 47) albo fasciatæ vel maculatis. (Incolæ Americae calidioris, ibique analogæ sp. parvis, indicis, infra n:o 76—86). — *Dictyopicus!* Malh.; *Dictyopipo* Mus. Hein. 74.

*) Rectrices mediæ immaculatae, nigræ vel fuscae.
Sp. omnes ex *Mexico* terrisque adjacentibus; inter se simillimæ.

46. *PICUS scalaris* Wagler Isis 1829, p. 511 (ex Licht. in M. Berol.); — Malh. I, 116, t. 27; — dorso, c. tergo scapulisque, usque ad cervicem, crebre albo-fasciato. Subtus sordide albidus, maculis parvis rotundatis, crebre nigroguttatus, ventre medio immaculato; rectricibus lateralibus albis, fasciis pluribus, latis, nigris. — Parvus: ala ♂ 100 mm; ♀ 89. [ala 108 mm. Malh., an lapsu?]. Pileus *maris* totus ruber, puneto pluramarum medio albo, ut in præcedentibus; — *feminæ*, totus niger. — Fasciæ dorsales albæ et nigræ æquales. Uropygium nigrum, immaculatum. Alæ nigræ, albomaculatae, maculis tectricum rotundatis, diam. 3 mm; nulla ad apicem remigum 3—6. Remiges 3—6 subæquales; 2 = 8. Maculæ pectoris latit. 1 v. 2 millim.; hypochondriorum majores, transversæ, sed obsoletiores; crissi, cordatae, pectoralibus parum majores. Vitta postocularis et vitta malaris subæquales, postice non conjunctæ et a nigredine cervicis distinctæ. Rectricum extima alba, basi, intus nigra; dein fasciis 4 vel (in ♂) 5 nigris; quarum prima (vel etiam 1 et 2, basim propiores) in pogonio externo deest. Penna 2:da basi latius nigra; dein fasciis 3 v. 4 nigris, eodem modo imperfectis. Tertia nigra,

tantum pagonio *externo* plus minus late et sinuatim, vel maculatim, albolimbata (interdum tantum maculis 2 majoribus juxta apicem pennæ notata; interdum maculis 4 v. 5 cohærentibus, secundum marginem fere totum externum; sed pagonium internum totum nigrum). Pennæ 4 mediae nigrae, immaculatae. — *Mexico*, ad meridiem (Xalapa Mus. Berol; Vera-Cruz M. Sthm.).

Obs. *Picus scalaris* Baird, Report p. 94, ex Texas, ab avi mexicana differre videtur. Remiges enim 3 et 4 ceteris longiores, 2 et 5 parum breviores (i. e. 2—5 subæquales). Fasciae rectricum lateralium in pogoniis externis plures, quam in nuper deser. (quod bis, pro singulis pennis describitur: "fasciæ albæ, in rectr. extima, 6 pogonii externi, 4 interni; in rectr. proxima, 6 externi, 3 interni; 3:tia extus maculis 5, intus, ad apicem, unica"). Vittæ capitis laterales ut in *P. nuttallii* describuntur; maculæ pectorales oblongæ. Magnitudo *P. scalaris* nostri (ala 94, 101 mm).

Etiam *P. scalaris*, Mus. Hein. pag. 75, differre videtur: rectrice tertia nigra, tantum intus, juxta apicem, maculis 2 albidis notata.

46 b. *P. bairdii* Scaler; Malh. I, 118, t. 27; — Mus. Hein. 76; — ex *Mexico septemtr.*, a *P. scalaris* non diversus a Malherbio habetur; nec differre videtur, nisi pileo *maris* antice nigro, postice tantum, sed late, rubro [quod forte differentiam ætatis indicare posset?]. Altera nota, quæ in Mus. Hein., l. c. ut *Pico bairdii* peculiaris habetur: "rectrix tertia nigra, tantum extus, ad apicem, albomaculata", egregie in *P. scalarem* convenit. — Avis igitur ulterius examinanda.

46 c. *Picus vagatus* Cassin Philad Proc. 1863, 196; — a *P. scalaris* præsertim magnitudine minore differre videtur: ala 88 mm. — *Mas* similis *P. bairdii* dicitur. Pileus ut in præcedentibus. Vitta malaris et vitta pone oculos nigrae, regione intermedia et stria superciliari sordide albidis. Fasciæ dorsi albæ et nigrae subæquales; uropygium nigrum; alarum tectrices maculis rotundis albis. Subtus sordide albidus, maculis crebris, rotundatis et irregularibus, in lateribus transversis. Rectrices nigrae; laterales, utrinque 2, fasciis albis (non ulterius descriptis). — Hab. in *Mexico* (Cassin, l. c.).

47. *PICUS nuttallii* Gambel; — Malh. I, 100, t. 24. — Superne nigrofuscus, albofasciatus: fasciis albis angustioribus quam interjectis, nigris, et in dorso antico, juxta cervicem, plumis paucis, pure nigris, occultatis. Subtus sordide albidus, ad latera pectoris maculis oblongis (longit. 4—5 mm), et pone has, in hypochondriis, fasciis nigris pictus. Rectrices laterales albæ, fasciis fere 3 nigris, angustioribus, pone medianam pennam sitis. — Rectrix extima tantum basi, intus, nigra, dein alba; fascia prima ad $\frac{3}{5}$ pennæ, in pagonio interno sita; in pog. externo macula parvâ vel nulla adest. Fascia secunda plus minusve interrupta; tercia prope apicem sita, integra. Penna 2:da intus, ultra medium, nigra; dein, ut extima, fasciata. Tertia nigra, apicem versus late, (in utroque pagonio) oblique alba, maculis, vel fasciis interruptis, fere 3, notata. Rectrices 4 mediae nigrae, immaculatae. — Præcedente major: ala, ♂ 106 mm (Malh.); ♀ 99 (M. Sthm.). Remiges 3—5 subæquales, 2>8. Rostrum longius (culmen ♀ 22 mm). Pileus *maris* antice niger, punctis albis maculatus, postice late ruber; *feminæ* totus niger. Vitta postocularis latior, postice cum vitta malari conjuncta sed a nigredine

cervicis distincta. Ambæ pure nigræ et simul ad latera guttulis continuatæ. Alarum tectrices, fere omnes, maculâ apicis transversa, cordata, fasciaque obtecta, albæ, ornatae. Uropygium pure nigrum. Crissum fasciis maculisque transversis fuscis varium. — Habitat in *California*.

47 b. *P. lucasanus* Xanthus; — Malh. p. 166, absque icone; — ex *California meridionali* (Cap. S:t Lucas); a præcedente differre dicitur: pogonio externo rectrium minus nigropicto; nam in penna extima et secunda, tantum fascia ultima, in 3:ta, nulla, per pogonum externum extenditur. Capitis latera ut in *P. scalaris* picta. Magnitudine inter *P. scalaris* et *P. nuttallii* medius dicitur, sed pedes fortiores quam eorum. Pileus totus plumulis rubris, sparsis, ornatus; quæ res indicat, specimen unicum cognitum avem esse juvenilem. An re vera a *P. nuttallii* distinctus?

48. *PICUS stricklandi* Malh. R. Zool. 1845; — et Monogr. I, 108, tab. 28. — *Threnopipo str.* Mus. Hein. p. 71. — Superne obscure fuscus alis antice dorsoque immaculatis. Subtus albidus, crebre fuscomaculatus: maculis juguli parvis, angustis; pectoris antici cordatis, ventris reliqui latius transversis. — Ala, ♂ 110 mm (Mus. Britann.; 115 Malh.). Pileus et uropygium pure, nitide nigra. *Mas* occipite rubro. Vitta malaris longa et vitta postocularis latissima, fuscæ, distinctæ. Remiges maculis albæ, extus paucis parvisque, intus majoribus, notatae. Rectrices nigrofuscæ; laterales, utrinque 2, late albæ, fuscofasciatæ; 3:ta extus maculis 1 vel 2, parvis, albidis notata; 4 medie immaculatae. — *Junior*: mas, pileo fuscescente, plumis rubris maculato; — femina, dilutius fusa plumis dorsi medii albofasciatæ (Malh.). — *Mexico*.

*) Rectrices omnes fasciatæ vel albomaculatae.

Sp. Americæ *meridionalis*, inter se parum distinctæ.

49. *PICUS lignarius* Molina; — Lath.; — Malh. I, 109, t. 26; — Mus. Hein. 78 (Dietyopipo). — Supra niger, albofasciatus; subtus albidus, crebre, late nigrostriolatus; pileo *feminæ* pure nigro, antice paulum fuscescente; *maris* nigro, praesertim antice, alboguttato vel striolato, fascia occipitis rubra; *junioris* fere toto rubrovario. — Latera capitis alba, vitta postoculari lata, nigrofusca, longa; *mali* paulo angustiore, nigra, albovaria. Dorsum totum cum uropygio fasciatum; alæ albomaculatae. Striolæ nigræ gulae jugulique tenues; pectoris latiores, per totam plumam excurrentes. Crissum fasciatum. Rectrices omnes nigræ, albofasciatæ; mediæ fasciis 6, tantum seapo interruptis; extima fasciis 5 integris. Rostrum obscure fuscum, culmine 20—22 mm. Ala ♂ 92, ♀ 95 mm. (Mus. Sthm.). *Chili*. (Id. Mus. Berol; — Mus. Brit. ex *Chiloë*: ♂ striolis pilei nitidis, non albis; id. Mus. Leyd.).

50. *PICUS mixtus* Bodd. (ex Pl. Enl. 748): — Mus. Hein. 76. — *P. bicolor* Gm; — Malh. I, 137, t. 34. — Superne nigrofuscus, albidofasciatus, subtus albidus, longitudinaliter fuscomaculatus. — Pileus fuscus: *maris* albomaculatus fascia occipitali angusta rubra; in *juveni* totus rubrovarius; *feminæ* totus fuscus. Alæ albomaculatae; uropygium evidenter albofasciatum. Vitta postocularis lata, brevior quam in præcedenti, maculam magnam, oblongam formans; dilutius fuscæ. Vitta malaris angustior, elongata, maculis parvis, fuscis composita. Gastræum omnino ut in præcedente pictum, sed maculæ fuscæ, nec nigrantes;

majuseculæ, oblongæ, in apicem plumarum excurrentes. Rectrices nigrofuscæ, fasciis albidis 6 (et 5), latis et exakte ut prioris formati. — Hæc sp. a præcedente vix differt, nisi colore fusco pro nigricante, præsertim pilei et vittæ postocularis. Rostrum quoque paullo minus: culmine ea 18 mm. Ala 85,—90 mm. — Hab. in *regione Platensi* (Montevideo; forte etiam Paraguay, (Az.). — Mus. Berol.; Leyden).

51. *PICUS cancellatus* Wagl. *Isis* 1829, 510; — Mus. Hein. 78. — *P. wagleri* Malh. I. 112, t. 29. — Simillimus præcedenti, a quo tamen differre videtur: maculis gastræ fuscis parvis, apices plumarum non attingentibus; plerisque oblongis; lateralibus vero transversis vel angulatis. Reliqua pictura capitis, corporis, caudæ ut in descr. præcedentis. Hab. in *Brasilia meridionali* (San Paolo; Mus. Berol). Parum sane a præc. differt; nec patria multum distat. Differentia igitur specifica paullum dubia appetit. In sp. Musei Berol., ♂ adultus occipite latius rubro, ♂ juv. plumis pilei, puncto medio albo apiceque rubro ornatis, agnoscuntur.

2:o. *Vittâ postoculari nullâ.*

52. *PICUS querulus* Wils. — Malh. I, 134, tab. 31. — *P. borealis* (nomen ineptum) Vieill. N. Dict; — Enc. 1304; — Mus. Hein. 70 (*Threnopipo bor.*). — Superne niger, albofasciatus; alis maculatis; subtus albus ad latera nigroguttatus. — Pileus niger; in *Mare striolâ* ad latera occipitis rubra (ut in sp. parvis, asiaticis, plerisque inter 73 et 86). *Juvenis* vertice rubrovario. — Latera capitis tota alba; vitta malaris lata, nigra, ad alas ducta. Maculae gastræ, ♂ rotundatae, ♀ transversæ. Uropygium nigrum. Rectrices laterales, utr. 2, albæ, fasciis 3 vel 4 nigris, in pog. externo imperfectis vel nullis. Penna 3:tia pog. externo, majore parte, albo maculisque apicis interni 2 v. 1, albidis; 4 mediae nigrae, immaculatae. — Ala 120 mm. Cauda 85. Rostrum paullo tenuius quam præcedentium; sed tamen hujus, nec sequentis Tribus. Ale et rectrices mediae elongatae ut in sp. Tribus sequentis. — Habitat in *America septentrionali*, meridiem versus (vix supra 40^o lat.).

Sectio 3. Sp. *tetradactylæ veteris orbis.*

Ab americanis (Sect. 3) differunt: vel ventre rubropicto, vel pileo antice pallido, postice nigrocincto.

1:o. RUBRIVENTRES:

criso rubro; pileo nigro, vel rubropicto. Vitta postocularis nigra nulla. Rectrices mediae totæ nigrae (præter sp. 2 ultimas: 69, 70).

a) *Plaga scapularis magna, alba.*

Dorsum, cum tergo, totum nigrum, immaculatum.

) Linea malaris nigra cum nigredine occipitis conjuncta; dein ad latera gutturis continuata, discreta. (Albedo igitur capitis lateralis a plaga alba in lateribus colli discreta). — *Dendrocopus Koch*; M. Hein. p. 30.

53. *PICUS major* L. — Malh. I, p. 56, t. 16. — Fascia antepectoralis nulla; rostrum crassius, lateribus tumidum. — Supra niger,

fronte antica, brevi, albida. Pileus niger; in *Mare* fascia occipitis rubra, in *femina*, nulla adest. Juvenis anni, ♂♀, pileo rubromaculato. — Plaga scapularis magna et maculae remigum albae, supra descripte. Latera capitis pure alba. Gastræum album, non maculatum, sed plerumque a resina arborum sordidum; criso toto saturate rubro. Linea malaris lata, pure nigra, ad latera juguli desinit, nec in fasciam ante pectus continuatur. Rectrices 4 mediae nigrae; reliqua (utr. 3) extus late albae, fasciis 2, vel in extima 3, nigris. (4:ta interdum quoque apice alba). Rostrum et pedes obscuri. Ala (♂♀) circa 138 mm. — Habitat in *Europa* fere tota et *Sibiria* (tota: Pall. Midd.). Sequentes vero (sp. 54—59 vel plures) vix nisi formæ ejusdem variæ, meridionales, habendæ.

54. *PICUS lucianii* Malh. p. 63, t. 17. — Simillimus *P. majori*, sed paullo minor, ala 128 mm; criso cum ventre medio et tibialiis rubris; rostro paullo longiore; lateribus capitis gastræo sordide fulvescentibus. — *Mas* fascia occipitis rubra, paullo latiore. — Ex *China* (Swinh. Z. Pr. 1863, 268). Antea non nisi unicum specimen, in Museo parisiensi, cognitum. Malh.). Vix nisi varietas *P. mandarinii*, Swinh. l. c.

55. *PICUS gouldii* Malh. p. 62, t. 17; — Mus. Hein. l. c. — *A. Pico majori* differt gastræo fulvo, criso cum medio ventre rubris. Latera capitis alba, macula media (auris) magna, grisea. Fascia antepectoralis nulla. (Malh.). Ala 131—135 mm (Mus. Hein.). — *China*. — Est "varietas sequentis" Swinh. l. c.; nec differt nisi picturæ antepectorali nulla rubra.

56. *PICUS mandarinus* Malh. p. 61, t. 17; — Mus. Hein. — Fascia antepectoralis ad latera nigra, medio rubra. Gastræum sordide fulvum et macula auris magna, grisea, albocineta, ut in præcedente. Rostrum longius quam r. *P. majoris*, paullum depresso, carinis nasalibus latius a media distantibus, fere ut in sp. *tridactylis*. Ala 130 mm. Diff. sexus ut in præcedentibus. — *China* (Mus. Berol.).

57. *PICUS cabanisi* Malh. p. 60, t. 17. — A *Pico majore* vix differt nisi fascia antepectorali, medio interrupta, antice medioque rubro maculata, et magnitudine paullo minore: ala 125 mm. Latera capitis pure alba. Etiam guttur et venter anterior purius alba. ♂ occipite rubro. — *China* (Etiam hic varietas præcedentis, a Swinhœ; l. c. habetur).

58. *PICUS numidicus* Malh. 65, tab. 18. — Fascia antepectoralis integra, rubra, (in ♀ latior, nigrovaria). Latera capitis pure alba. Gastræum sordide album, criso ventreque medio rubris. Occiput *Maris* rubrum, *feminae* colore pilei. Ala ♂ 125, ♀ 123 mm (M. Sthm. — 127 M. Hein.). Rostrum plerumque longius quam rostrum *Pici majoris*, sed sat variabile; semper angustius, lateribus ad $\frac{3}{4}$ rectis, apice cuneato-attenuato. — *Algieria, Tanger*.

59. *PICUS himalayensis* (Jard. et Selby); Malh. 67, t. 19. — Mus. Hein. l. c. — Iterum simillimus *P. majori*, a quo præsertim differt pileo *maris* toto (præter frontem, brevius albidi) rubro, lateribus anguste nigrocincto (ut in hornotinis *P. majoris*). Etiam paullo minor: ala 130 mm. — Gastræum sordide album, criso, (non vero ventre medio) rubro; fascia pectoris nulla. Plumæ quædam, in plaga alba,

scapulari, nigrolimbatae. Vitta malaris nigra minus late cum nigredine cervicis conjuncta. Rectrices ut in P. majori, sed 3:tia vix nisi puncto, vel limbo minimo, pallido, ad apicem pista. Rostrum paullo longius, lateribus rectis (ut in praecedenti). *Femina* pileo nigro. — *Himalaya*. Specimina vidi in Mus. Britannico, Leydensi et Berolinensi).

“) Albedo capitis collique lateralis continua, non in duas partes divisa; linea enim malaris cum nigredine cervicis non conjuncta. Rectrices laterales nigrae, pictura alba minore.

60. *PICUS assimilis* Natt. — Malh. I, 69 t. 19. — Mus. Hein. 37 (*Dendrocopus*). — Picturā omni similis praecedenti et P. majori, praeter rectrices laterales, utrinque 2, nigras, extus fasciis sub-3 albis, nigredine interjecta non vel parum latoribus. Pileus *maris* ruber (non nigrocinctus); *feminæ* niger. Minor: ala circa 120 mm. — *Kashmir* (Brit. M.).

60 b. *P. scideanus* Horsf. & Moore Catal. II, 671; — Malh. I, 73 (icone nulla); — Mus. Hein. 42. — Descriptio (Horsf. et Moorei) nimis manca, nullam differentiam a P. assimili exhibet: “similis P. medio, sed minor, pileo toto rubro. Latera corporis non roseo induta, sed sordide alba. Linea lata, nigra, a basi maxillæ inf:s ad latera colli. Ala 4 $\frac{1}{2}$ poll. Angl.” (116 mm). — *Scinde* (v. *Sinde*, ad fl. *Indum*. — Horsf. et Moore).

61. *PICUS syriacus* Hempr. et Ehr. Symb. — Malh. p. 95, t. 20; — Mus. Hein. 42 (*Dendrocoptes syr.*). — Rectrices omnes nigrae; extima fasciis 2 macularibus apiceque albis; 2:da apice extimo maculaque externa parva, albis; 3:tia interdum apiculo albo. — *Nigrofuscus* (capite alisque, actione solis aërisque in habitu juvenili?, decoloribus, fuscis). Gastræum album, haud nigrostriolatum, fascia antepectorali, maculari crisoque pallide rubris. Plaga alba scapularis minor quam sp. affinum. Pileus fuscus, plaga maxima rubra (praeter dubium signum avis *junioris*, neque sexus masculini adulti). Ala circa 122 mm. (Mus. Berol.). — *Syria*—*Persia*.

61 b. *P. felicia* Malh. p. 127, t. 28; — Mus. Hein. 30 (*Dendrocopus*). — Niger et albus, ut P. major (nec fuscus); fascia pectoris nulla; plaga scapularis magna (vel major quam P. majoris); crissum pallide rubrum (in descr. Malh. l. c. crissum “minus late rubrum” dicitur; sed in iconē cit. color ruber latius extensus exhibetur). Rectrices omnes nigrae: extima fasciis 2 albis; 2:da, extus maculis 2 parvis, vel etiam immaculata. Pileus niger; occiput in *mare rubrum*. Ala 130 mm. — Hab. in *Syria* et circa urbem *Mosul* [ad Tigrim, Kurdistan]. Malh. — Hunc ipse non vidi, sed tamen suspicari licet, eum nil esse, nisi statum perfectum, seniorem, praecedentis. Specimen, a Malh. l. c. pro juvēne hujus descriptum et pictum, vix, nisi P. himalayensis (n:o 59) esse potest.

62. *PICUS darjilensis* Blyth; — Mus. Hein. 36 (*Dendrocopus*). — *P. majoroides!* Hodgs. — Malh. I, 70, t. 16. — Gastræum fulvum, totum creberrime nigrostriolatum (vel longit. maculatum), praeter gulam albidadam et crissum, saturate rubrum. Rectrices laterales, utrinque 3, fasciis albis, minus latis. Plaga scapularis alba minor. *Mas* occipite

late rubro. Magnitudo præcedentium: ala 127—130 mm. — *Nepal, Sikim.* (Mus. Britan.; Berol.; Leydense).

63. *PICUS cataphoricus* R:bch: *P. cathpharius!* Hodgs. et Auctt. — Malh. 104, t. 22; — Mus. Hein 51 (*Xylocopus*). — Gastræum fulvescens, gutture immaculato, ventre crebre nigrostriolato, ante latera pectoris leviter rubido-mixto; crasso pallide (vel obsolete) rubro, parcius nigrostriolato. Plaga scapularis parva. Rectrices nigrae: extima et 2:da fasciis subintegris, 3:ta maculis pogonii externi, albis. Similis præcedenti, sed multo minor: ala c:a 100 mm. *Mas* occipite late rubro. — *Nepal, Bootan.* (Mus. Berol.).

Obs. *Picus khan*, Philippi, Archivio per la Zool. etc. Modena 1864, ex *Persia*, memoratus in Ibide 1864, p. 400, ut: "affinis *P. syriaco*, *P. himalayensi* et cet."; avis vero ejusque descriptio nobis in cognitæ.

b) Dorso nigro alboque; plaga scapulari nulla.

) Majores, dorso non fasciato, antice nigro, tergo albo.

(*Dendrodromas* Mus. Hein. 38).

64. *PICUS insularis* Gould. Z. Proc. 1862, 283; — Mus. Hein. l. c. — Supra niger, plumis tergi inferioris apice albis; lateribus colli nigris. — Similis *P. leuconoto*, sed nigrior et minor: ala 125 mm. Pileus nigro rubroque varius (junior). Plumæ scapulares apice albo-maculatæ. Subtus fulvescens, lateribus nigrostriolatus; crasso dilutius rubro. Plumæ paucæ ventris pallide roseotinctæ ét, pro fascia antepectorali, quædam adhuc pallidiores. Guttur album; linea ordinaria nigra ad latera juguli non distincta, sed cum nigredine cervicis confluens, unde latera colli tota nigra. Rectrices nigrae; externæ, utrinque 2, apice albido-fasciatae; reliquæ immaculatae. — Ex insula *Formosa* (Mus. Hein.). [Picturâ fere medius inter præcedentes et sequentes videtur; sed re vera non est nisi forma *P. leuconoti* meridionalis, picturâ nigra fortiore, alba restrictiore].

65. *PICUS leuconotus* Bechst. — Malh. I, 89, t. 23. — Mus. Hein. l. c. — Dorso anteriore nigro, tergo toto albo. Subtus albus, lateribus nigrostriolatus, crasso ventreque medio pallide rubris. Rectrices laterales, utrinque 2, albæ, fasciis paucis nigris; tertia nigra, maculis 2 vel 3 marginalibus, albidis; 4 mediis totis nigris. — Alarum tectrices mediæ et majores albomaculatae. Linea ordinaria, ab angulo oris ad latera pectoris ducta, fere ut in *P. majori*, cum nigredine occipitis conjuncta et ad latera colli distincta. Frons brevius alba; pileus reliquo maris ruber; feminæ niger. Ala circa 145 mm. Rostrum rectilineare, paullo longius et angustius quam *P. majoris*; forte, medio non compressum, carinis altis. — *Europa orientalis; Suecia* (r.).

66. *PICUS cirris* Pall. Zoogr. I, 410; — Mus. Hein. l. c. — *P. uralensis* Bonap. — Malh. I, 92, t. 23. — Simillimus præcedenti, nec aliud nisi forma ejus orientalis, picturâ alba latiore, nigra minore. Paullo major: ala circa 150 mm. Dorsi pars anterior, nigra, paullo brevior. Striolæ ad latera ventris tenuiores, in mare vetere, magna parte evanescentes. Maculæ alarum albæ majores. Fasciæ rectricum nigrae angustiores, maculares, et rectrix quoque 4:ta paullum albo-

notata. *Habitat* in Sibiria tota. Haec forma re vera a Pallasio loco cit. descripta).

“) *Minores dorso albofasciato.*

(Rectrices mediae in 2 prioribus tote nigræ, in 2 posterioribus, albo-maculatæ. — Dendrotypes Mus. Hein. 46).

67. *PICUS atratus* Blyth. Journ. As. Soc. 1849; — Malh. p. 72; Mus. Hein. l. c. — Similis insequenti, subtus sordide albidus, creberime nigrostriolatus; jugulo parcius striolato; crasso rubro. Rectrices 6 mediae immaculatae; laterales, utrinque 2, minus albo-pictæ quam P. macei, (2:da apice fasciisq. 3 pog. externi, una interni, albis). Ala 118 mm. — *Tenasserim* (Mus. Hein. ex Blyth. l. c.).

68. *PICUS macai* Cuv. Vieill. — Malh. I, 96, t. 24. — Mus. Hein. l. c. — Superne nigro alboque fasciatus, cervice uropygioque nigris; subtus albidus, ventre antice lateribusque parcius nigrostriolato; crasso rubro. Rectrices nigræ: laterales, utrinque 2, albofasciatæ; 3:ta maculis prope apicem paucis, marginalibus; 4 mediis immaculatis. Linea ordinaria nigra ab angulo oris, ad latera juguli dueta, simplex. Pileus maris ruber *feminae* niger. Ala 100 mm. (M. Sthm.; 112 Malh.; 126 M. Hein. lapsu?). — *India* (Bengal. Nepal; Malacca Blyth.).

69. *PICUS analis* Temm. — Malb. I, 99, t. 24. — Mus. Hein. l. c. — Similis P. macei; differt crasso pallide, vel, in juniore, obsolete rubro; rectricibus omnibus albido-fasciatis. (Fasciae in rectr. lateralibus 6, tantum scapo interruptis; in mediis 4, latius interruptis: basali plumis occultata). Striolæ ad latera pectoris antie latiores, nigræ; ad latera ventris angustæ, pallide fuscæ. Pileus maris niger rubromaculatus, *feminae* niger. Ala, ♂♀, 94 mm. *Java* (M. Sthm.); *Sumatra*. (Ins. Philipp. Malh.; an rite?).

70. *PICUS andamanensis* Blyth. J. As. Soc. 1859; — Mus. Hein. 48. — A præcedenti differt crasso intense rubro; rectricibus mediis fasciis interruptis tantum 3. Maculae pectoris antici majores, rotundæ, nigræ, albocinetae. Regio auris nigrostriolata et striolæ ventris laterales evidentiores. Ala 94 mm. — Ex. *Ins. Andamanis*. (M. Hein., ex Bl.).

2:o. VENTRE NULLA PARTE RUBRO.

Pileus pallidus: albidus vel fuscescens, postice late nigrocinctus. — Sp. parvæ, dorso plerisque fasciato; plures fuscæ, neque nigræ. Pileus maris vario modo rubropictus.

a) *Vitta pone oculos nulla nigra* (Sæpius vero macula auris, ab oculo discreta, pallide fusca, adest). — Rectrices mediae tota nigræ, præter sp. 74, intertropicalem.

*) *Purius nigri et albi, fronte alba, pileo posteriore nigro, plaga in vertice maris media, rubra.* Septentrionales Europæ et Asiæ.

71. *PICUS minor* L. — Malh. I, 113, tab. 26. — *Xylocopus m.* Mus. Hein. 51. — Supra niger, dorso albo, interrupte nigrofasciato; subtus sordide albus, ad latera nigrostriolatus. Pileus postice et ad latera, niger; antice, usque ad medium verticem, in *femina*, albus. *Mas* plaga verticis rubra, fronte late alba. Rectrices laterales, utrinque 2,

albæ, basi intus fasciisq. fere 3 nigris; tertia nigra, apice oblique albida; 4 mediae totæ nigrae. Linea ordinaria ad latera genarum, antice pallida, fuscescens; postice nigra, in lateribus colli angulatim dilatata. Ala ciriter 90—93 mm. — *Europa* fere tota.

Var. meridionalis Malh. I. cit.; t. 26; (*P. ledouci* Malh. olim); — paullo minor: ala 87 mm; colore nigro saturiore, maculis nigris magis definitis. Etiam plaga rubra in vertice maris paulo major et intensius rubra. Ex *Algeria*.

Var. borealis item agnoscitur colore albo, praesertim gastræ, puriore; pictura dorsi alba paullo majore, fasciis magis confluentibus; maculis nigris minoribus. Rectrices basi paulo brevius nigrae. Plerumque paullo major: ala fere 95 mm. In *Scandinavia*.

72. *PICUS kamtschateensis* Bonap. — Malh. p. 115, t. 26. — Simillimus *P. minori*, praesertim varietati ejus boreali, a quo tamen differre videtur defectu striolarum nigrarum ad latera ventris (saltet in mare vetere; incertum an in femina vel juniore adsint). Rectrices laterales latius albae, 4:ta etiam ad apicem albidonotata. Ala 97 mm. Ex *Kamtschatka*. (Unicum speciem masculinum cognitum; Malh.).

“) Fusciores, pileo griseo, postice nigrocineto. *Mas* striola occipitis laterali, vel fascia occipitis, rubra. (Vitta malaris et pictura in genere sequentium). Asiaticæ.

73. *PICUS canifrons* n. sp. dorso anteriore albo, (fasciis inter scapulas nigras plane nullis). Pileus griseus, postice late nigrocinetus. *Mas* striola ad latera occipitis rubra ventreque toto sordide albo, immaculato; *Femina* striola rubra nulla; ventre toto cerebre nigrostriolato. Rectrices laterales, utrinque 3, extus late albae, extima fasciis 2 fuscis; reliquæ (4 mediae) totæ nigrae. Alæ pure nigrae, albomaculatae. Vitta malaris fusca. Macula auris major, pallide fusca, adjecta macula minore, nigra, post aurem. Ala, ♂ 102, ♀ 99 mm. — *Junior* striola rubra ad latera capitis, ut in mare; ventre nigrostriolato ut in ♀. — Habitat in *China septentrionali* (Peking; Mus. Paris).

74. *PICUS auritus* (Eyton); — Malh. I, 150, t. 35. — Mus. Hein. 59 (*Bæopipo aur.*). — Superne fuscus dorso tergoque albofasciatis, alis albomaculatis. Latera capitis alba, vitta malari elongata, lata, fusca, sed nulla macula pone oculos. Pileus dilutius fuscus, postice cerviceque nigris, striolaque ad latera occipitis in *mare* rubra. Subtus fulvoalbidus, fusco striolatus. Rectrices fuscae: laterales, utrinque 2, late albae, fusco-fasciate; 3:ta maculis marginalibus 4 albis; 4:ta maculis 3; etiam media (5:ta) macula parva, marginali, ad apicem notata. Rostrum majus, cauda brevior quam afflum. Ala 82 mm. cauda 34. — *Malacca* (Malh.).

75. *PICUS kaleensis* Swinhoe, Ibis 1863, 390; — *Dendrotypes nesiotes* Mus. Hein. 49 (junior); — supra niger (uropygio dorsoque immaculatis) tergo late albofasciato. Pileus antice fuseogriseus, occipite cerviceque nigris. Gastrænum sordide fulvescens, striolis fuscis, in pectore antico latioribus. Alæ extus albomaculatae. Rectrices 4 mediae totæ nigrae; proxima extus pallidimarginata: 4:ta margine latiore, apice fasciata flexuosa pallescentibus; extima apice, fasciis 2 definitis, limboque

basali pallidis. Vitta malaris longa, obscure fusca; alia "ab angulo oculi, per genas, pallide fusca (vitta post-, vel infra-ocularis? "from the corner of the eye across each cheek"). Gula alba. Plumæ subalares albæ, nigrofasciatæ. Striola ad latera ocellis maris rubra. — Orbita nuda fusca. Iris rufescens. Ala ($3\frac{6}{10}$ p.) 92 mm. — Ins. Formosa (Swinh.). — *Junior* (Mus. Hein. l. c.) ventre medio et crasso obsoletius fuscofasciatæ. Rectrices laterales paullo magis fasciatæ, 3:tia quoque maculis marginalibus pallidis. Pileus plumis rubris varius. Latera capitis alba, "vitta subobsoleta latiore, brunnescente, post oculos oriente, utrinque in colli lateribus usque in pectus dedueta." (V malaris, an ulla?). Ala (3 p. 9) 98 mm. — *Formosa*.

b) *Vitta* (vel macula) *postocularis nigra vel fusca* (in ipso margine oculari incepta). — Sp. fuscescentes, subtus pallidæ, crebre striolatae pileo grisecente, postice nigrocineto; occipite, in *mare*, striola laterali vel fascia postica picta. — Omnes Asiatici. Gen. Yungipicus! Bonap.; Bœopipo Mus. Hein. 54.

) Rectrices mediae totæ nigrae. — Sp. *Asiae temperatoris*.

76. *PICUS semicoronatus* Malh. 1848; — Malh. Mon. I, 148, t. 34. — Mus. Hein. — Dorsum nigrofuscum fasciis latioribus albis; tergum et uropygium alba fasciis angustis nigris. Gastræum fulvo-albidum, fuscostriolatum, gula alba. Rectrices 4 mediae nigrae, immaculatae; 3:tia extus paulum pallidimarginata; laterales, utr. 2, fuscae, fasciis 3 albis (in rectrice 2:da tantum pogonii externi). — Pileus griseus; posterius nigrociuctus; occipite *maris* late rubro, *feminæ* nigro. Alæ antice parum albomaculatae. Ala 84 mm. Cauda 41. — *Nepal* et terræ circumjacentes. (Malh.).

77. *PICUS mitchelli* Malh. I, 142, t. 32. — Mus. Hein. l. c. — Superne fusconiger, latius albofasciatus, uropygio (tectr. candæ) cerviceque nigris, fasciis nullis. Subtus albidofulvescens, nigricante striolatus. Vitta pone oculos lata, elongata et stria malaris angusta, brevis, fusca. Rectrices laterales, utr. 2, fuscae, albidofasciate; 3:tia margine externo longiore (apicem versus), maculaque interna juxta apicem, albidis; reliqua, 4 mediae, totæ nigrae (vel interdum 4:ta ad apicem leviter pallidimarginata). Pileus cinerascens, postice latius nigrociuctus et, in *mare*, striola laterali rubra pictus. Ala 86 mm. *Nepal*. (Mus. Britann. Berol.).

78. *PICUS pygmæus* Vig. — Malh. I, 147, t. 34. — Simillimus præcedenti a quo differt magnitudine paullo minore, caudâ breviore; teetricibus caudæ, (ut tergum dorsumque) late albofasciatis; rectrice 3:tia margine externo, apicem versus, brevius albido, interno vero immaculato. Ala 84; cauda 41 mm. — *Nepal*. (Malh., qui specimen Vigorsii descripsisse ait).

79? *PICUS scintilliceps* Swinh. Ibis 1863, 96. — Mus. Hein. l. c. — "Affinis *P. mitchelli*; subtus fusco-ochraceus, nigro longitudinaliter striatus;" "vertice cano." — Reliqua deser. allata huic non peculiaris: "strigis auricularibus mystacibusque griseofuscis; naribus strigaque oculari albis;" "supra maculis fasciisque albis latioribus; occipite nigro, in

maribus solis utrinque flammeo ornato" . (Rectrices non descr.) — "Ala 4 p." (101 mm). *China Septemtr.* (Swinhoe. Mihi ignotus).

80. *PICUS Kisuki* Temm. — Fn. Jap. 74, t. 37. — Malh. I, 154, t. 36. — Capitis latera fusca, striola p ne oculos, superiore, alba (vitta enim postocularis latissima, cum pileo fere tota confluit). Vitta malaris discreta, nigrofusca. Cervix alba, vitta media nigra. Dorsum et ale fusca, albofasciata; gastræum albidum, ventre crisoque fuscostriolatis, gutture pure albo. Rectrices laterales, utr. 2, albæ, nigrofasciatæ; 3:tia limbo externo, lato, undatum albo; 4:ta angustius albomarginata; media tota nigra. *Mas* striola rubra temporali distinctus. Ala 79 mm; c. 45. — *Japonia*. (Mus. Leydense).

**) Rectrices omnes albifasciatæ vel maculatæ. — Sp. *Asiae tropicæ*.

81. *PICUS meniscus* Malh. I, 151, t. 35. — Mus. Hein. — Superne, cum cervice et uropygio, nigrofuscus, albofasciatus. Ala albo-maculata. Subtus fulvoalbidus, nigrostriolatus, gula purius alba. Pileus cinereus, posterius late nigrocinctus, et, in *mare*, fascia occipitis rubra, non lata. Vitta pone oculos latior et vitta malaris angusta, fuscae, elongatae. Rectrices omnes nigrofuscæ, fasciis 2 interruptis, punctisque 2 ad apicem, albis. (Fascia rectricum tertia, verisimiliter adest, basi, obtecta) — Tectrices caudales in iconæ cit. albæ, macula media nigriante. Ala 82 mm. C. 40. — *Bengalia* (Malh.).

82. *PICUS gymnophthalmus* Blyth. Journ. As. Soc. 1849; — Malh. p. 153, fig. nulla; Mus. Hein. p. 59. — Superne fusconiger, albofasciatus, alis antice vix maculatis, remigibusque primariis extus parum maculatis. Pileus obscure fuscus, postice purius nigrocinctus et, in *mare*, striola lateralí rubra ornatus. Subtus sordide griseo-albidus, fere immaculatus, vel, in *juniore*, striolis angustis dilutius fuscis; gula alba, immaculata. Vitta pone oculos lata, nigrofusca; vitta malaris obsoletior, angusta. Rectrices breviores, nigricantes; omnes, extus intusque, maculis 3, parvis, marginalibus, albidis. Ala 75 mm. — *Ceylon* (Mus. Britann. et Berol.).

83. *PICUS nanus* Vigors, Z. Pr. 1831, 172; — Malh. I, 145, t. 33. — Mus. Hein 57. — *P. hardwickii* Jerdon Ind. I, 278. — Pileus fulvo-fuscus, postice vix nigrocinctus, sed in *mare* striola lateralí ord. rubra pictus. Corpus superne obscure fuscus, albofasciatus (uropygio quoque albomaculato), alis antice parum maculatis. Venter fulvoalbidus: in *juniori*, dilutius fuscostriolatus, in *seniore* striolis tantum paucis, fuscis, in lateribus crisoque. Vitta postocularis lata, elongata, rufescens fusca; vitta malaris angusta, præsertim antice obsoleta. Rectrices omnes nigricantes fasciis interruptis 3 et, præter 2 medias, punctis juxta apicem 2, marginalibus, albis. Ala 75 mm. — *India propria*, fere tota. (Malh. Jerd. Mus. Hein.).

Obs. *P. otarius* Malh. I, 152, t. 35, et *P. freniger* Reichbch Handb.; Malh. p. 141 absq. fig., vix dubie sunt *P. nanus* junior. — Idem videtur *P. moluccensis* Gm. Lath. 25 (ex Buff. et Pl. Enl. 748, 2).

84. *PICUS variegatus* Wagl. Syst. sp. 27; — Malh. I, 139, t. 33; — Mus. Hein. 54. — Superne fuscus, in dorso latius, in uropygio crebrius albofasciatus; pileo cinereofusco, postice latius nigrocincto,

striola maris ordinaria laterali, rubra. Subtus sordide albus, fuscostriolatus, (ventre medio fere immaculato). Vitta pone oculos lata et vitta malaris paullo angustior, saturate fuscæ, usque ad alas ductæ. Rectrices omnes fuscæ, fasciis interruptis albis: in mediis 2, in reliquis 3 et summus apex albidus vel albdomarginatus. Ala 75 mm. C. 45. — *Java, Borneo* (Mus. Leyden. et Berol.); *Sumatra* (M. Hein.).

84 b. *PICUS canicapillus* Blyth. — Malh. I, 141 (icone nulla); — Mus. Hein. p. 58. — Simillimus *P. variegato*, a quo vix differt nisi rostro magis albido et vitta postoculari pallidiore. (Malh. ex Blyth. — Differentia magnitudinis et coloris pilei primum a Blyth memoratæ, dein ab eo negari videntur. Sp. paullum dubia). *Arracan, Tenasserim.*

85. *PICUS validirostris* Mus. Hein. IV, 60 (Bœopipo). — *P. minor* var. β Lath. (ex Sonnerat Voy. N. Guin. 118, t. 77); — *P. moluccensis* Malh. 143, t. 32 (nec *P. mol.* Gm. Lath. de quo vid. post *P. nanum*, sp. 83). — Supra nigrofuscus, albofasciatus; subtus fulvescenti albus, in gutture inferiore crisoque maculis latis, rotundatis, nigricantibus, in ventre striolis fuscis, maculatus. Pileus dilutius fuscus, postice latius nigrocinctus et, in *mare*, striola laterali, rubra. Vitta postocularis lata, usque ad alas ducta, et vitta malaris angustior, macularis, elongata, nigrofuscæ. Rectrices nigrofuscæ, maculis marginalibus, in mediis, utrinque 3, in reliquis 4 et nota apicis albi. Alarum tectrices minores et remiges primariae pogonio externo vix maculato. Ala 80, 85 mm. C. 40. Rostrum fuseescens. (Mus. Brit. et Berol.). — Ex *insulis Philipin.*

86. *PICUS temminckii* Malh. 1849; — Monogr. Pie. I, 155, t. 36. — Dorso alisque fuscis guttis parvis, albis maculatis; cervice tota alba. — Pileus dilutius fuscus, postice vix obscure cinctus. Vitta postocularis pileo concolor, latissima, postice cum pileo fusco conjuncta. (Latera igitur capitinis, ut in *P. kisuki*, tota fusca, relicta striola superiore, pone oculos, alba). Vitta malaris tantum punctis fuscis indicata. Venter griseoalbidus, striolis latioribus, pallidius fuscis, maculata. Rectrices omnes fuscæ, fasciis 3 interruptis, albidis. Ala 75 mm. (♀, veris. junior, in Mus. Leyd.). — *Celebes.*

Sectio 4. Sp. *tetradactylæ, anomala*, ventre nigro.

87. *PICUS albolarvatus* Cassin, 1850 (*Leuconerpes*); — Malh. II, 221, t. 3 (*Xenopicus*); — Mus. Hein. 74 (*Xenocraugus alb.*). — Supra subtusque niger, capite colloque albis. — Ala 130 mm. *Mas* fascia occipitis rubra, angusta. — Macula albæ nulla. Remiges primariae basi, utrinque, longe albæ; cubitales et rectrices totæ nigrae. — Colore gastræ nigro et notæo pennisque, non albomaculatis, a praecedentibus differt; sed formâ rostri omniumque partium, proportione digitorum et staturâ corporis eis simillimus. Rostrum præsertim rostro *P. leuconoti* simile, nec ut in *P. medio* formatum. — *America septentr. occidentalis* (Oregon, California. Mus. Britann. et Berol.).

TRIBUS 6. *Pici intermedii*

Superne nigri, vel fuscescentes, albo-varii, remigibus ut in Tribu præcedente albomaculatis; corpore subtus albido. Rostrum gracilius, medio leviter compressum; lateribus, ante medium, conico-convexitis (nec ut in præcedentibus: areis 2 planis, in angulo vel carina conjunctis, formatis). Apex rostri acutius cuneatus, lateribus non vel obsolete carinatus. Carina culminis alta, acuta. Max. inf. subtus tereti-rotundata, vix carinata. Alæ elongatæ. Rectrices fortius gradatae, parum tritæ; mediae apice longo, angusto terminatae. (Digitus quartus variat: interdum tertio brevior).

1:o. Sp. *Europæo-asiaticæ*, ventre rubro-picto.
Capitis latera albida, vitta pone oculos nullâ vel obsolete. Dig. 4:tus semper 3:to longior. (Sp. sola europæa, 88, pictura similis P. majori; asiaticæ (89—91) magis variegatae).

88. *PICUS medius* L. — Malh. I, 93, tab. 20. — *Dendrocopæ medius* Mus. Hein. 41. — Supra niger, dorso toto, cum uropygio, immaculato; plaga scapulari magna alba; subtus albidus, lateribus nigrostriolatis, crasso ventreque medio pallide rubris. — Ala circa 125 mm. Pileus ♂♀ ruber. Linea malaris in *mare* vix appetet; in *femina* pallide fulvescens, obsolete. Vitta tamen, secundum latera collis, ad pectus ducta, lata, nigra. Alarum tectrices nigrae, immaculatae. Plaga scapularis, plus quam dimidia parte, a tectricibus magnis, albis formata. Remiges ut in Tribu præcedenti albomaculatae. Rectrices nigrae: extima oblique, dimidiate-alba, fasciis 3 vel 2, imperfectis, macularibus, nigris. Proxima similis, sed brevius alba; tertia, prope apicem, albido marginata vel maculata. *Mas* et *femina* picturæ similes; vitta tamen malari plurunque differunt (v. mox supra). In *juveni* vitta malaris pallide fuscescens et striolæ ad latera ventris obsolete; ala 110. — Habitat tantum in *Europa media*. — Picturam fere Pici majoris gerit, qua re a reliquis hujus tribus paullum differt; formâ vero cum iis congruit et a Tribu præcedenti differt.

89. *PICUS auriceps* Vig. Z. Proc. 1831, 44; — Mus. Hein 45 (*Liopipo*). — *P. brunneifrons* Vig., Gould. Cent.; — Vig. l. c. p. 176; — Malh. I, 107, tab. 18. — Supra niger, albofasciatus; subtus albidus, crebre nigrostriolatus, ventre medio crassoque pallide rubris. Vitta malaris definita, antice fuscescens; dein nigra, simplex, ad alas ducta. — Sinciput fulvo-fuscum; plaga verticis posterior flavescens; occiput *maris* rubrum, *feminae* fuscum. *Junior* pileo toto griseo-fusco. — Latera capitis albida. Alæ albomaculatae. Rectrices nigrae; laterales, utr. 3, fasciis paucis, angustis, albis, pictæ; reliquæ immaculatae. Ala circa 110 mm. — *Nepal "Himalaya"*. (Mus Leydense; M. Berol.).

90. *PICUS hyperythrus* Vig. 1831; — Malh. I, 130, t. 30; — Mus. Hein. 50 (*Xylurgus hyp.*). — Supra niger, albofasciatus; subtus colloque rufus, crasso dilute rubro. Vitta malaris in *mare* nulla, in *femina* et *juniore* brevis, pallide fusca. — Pileus cum cervice *maris* ruber; *feminae* niger, albopunctatus. *Junior* subtus sordide fulvescens,

plumis margine apicis fuscescensibus. — Maxilla superior nigra, inferior albida. Ala antice albomaculata. Uropygium nigrum. Rectrices nigrae; laterales, utr. 3. apicem versus albofasciatæ. Ala circa 120 mm. — *Nepal.* (Mus. Leyd.; M. Berol.).

90 b. *P. subrufinus* Mus. Hein 50 (ex Swinhoe, Z. Proc. 1862, 319 et Ibis 1863, 96: *P. hyperythrus*); — simillimus praecedenti, a quo differre dicitur: "colore [gastræ?] rufo in lateribus colli latius extenso, et dorso magis fasciato;" nec ulterius describitur. — Hab. in *China septentrionali*.

91. *PICUS mahrattensis* Lath. Suppl. 2; — Malh. I, 105, t. 28. — Mus. Hein. 44 (*Liopipo mahr.*). — Dorsum et alæ nigrofusca, cerebro albomaculata, (nec fasciata). Subtus albidus, longit. fuscomaculatus, ventre medio pallidus rubro. Rectrices omnes nigrae, maculis marginalibus, rotundatis, albis, extus fere 5. — Caput pallidum, cinerascens, pileo *maris* pallide rubro, antice flavescente; *feminae* toto griseoflavescente. Gula alba. Plaga, secundum latera juguli sita, fusca, in vittam malarem, antice, præsertim in *mare*, obsoletam, continuata. Ala 100—110 mm. — *India propria*, præsertim meridiem versus; *Ceylon*. (M. Sthm; M. Berol.).

Obs. *Pici* sp., affinis praecedenti, "*Picus blanfordi* Blyth, ex Burmah superiore", nomine tantum memoratur: a Jerdon, B. of India I, 275; Mus. Hein 45.

2:o. Sp. Africanæ, parvæ, ventre non rubropicto, cauda brevi. Rectrices brevius gradatae, sed, ut in reliquis sp., acutæ, Vitta malaris et V. postocularis subæquales, elongatæ. Digitus 4:us tertio multo longior. Color pallens et pictura fere *P. mahrattensis*. Forma rostræ et pictura remigum rectricumque egregie hujus Tribus (Gen. *Ipophilus* M. Hein. 113).

92. *PICUS obsoletus* Wagl. Isis 1829, 510; — Malh. I, 206, t. 45; — Mus. Hein. 113; — Supra griseus, dorso immaculato, alis caudaque fuscis, totis albomaculatis. — Subtus sordide albus, immaculatus. Vitta malaris, ad latera pectoris extensa, et vitta postocularis, paullo brevior, sat lateæ, dorso concolores. Pileus dorso coneolor, sed occiput *maris* lète rubrum. Uropygium indistinctius albidofasciatum, plumis ultimis albidis, fasciis fuscis. Alarum maculæ albidae, in tectricibus parvis magnisque rotundæ. — Remiges maculis utriusque marginis 4 v. 5; rem. maximæ apice longius immaculatae. Rectrices omnes maculis utriusque marginis 5, majusculis. Ala 76 mm. — *Africa occid.* (Senegal).

93. *PICUS hedenborgii* nob. (cf. Malh. sub. *P. obsoletu*). — *P. murinus* Sundev. Vet. Ac, Öfv. 1850, 131 (nec *P. mur.* Malh., infra, n:o 119); — Mus. Hein. 113 (*Ipoph.*); — *P. obsoletus* jun. Malh. I. e.; — Qmni re simillimus praecedenti, praeter gastræum, in pectore toto, lineolis angustis, pallide fuscis, parce striolatum. Striolæ crissi paulo latiores. Etiam parum major: ♂ senior, ala 80; ♀ jun. ala 75 mm. Cauda utriusque 40. — Habitat juxta Nilum album, in terris *Kordofan* et *Sennaar*. (Mus. Stockh. specim. plura a Prof. Hedenborg allata).

Tantum stirps orientalis præcedentis habendus, sed notâ memorata constanter diversus.

Obs. Sp. h. l. allatae plerumque habitu sunt affines Picis fulviscapis (Trib. 8:væ. Sic. Malh., Rüppell, Mus. Hein.); cum quibus forma rostri et patriâ conveniunt. Nimis vero differunt defectu omnis coloris virentis vel flavi, præsertim scaporum, maculis remigum et rectricum formâq. vittæ malaris; quibus omnibus bene cum hac Tribu congruant. — Sed etiam affines videntur Picis parvis, fuscescentibus et brevi-caudatis, in Tribu præcedente descriptis, n:o 76—86. Quorum quidem nullum hodie ad manum habeo, nec nisi pauciores, in Museis exoticis, obiter vidi. Horum igitur formas non sufficienter cognovi.

3:0. Sp. Americanæ, ventre non rubropicto, (sed plerumque flavescente). Cauda longiore. — Capitis latera nigra vel fusca vel rubra, vitta postoculari non distineta. Dig. 4:tus magnitudine varius.

94. *PICUS cactorum* Lafr. d'Orb. Voy; — Malh. I, 102, t. 25; — Mus. Hein. 72 (Cactocraugus cact.). — Supra niger, plaga frontali maxima cervicæque albæ; tergo, cum uropygio, transversim albovario. Subtus sordide albidus, gutture flavo, ad latera albo; crasso transv. nigromaculato. Alarum tectrices majores et remiges nigrae, utrinque albo-maculatae. Rectrices omnes nigrae fasciis 6 interruptis albæ. — *Mas* maculâ verticis rubra a *femina* distinguitur. Latera capitis nigra; genæ albæ; vitta malaris nulla. Digitus 4>3. Ala 110—115 mm. — *Bolivia*. (Mus. Leyd., Paris., Britann.). — Obs. Rectricum apices, ut in P. medio, paullo minus elongatae quam in reliquis; forma vero rostri et alæ longæ sunt hujus Tribus.

95. *PICUS thyroideus* Cassin 1851; — Id. Illustr. 201 pl. 32; — Malh. 162, tab. 37. — Mus. Hein 84 (Cladosecopus). — Supra sub-tusque niger, crebre, irregulariter albido-fasciatus: uropygio albo; ventre medio longitudinaliter pallide flavo; plaga juguli inferioris nigra, magna, transversa. — Caput superne lateribusque dilutius fuscum, postice paulum nigrostriolatum; genis gulaque pallidis, vitta mali nigro-striolata, minus evidenti. Alæ totæ albido-maculatae. Rectrices nigrae; media et extimæ fasciis obliquis, angustis, albidis. Rostrum nigrofuscum. Digitus 4:tus tertio parum longior. Ala 138 mm. *Mas* caret omni nota capitis rubra, et a *femina* vix differt nisi picturâ paullo definitiore. Hab. in *Nova Mexico*, *California*, *Oregon*; (Mus. Berol. ♂).

96. *PICUS williamsoni* Newberry; — Baird, Report, 105. — Malh. I, 163, t. 36. — Niger, nitidus, lineis ad latera capitis 2 albæ; tergo, plaga alarum antica, magna, maculisque remigum parvis, paucis, albæ. Ventris vitta media flavoalbida; latera, postice, nigro alboque fasciata. — Gula, inter lineas malares nigras, *maris* rubra, *feminæ* alba; sexus in reliquis similes. Jugulum et latera pectoris nigra. Lineæ capitis albæ, laterales, vittam postocularum lineamque malarem distinguunt; altera, supra oculum orta, occiput cingit; altera, e naribus orta, in latere collis desinit. Rectrices omnes tote nigrae. Digitus 4:tus tertio paullo longior. Alæ 130—140 mm. — Hab. in *America sept. ad occidentem*, circa 40° lat:s, *Rocky mount*. — *Oregon*. (♂♂ Mus. Britann. et Mus. Berol.).

97. *PICUS ruber* Gm; — Lath. 10; — Malh. 132, t. 31; — Mus. Hein. 82 (Cladosc.). — Caput et collum (usque ad pectus, cum gula) rubra, linea lori alba, fuscomarginata. Corpus superne nigrum,

dorso pallidimaculato; plaga alarum alba, minore, e rectricibus quibus-dum mediis et majoribus, extus late albis. Venter sordide flavescens, lateribus paulum fuscomaculatus. Rectrices quedam caudales albæ. Rectrices nigræ; mediae, in pagonio interno, maculis 4 magnis, albis, non marginalibus, pictæ; laterales, utrinque 2, anguste pallidi-marginatæ. Cauda præterea immaculata. Remiges margine apicis albæ; maculæ externæ parvæ et in cubitalibus plerisque fere nullis. Plumæ dorsi medii macula apicis rotundata, albida notatae; omnes in medio angulatim albido-cinereæ. Linea lori alba est initium lineæ albæ inferioris (cf. sp. præcedentem). Digitus 4:us æqualis tertio, ungue subminore. *Mas a femina* dignoscitur colore rubro paullo lætiore maculisque dorsi albidis laterumque fuscis, paullo, evidentioribus. Ala 130 mm. (M. Sthm). — *America sept. occidentalis*: California—Nootka.

98. *PICUS varius* L. XII (ex Catesby et Briss.); — Lth. 21; — Malh. I, 157, t. 37; — Mus. Hein. 80 (*Cladoseopus*, typus). — Supra nigro albidoque variegatus; lateribus capitinis albovittatis; plaga alarum alba; rectricibus mediis intus (vel utrinque) maculatis. *Digitus 4:us* tertio brevior et ungue minore armatus. Ala 120—130 mm. — Sp. maxime variegata et, pro aetate, maxime variabilis. — *Mas perfectus*: Pileus ruber, nigromarginatus et postice late niger. Linea, supra oculos orta, occiput eingens, alteraque, a naribus ad latera pectoris ducta, albæ, vittas 2 ordinarias, nigras distingentes. Vitta malaris et plaga juguli inferioris maxima, atra, conjunctæ et gulam rubram cingentes. Dorsum, cum tergo scapulisque, crebre, angulatum variegatum: plumis albis, maculis fasciisque angulatis vel interruptis, nigris. Rectrices caudales albæ, extus nigræ. Venter sordide albido-flavescens, ad latera fuscior, striolis sagittatis et simplicibus nigris. Remiges nigræ, ut in tribu præcedenti maculatae, maculis externis in pennis maximis 8 v. 7; pleræquæ apice albomarginatae; cubitales 2 ultimæ late albovariæ. Rectrices nigræ; laterales, utrinque 2, plus minusve albomarginatae, et interdum, extus vel intus, maculis parvis albis ornatae; (3:ta, interdum, apice albomarginata); 4:ta immaculata; 5:ta pagonio externo immaculato, interno albo, maculis vel fasciis fere 4, nigris, parvis. Rostrum et pedes nigrofusci. Iris fusca.

Femina a mare differt: gula alba; ventre medio sordide albido, vix flavotincto; vittis capitis, præsertim malari, minus definitis, pallido-mixtis. Magnitudo, color pilei et omnis pictura ut maris; *variat* tamen pileo toto nigro.

Juv. hornotinus (Wisconsin, 20—25 Sept; Kumlien), superne dilutius fuscus, dorso ut in adultis nigromaculato; uropygio et tectr. caudæ albis, plumis extus nigris. Pileus fuscus, maculis, præsertim in *mare*, parvis, fulvescentibus punctatus; in ♂♀ plerunque plumis rubris variegatus. Vitæ capitis laterales ut in adultis ductæ, sed parum definitæ, fuscæ et albidae. Gula sordide albida. Jugulum e. pectore antico et laterali fusca, plumis obscurius, obsolete fasciatis. Venter ad latera fuscus, nigricantistriolatus, medio, in ♂ sordide flavescentialbidus, in ♀ vix flavescens. Ala ut in adultis. Rectrices nigræ; laterales, utr. 2, in utroque pagonio, margine maculisque irregularibus, albidis (extus

fere 6); 3:ta, interdum, apice eodem modo picta, interdum immaculata; 4:ta tota nigra; 5:ta intus alba fasciis fere 4 nigris (ut in adultis, sed latioribus), extus maculis paucis marginalibus. Ala 120—125 mm.

♂ junior (an biennis?; Wisconsin 20 Sept. Kumlien); subsimilis nuper descripto; differt vero; gula rubrovaria; plumis juguli inferioris pallidius fusco-fulvescentibus, fasciis 2 curvatis, definite fuscis (plumæ quædam novæ, albæ, nigrofasciatæ). Rectrices ut in ♂ adulto (in nostro sp. laterales albomarginatæ, absque maculis. Ala 130 mm).

Habitat in *America septentrionali*, orientali, a Canada, meridiem versus. Migrat; hieme in Florida, Ludovi iana, Cuba, Jamaica, appetet. — (Mus. Stockh.).

98 b. *P. varius occidentalis*; — *P. nuchalis* Baird. in descr. præc:s; et ibid append. 921; — Malh. in deser. pr:s; — Simillimus præcedenti, a quo differt linea alba, ab oculis ducta, postice rubra, fasciam occipitis rubram formante. *Femina* quoque hanc fasciam pallide rubram, gulamq. rubram habet. Rectrices medie extus tenue vel vix pallidimarginatæ; non maculatæ. Vitta malaris [interdum?] a colore rubro gule interrupta. — Habitat in *Nova Mexico, Oregon, Montibus petrosis*.

TRIBUS 7. *Pici passerini*

Virentifusci, superne plerumque nitore luteo-aurea vel colore rubro insignes; ventre non rubro vel luteo picto; scapis remigum et rectricum fuscis (vel subtus albidis; non flavis). — Sp. parvæ, habitu peculiariter agnoscendæ. *Rostrum* capite brevius, forte, rectum, conicum, apice cuneatum, medio leviter compressum; carinis nasalibus latissime distantibus, brevibus, continuatione ad apicem parum elevata, rotundata; indeque latera apicis minus evidenter bicarinata. *Angulus* menti brevis. *Carina* culminis alta; acuta; max. inferior subtus rotundata. — *Digitus* 4:us tertio multo longior. *Remiges* nigrofuscæ, maculis albidis, marginalibus, situ numeroque ut in Trib. 5 et 6; externæ vero plerumque obsoletæ, interne magnæ 3 v. 4. *Rectrices* nigrofuscæ, immaculatæ, vel fasciis pallescentibus 5—7, plerumque interruptis et maculas marginales formantibus, pictæ. *Capitis latera* fuscescentia vel obscurius picta, vittis 2 ordinariis non vel parum distinctis. *Mas* pileo plus minusve rubro a *femina* differt. — Sp. omnes *Americæ tropicæ*. Gen. *Dendrobates* Sw. 1831 (nec Wagl. 1830); *Dendropicus!* Malh).

Obs. *Picus passerinus* L. S. N. XII; Lath. n:o 40; "ex ins. Dominicensi" (St. Domingo vel Dominicæ?). Bene in Mus. Hein. 147. Unice descriptione Brissonii (II, 75, t. 4 fig. 2) cognitus est, hodie vero ignotus. Patria forte, confusione quadam, falsa edita? Descri. Brissonii non male convenit cum variis infra descriptis (n:o 113 et seqq.); nemini vero, inter hodie cognitas, certe tribui potest. Nomen igitur, donec Picum hujus tribus ex illis insulî forsitan cognoverimus, unice pro tota tribu adhibendum.

1:0. *Gastræo unicolore* (non fasciato)

a) rectricibus lateralibus pallidis, fasciis fuscis, multis, angustis.
 (Corpus superne rubropictum, subtus pallidum).

99. *PICUS callonotus* Waterh.; — Malh. I, 129, t. 30; — Mus. Hein. 142 (*Erythronerpes*); — superne ruber, subtus cum gula sordide albidus, immaculatus. — Pileus *feminæ* nigrofuscus; *maris* rubromaculatus. Latera capitis pallide fusca, absque pictura distineta. Remiges fuscae, extus rubrolimbatae, immaculatae; intus albidae fasciis 3, 4 fuscis. Rectrices mediae 6 nigrofuscæ, immaculatae; extima pallide grisea, fasciis fere 7, angustis, integris, fuscis; proxima fusea marginè externo pallido, maculis fuscis. Rostrum pallescens. Ala 70—72 mm; c. 48. — *Nova Granada, Ecuador.* (Mus. Stockh. (Guayaquil); M. Britann.).

100. *PICUS sanguinolentus* Sclater Z. Proc. 1859 p. 60; — Malh. II, 76, t. 43 bis; fuscuscens, pileo cum cervice (*maris?*) rubro; dorso fuscolutescente, rubro leviter tineto. Gastræum non maculatum, nec fasciatum. Remiges intus fusco albidoque fasciatæ. (In iconè cit. gastræum parum pallescens, in gutture inferiore fuscus; rectrices omnes extus pallidæ, fasciis multis fuscis). Rostrum et pedes nigri. Ala 70 mm. — *Honduras* (Selater. Mihi ignotus; hoc vero loco disponendns videtur).

b) Cauda tota fusca. (Corpus supra subtusque obscure fuscum). *Capnopus!* Bp.; *Phæonerpes* E:bch; — Mus. Hein. 139.

101. *PICUS rubidus* n; *Phl. reichenbachi* Mus. Hein. p. 141; (sed obs. P. reichenb. Malh., infra n:o 236); — ♂ supra subtusque virentifuscus, dorso rubro tineto. Plumæ pilei basi fusca apice rubrae. Capitis latera et gula pallidiora, vitta malari fuscescente. Remiges intus albomaculatae. Rectrices immaculatae. Rostrum et pedes fusco-cornei. Ala 95 mm. — *Caracas* (Mus. Hein.).

102. *PICUS oleagineus* Licht. 1830; — Malh. II, 54, t. 57; — Mus. Hein. 140; — fulvescentifuscus dorso flavidore; lateribus capitis albidis, vitta malari lata, fusca; plumis gulæ fuscis, apice albidis. — Alæ et cauda extus immaculatae, sed remiges intus albomaculatae. Pileus *maris* ruber; *feminæ* obscure fuscus. Ala circa 105 mm. — *Mexico.* (Mus. Britann et Berol.).

103. *PICUS fumigatus* Latr. d'Orb. — Malh. II, 51 t. 57. — Mus. Hein. 139; — simillimus præcedenti; differt gula cinerascente lateribusque capitis sordide griseo-fulvescentibus, vittâ malari minus definita. Pileus *maris* ruber; *feminæ* totus virentifuscus. Ala circa 105 mm. Cauda 60. — *Peru, Bolivia.* (Mus. Britann.).

104. *PICUS caboti* Malh. II, 53 t. 57; — Mus. Hein. 139; — Iterum similis præcedenti, sed minor: ala 97 mm; caudâ breviore (47 mm), minus gradata. Pictura omnis ut in *P. fumigato*; colores vero lætiores: obscurius virentifuscus, gula cinerascens; latera capitis dilute rufa. Pileus *maris* ruber. *Femina* ignota. — *Centralamerica* (Auctt. citt.).

2:o. *Gastræo fasciato*:
obscure virentifusco, fasciis crebris, albidis, undulato.

a) rectricibus obscure fuscis, non fasciatis. — Remiges extus immaculatae. Corpus superne rubropictum. — *Callipicus!* Bp. *Erythro-nerpes* R:bch.; M. Hein. 142.

105. *PICUS sanguineus* Licht. Cat. Hamb.; — Malh. II, 74 t. 60; — Mus. Hein. 143; — Obscure fusces dorso rubro (vel griseo pallescente). — In adultis: pileus cum cervice, *maris* ruber; *feminæ* nigrofuscus striolis pallidis, in apice plumarum dilatatis, varius. Dorsum totum, cum uropygio, plumis nigrofuscis, apice longo, sed non definito, lète rubro. Tectrices et remiges extus sordidius rubræ. Latera capitis obscure fusca, scapis plumarum subpallidioribus obsolete striolata, vittæ autem ordinariae non apparent. Gastræum totum nigrofuscum fasciis angustis, sordide albidis. Gula tamen paullo dilutior, fasciis minus distinctis. Rectrices nigricantes; laterales, utrinque 3 vel 2, intus maculis fere 2 pallescentibus, saepius obsoletis; extimæ quoque in summo margine externo pallidius notatae. Rectrices omnes apice obtusæ, rotundatae. Rostrum fuscum apicem versus sensim pallescens. Pedes obscure fusci. Ala 76—80 mm. C. 37, 40; culmen rostri ca 18. — *Guyana*. (M. Stockh.; Berol.).

Junior hujus primo adspectu sat dissimilis appareat. Differt enim colore fusco adhuc nigriore et defectu coloris rubri. Plumæ pilei, præsertim anterioris, apice longius griseo-pallescentes, absque striola media. Plumæ dorsi medii apice longius griseo nitidæ; dorsi antici, sicuti tectrices et remiges cubiti, extus multo minus vel obsoletius pallescunt. Latera capitis nigriora, non striolata. Fasciae gastræ angustiores et gula vix dilutior. Rectrices omnes, etiam laterales, apice acutes et margine externo haud pallidinotatae. Rostrum fuscum, apice non pallidum. Ala 71, 72 mm; c. 45, 46; rostr. 17. — Duo specimina in spiritu vini asservata, e *Surinamo* accepimus; quorum alterum, *masculinum*, evidenter avis hornotina, apice rostri imperfectius cuneato plumisque juvenilibus præditum, omni rubore caret. Alterum vero, *femininum*, adultum videtur, et in omni colore pallescenti notæ: dorsi, alarum præsertimque pilei, nitorem levissimum rubrum exhibit; sed picturam pilei, formamque rectricum quales alterum habet. [An igitur habitu secundo, colore rubro, actione spiritus vini, extracto?].

106. *PICUS kirkii* Malh. 1845; — Monogr. II, 70, t. 59; — fuscus, superne luteo tinctus, tergo rubro. Striolæ quædam albidæ et maculæ rubidæ in tectricibus alarum. — Subtus virentifusces, albido-fasciatus, gula lateribusque capitis fusco albidoque variis. Pileus *feminæ* fuscus; *maris* fusces plumis apice rubris. Cervix lutea. Dorsum medium leviter rubrotinctum. Rectrices laterales intus obsolete pallescenti-fasciatæ. Ala 91 mm (♂ Mus. Brit.; — 95 Malh.). — *Trinidad, Tobago*.

107. *PICUS ceciliae* Malh. 1849; — Mon. II, 71, t. 60; — Similis præcedenti, sed paullo minor, striolis tectricum nullis albidis; gula alba, leviter fuscostriolata. Reliqua ut in deser. præc:s. Ala 85 mm (♀ Mus. Berol.; — 95 Malh.). *Nova Granada; Ecuador*.

b) Rectricibus fuscis. evidentius pallidifasciatis, vel in utroque margine maculatis. — (Sp. omnes superne fuscovirentes, luteo micantes, interdum, præterea paullum rubrotinctæ. Tectrices alarum, præsertim mediæ, in plerisque sp., ante apicem scapi, macula vel striola parva, albida, ornatae). Campias Mus. Hein. *).

*) Cervice luteo-aurea.

108. *PICUS albipes* n. sp. rostro albo, apice (ad $\frac{1}{4}$) nigricante; pedibus (siccatis) albidis, unguibus apice fuscis (in omnibus sequentibus rostri pars maxima et pedes toti fusi). — *Femina*: pileus totus cum loris obscure rufofuscus, striolis scaporum tenuibus, pallidis. Torques cervicis ad latera colli lætius flavus; postice obscurior, flavidostriolatus. Corpus superne cum aliis lutescenti-micans; uropygium concolor, striolis minutis flavidioribus. Gastræum rufescensfuscum, crebre, sordide virentialbido-fasciatum; gula maculis majoribus, fuscis, crebre varia (non fasciata). Latera capitinis fusca, pallescenti-striolata, vitta superiore, aliaque inferiore, pallidioribus. Alarum tectrices mediæ striolis paucis, parvis, flavoalbidis. Remiges primariae 3—6 extus, pone incisuras, maculis fere 3 parvis, pallidis, marginalibus; basi quoque, omnesque reliquæ, extus, obsolete flavidius submaculatae. Rectrices obscure fuscæ, maculis utriusque marginis virentifulvis: in extima 5, definitioribus, in fascias medio infuscatas confluentibus; proxima maculis 4, reliquæ tantum 3, parvis, marginalibus, obscuris, minus definitis. Ala 96 mm. Rostrum paullo validius quam in affinibus appetet, culmine 20 mm. — *Mas* mihi ignotus. — *Femina* unica, in urbe Rio Janeiro, cum collectione majore avium brasiliarum vulgarium, emta.

109. *PICUS affinis* Swains Z. Ill. (Deser. nec fig.) 1822; — Wagl. Syst. sp. 61; — Malh. II, 56, t. 61. — *P. maculifrons* Spix Bras. I, 62 (1824); — Mus. Hein. 148. — *Mas* vetus: Dorsum læte lutescenti-lavatum, obsolete fusco-subfasciatum tenuique flavostriolatum: pluma enim singula apice fasciaque media flavidis, fascia interjecta basique fuscioribus; scapo tenui, apice flavo, in fascia media albido, in partibus fuscis concolor. Uropygium distinctius fasciatum. Alā quoque tota extus obsolete fasciata. Tectrices mediæ striolæ scapi tenuissima, flava, minus tamen elucente (maculis vero nullis). — Remiges primariae 3—6 extus maculis 4 (vel 3) albidis. — Rectrices laterales fasciis integris, mediæ maculis marginalibus, pallidis. — Pileus (σ°) antice fuscus, pallidostriolatus, postice ruber. — *Lora fulva*. Latera capitinis fusca, tenuie pallidistriata, vitta inferiore pallida, fuscovaria; superiore, ad occiput ducta, flavescente. Gula albida fuscostriolata; reliquum gastræum

*) Species hujus subdivisionis, inter se simillimæ, iterum revidendæ et determinandæ sunt. Numerosæ videntur et hodie adhuc, a quovis descriptore, numero angentur; omnes vero sunt incolæ Americae merid. calidioris (ad 35° lat.). Ipse omnes cognitas haud vidi, non vero paucas in variis muscis descripsi. Deficiente vero sœpe aves ipsas comparandi facultate, descriptions ad rem illustrandam non sufficiunt. Nomina igitur multa, h. l. tantum ex characteribus, in libris datis, distinxii. Hi vero characteres, ubi copia detur, ulterius examinandi sunt; nam stigmata tectorium, maculae remigum externæ, fasciæ rectricum et cet., pro vario statu sexus, ætatis æstatisque, variabiles videntur.

fasciatum. Cervix, præsertim ad latera, late, nitide lutea. Rostrum fuscum, subtus pallescens. Ala 96 mm. *Brasilia*. (Mus. Berol.).

Mas junior (plumis evidenter junioris, rostro vero perfecte cuneato) præter pileum egregie cum deser. præcedente convenit. Pileus totus plumis cinereouigris, apice rubro, longo, angusto, in fronte et vertice fundum obscurum non tegente; scapo medio nitido. — Rostri culmen 19 mm; ala 94. — Rectrices omnes acutæ (conf. P. sanguineum jun. n:o 105): laterales fasciis pallidis 7; mediæ maculis utrinque 5. (In ♂ vetere rectrices propius examinare neglexi; sed verisimiliter cum reliquis affinibus convenit: rectricibus lateralibus 5- vel fere 6-fasciatis, apice rotundatis; mediis 4 vel 3-fasciatis). — *Brasilia*, Mus. Stockh.

Femina senior, e *Brasilia*, Mus. Stockh. A maribus descriptis differt colore omni paullo minus kête, cervice potius fulvescente. Tectrices alarum maculis triangularibus, albidis, latis! Rostrum majus: culmine 22 mm; obscure fuscum, subtus parum pallidius. (An dist. sp.? nam femina in Mus. Berol. et in deser. Malherbei tectrices ut in mare pictas habere dicitur). Pileus totus rufescens nigricans, striolis rhachidum fulvoalbidis, angustis, apice paullum dilatatis, pictus. Præterea omnis descriptio maris adulti, nuper data, cum hac femina convenit. Rectrices laterales apice rotundatae, fasciis fere 6; mediæ maculis utrinque 3. Ala 92 mm.

110. *PICUS selysii* Malb. II, 67, t. 62; — superne lute micans, plumis dorsi stria scapali tenui, lutescente et (in ♂♀ senioribus) evidentius rubrotinetis; fasciis vero nullis. — Tectrices alarum macula ante apicem pallida: in juniore majore, triangulari, albida; in seniore subrotundata, paullo minore, rubrotincta et annulo fuscornubido cincta, (tectrices vero præterea non rubrolimbatae). Remiges maximæ (3—6), pone incisuras, maculis marginalibus parvis, pallidis, circiter duabus. Rectrices omnes nigrofuscæ maculis utriusque marginis pallidis (externis sæpe obsoletis. In ♂ vet.: laterales maculis 5 apiceque subrotundato, mediæ maculis 3, pallescentibus). Pileus *maris* postice ruber, medio anticeque nigricans apicibus rubris, brevibus, maculatus; vel hi apices interdum, in fronte, detriti; — *feminae* totus nigrofuscus. Lora fulva; latera capitis tota kête fulvescentia, posterius fuscostriata, (vittis nullis evidentibus); cervix, præsertim lateribus, nitide luteofulva. Gula fulvescens, leviter fusco-maculata; gastræum reliquum, ut in ceteris fasciatum. Ala circa 92 mm. *Brasilia* (Mus. Sthm.).

Obs. *Campias affinis* Mus. Hein 151 (nomine ex Swains. Z. Ill. II, tab. 78 [non ex deser.] nec Wagl. neque Malb.) — nuper descripto peraffinis videtur; differt autem (forte lapsu calami?) "remigibus primariis extus unicoloribus, intus tantummodo maculatis", et "loris etc. flavis".

111. *PICUS hematostigma* Natt.; — Malb. II, 72 t. 61. — *P. passerinus* Tschudi Fn. Per. 265. — Tectrices alarum limbo lato rubro striolaque tenui scapi, ante apicem rubidoalbi, ornatae. Plumæ quædam dorsi apice rubrotinetæ. Remiges primariae quædam extus maculis fere 2 pallidis. Rectrices omnes maculis utriusque marginis pallidis. Ceterum præcedenti similis videtur; cervice similiter lutea; pileo ♂♀ ut illius. Ala 95 mm. — *Brasilia* (et, auct. Tschudii, Peru, sine dubio orientalis, Brasiliæ confinis). Malb.

Obs. 1. *Campias hilaris* Mus. Hein. 154, ex *Peru*, eadem sp. habetur, ac *P. passerinus* Tschudii, nuper memoratus, ideoque eadem foret, ac *P. haematostigma*. Descriptio quoque in plerisque eum eo convenit; differt vero, quod striolam tectricum rubroalbidam non memorat, rectricesque "supra distinctius, subtus distinctissime fulvescenti-fasciatas" dicit.

Obs. 2. Huic etiam aſſiniſ videtur *Campias ruficeps* Mus. Hein. 153 (an etiam *P. ruficeps* Spixii, cui cervix obſcura: "collari minus flavescenti quam virescenti"). In Mus. Hein. idem habetur ac *P. haematoſtigma* Malh., sed. deser. paullulum a deser. Malh. differt, præſertimque deser. tectricum aliena videtur. Dubia igitur manet hæc sp. donec melius definiatur.

112. *PICUS sedulus* Mus. Hein. 153 (*Campias*); — *Femina*: remigibus primariis extus immaculatis. Tectrices mediae maculis ordinariis triangularibus, albidis, interdum rubido lavatis, ornatae. Rectrices omnes margine utroque pallidimaculate. Pileus "olivaceo-fuscescente-brunneus". In ceteris præcedentibus similis videtur, dorsum vero non rubrum dicitur; neque dubitarem, hanc esse feminam juniores Pici selysi, nisi remiges extus immaculatae describerentur. Ala 92 mm. — *Guyana*. (Mus. Hein.).

113. *PICUS cassini* Malh. II, 55, t. 58; — *mas*: remigibus primariis extus immaculatis? Tectrices alarum pleraque striola scapi angusta, flavidæ. Rectrices omnes utroque margine pallescentimaculatae. Latera capitis fuscescencia, pallidivaria, vitta inferiore albidiore, supra vittam malarem fuscomaculatam ducta. Reliqua ut in plerisque: cervix lutea; dorsum luteolavatum, etc. Ala 98 mm. — *America merid.* loco inc. (Malh.).

114. *PICUS kirtlandi* Malh. II, 54, t. 58; — *mas*: "tectricibus alarum immaculatis". "In reliquis similis *P. cassini*", fasciæ tamen gastræ nigriores dicuntur. — *Brasilia*. *Femina* ignota. (Malh.).

") Cervix colore dorsi tineta.

115. *PICUS tephrodops* Wagl. Syst. sp. 48; — Mus. Hein. 145. — *P. passerinus* Malh. II, 59, t. 62; — rostro fulvescentipallido, subpellucido, maxilla inferiore basi infuscata. (R. in seqventibus obſcurius). — Minimus Picorum: ala 75 mm [79, Mh. Lapsu 2" 1" (= 54), Mus. Hein.]. Corpus superne fortius luteo-micans, striolis seporum apicalibus flavidioribus et, in ♂ vetere, levissime rubro tintis. (Scapi dorsales striola altera, media, albida, sed plumis obtecta, notatæ. Fasciæ nullæ apparent). Alarum tectrices, paullo obſcuriores quam dorsum et pennæ cubiti, maculis parvis, sagittatis, albidis (in senioribus levissime rubidis) ornatae. Remiges primarie, pone incisuras, margine externo tenuissimo, pallido; in juniore integro; in vetere, maculatum interrupto, sed non dilatato; neque extus maculae verae adsunt. Gastræum totum, cum gula crisoque, obſcure virentifuscum, tenue albidoſaciatum. Capitis latera eum loris fuscescencia, unicoloria. Pileus *maris* totus ruber; *feminae* totus virentifuscus, antice lateribusque tenue pallescentiſtriolatus. Rectrices omnes obſcure fuscæ, utroque margine maculis fere 4 parvis, pallescentibus;

extus minimis et in pennis mediis junioris feminæque vix apparentibus.
— Guyana (Mus. Stockh.).

116. *PICUS tænionotus* R:bch Handb. 354; — Malh. II, 58; — dorso toto alisque extus lætius luteo-micantibus, [obsoletius, fuscus] fasciat. — Gastræum totum fuscovirens, tenue flavoalbido fasciatum. Tectricum maculæ (ordin.) flavoalbidæ; remiges primariæ, subtus, utrinque albido-maculatæ. Capitis latera et frons [lora?] virentiflava. Pileus *maris* totus ruber. (♀ ignota). Rectrices nigrofuscæ: extima fasciis 4—5 integris, angustis, apiceque pallidis. [Mediæ?]. Rostrum pedesque nigro-cinerei. Ala (3" 2"=) 85 mm. — *Brasilia interior* (R:bch. l. c.).

Obs. *C. tænionotus* Mus. Hein. 149, (e patria ignota) — a descr. Reichenbachii paullum differt: ♂ "supra flavidio-virescente-olivaceus maculis scapalibus pallidioribus fasciiformibus plus minusve obsoletis varius". Tectricum maculæ scapales pallidæ. Remiges primariæ, margine externo, apicem versus, maculis longitudinalibus, paucis, obsoletis, pallescentibus. Lora fulvescentialbida. Pileus ruber, fronte brunnea tenue pallido striolata. Rectrices fuscæ; laterales, utrinque 2, maculis marginalibus, pallescentibus, etc. ut nuper descriptæ, pictæ. Ala 89 mm (3" 5"). — ♀ ignota.

117. *PICUS agilis* Mus. Hein. 147 (Campias); — supra luteolavatus; tectricum maculæ triangulares, albidae; remiges primariæ extus pallidimaculatæ; rectrices omnes margine utroque pallescentimaculatæ: mediae limbo basim versus flavovirenti maculisque obsoletis. Pileus *maris* ruber: *feminæ* totus virentifuscus maculis minutis, subbobsoletis, albidis varius. Latera capitis virentifuscescens, vitta superciliari vittaque malari obsoletis, pallescentibus. "Rostrum fuscescente corneum, basi max. inf:s vix brunnescens". Ala 85 mm. — *Amer. merid. interior* (Mus. Hein. l. c.).

118. *PICUS olivinus* Natt. — Malh. II, 65, t. 59; — Mus. Hein. 140 (Phæonerpes; descr. ex. Malh.); superne obscurior [vix luteonicans: "lavé de brun"]; subtus virentifuscus, tenuissime albido-fasciat. Remiges primariæ extus maculis parvis albidis. Maculæ tectricum ordinariae triangulares, flavidæ. Rectrices omnes nigrofuscæ, pallescenti fasciatæ. Pileus *maris* postice ruber, medio anticeque cinereofuscescens, striolis fulvoalbidis, parvis; *feminæ* totus fuscovirens, tenuissime, obsolete pallescentistriolatus. Ala 94 mm. — Hab. in *Brasilia* et *Regione placenti*. (Malh.).

119. *PICUS murinus* Natt. — Malh. 1845, et Monogr. II, 62, t. 58; — superne dilutius virentifuscus, non luteo micans; subtus pallidius fuscus, griseo-albido-fasciat. Remiges primariæ extus maculis majoribus, albidis. [Tectrices non descriptæ: veris. immaculatæ]. Rectrices omnes nigricantes, fasciis pallidioribus (in iconæ cit. interruptis). Pileus *maris* ruber; *feminæ* fuscus, tenue, pallide striolatus. Ala 95 mm. — *Brasilia interior*. (Malh.).

120. *PICUS nigriceps* d'Orb. Voy. — Malh. II, 68, t. 59. — *C. malherbei* Mus. Hein 155 (ex Malh. descr. — Obs. Nomen *nigriceps*,

ob colorem pilei feminæ nigrum, in hac tribu huic peculiarem, datum, etsi non optimum, non tamen rejiciendum). — Superne fuscovirens, dorso antico leviter rubrotincto. Subtus obscure fuscus, albidofasciatus, gula pallidiore, fuscovaria. Alarum tectrices immaculate. Remiges primariae extus maculis ferrugineis, scapis subtus albis. Rectrices obscure fuscae, limbo virenti, subtus virescentes; omnes fasciis interruptis pallidis. Pileus *maris* totus ruber; *feminæ* purius niger. Capitis latera pallida, vitta postoculari lata, fuscescente. Ala 103 mm. — *Bolivia* (Malh.).

3:o. Gastræo albidomaculato.

Maxime affines præcedentibus (cervice non lutea), a quibus vix differunt nisi fasciis gastræi interruptis et in maculas abbreviatis.

121. *PICUS spilogaster* Wagl. Syst. n:o 59 (deser. ex Azara); — Malh. II p. 62 (fig. nulla); — *P. adspersus* Natt. Malh. p. 64, t. 60. — Mus. Hein. 156 (Campias). — Fuscovirens; superne parum luteomicans, maculis flavidis, transversis, non definitis; subtus maculis plumarum per paria dispositis, albidis, rotundatis, definitis, pictus. — Pileus *maris* fuscus apicibus plumarum rubris; *feminæ* obscure fuscus, albido-striolatus. Plumæ nasales rufescentes. Latera capitis et gula albida, fuscostriolata, vitta postoculari et malari fuscis, albidovariis. Abdomen et crissum fasciata, nec maculata. Alarum tectrices maculis transversis albidis; remiges majores extus maculis fere 8, albidis, notatae. Rectrices omnes nigrofuscæ, fasciis fere 6 fulvoalbidis, latis, ad scapum interruptis. Rostrum fuscescens. Ala 100. — *Brasilia* merid., *Regio platensis*. (Mus. Berol. M. Hein.).

TRIBUS 8. *Pici fulviscapi*.

Scapis remigum et rectricum flavis. — Color fuseescens, maculatus, alis caudaque albidomaculatis, maculis remigum et rectricum marginalibus. Rectrices breviores, apice fulvescentes. Venter nulla parte rubeus. Vitta *submalaris*, nigra vel fusca, ab angulo infimo baseos rostri (nec ab ang. oris) orta, lata, ad latera gutturis dueta. Vitta postocularis minor vel obsoleta. Rostrum ut in *P. medio* (Tr. 6) formatum, vel majus. Digitus 4:tus tertio major. — Sp. africanæ.

1:o. Majores, fusi, (supra subtusque transversim albido-undulati). Scapi remigum et rectricum in senioribus, supra subtusque lète flavi. Digitus 4:tus tertio evidenter major. Rostrum capite fere longius, validum. Maculæ remigum utriusque marginis 10 v. 9; externæ parvæ, angustæ; sed in primariis maximis, apex (pro maculis fere 3 vel 4 pluribus) immaculatus. Rectricum lineole marginales flavoalbidæ, utrinque 10. (*Thripias* Mus. Hein. p. 121).

122. *PICUS namaquus* Licht. Cat. Hamb. — Mus. Hein. 121 (Thripias). — *P. mystaceus* Vieill. — *P. biarmicus!* Cuv. Temm.; Malh. I, 193, t. 42; — subvirentifuscus, supra subtusque striolis transversis flavoalbidis: crebris, angustis, undulatis. Guttur infimum ventri concolor. — Capitis latera et gula alba, vitta submalari et v. postoculari pure nigris: illa longa, latissima, a pari distincta; hac breviore et paullo angustiore, a vitta malari discreta. Pileus cum cervice niger, antice, in utroque sexu, alboguttatus; in mare, plaga media, magna, rubra. Rectrices fuscae, subtus flavomicantes, utrinque striolis marginalibus flavoalbidis; scapis utrinque flavissimis. ♂: ala 128 mm; c. 67; r. culmen 37. — Juv. anni striis corporis sordide albis, non flavidis; scapis remigum superne fuscis; rostro multo breviore. — Habitat in *Africa meridionali*, ab ora marina, ultra tropicum usque (M. Sthm.), et circa flumen Zambesi (Kirk, Ibis 1864).

123. *PICUS schoensis* Rüpp. Mus. Senk. 1842; — Malh. I, 195, t. 42; — Mus. Hein. p. 121; — Simillimus praecedenti; differt vittâ postoculari longiore, postice cum v. malari late conjuncta, et gutture infimo c. pectore antice nigriore, punctis pallidis notato. Praecedente paullulo major et rostro adhuc validiore instructus (Rüpp. Malh.). — Hab. in *Abyssinia* meridionali.

123 b. *PICUS africanus* J. E. Gray, Zool. Misc., h. l. enumerandus videtur, etsi hodie incertus vel non satis cognitus; — (Malh. I, 205, et Mus. Hein. 117; ex opere Grayi). — Superne letius fusco-virens, luteomicans; pileo antice nigro, occipite et uropygio rubris; subtus virentifuscus, albomaculatus. Latera capitis alba vittis 2 ordinariis nigris (ut in 2 praecedentibus sitis, sed superior usque ab angulo oris orta). Alae albidomaculatae; cauda fusa. Ala ($4\frac{1}{2}$ p.) = 113 mm. Hab. in *Sierra Leone*. — (Descriptionem ex opere Malherbii desumsi; opus enim Grayi citatum, cuius aditus per mercaturam non patet, hucusque mihi ignotum est).

Ut Femina et Junior hujus describitur avis ei similis, sed uropygio non rubro: *Dendropicus africanus* Cassin, Philad. Proc. 1863, 322, ex Afr. occid. sub æquatore: Cap Lopez et fluvio Canma, lat. merid. 1—2°. — Pileus nigrofuscus, totus. Latera capitis ut praecedentis. Corpus supra fuscoviride, fasciolis remigum cubitalium paucis, virenti-pallidis, maeulisque teetricum paucis albis. Remiges intus albomaculatae; primariæ, extus, maeulis fere 4, parvis, albidis. Gastræum viridifuscescens, maeulis crebris, rotundatis albis, in lateribus crassoque transversis, fascias formantibus. Cauda nigrofusca. Max. inferior albida. Ala ($4\frac{1}{2}$ p.) 113 mm. C. ($3\frac{1}{4}$) 81 mm (ideo multo longior quam in reliquis hujus Tribus. Proportio digitorum?). — *Junior*, Mas? plumis pilei paucis, inspersis, flavis; uropygio flavoviridi. Ala ($4\frac{1}{2}$ p.) 113 mm.

2:o. Minores, subtus albidi, nigrofuscō-maculati, scapis pennarum utrinque flavis. — Digitus 4:us tertio parum major. Rostrum capite brevius. Maculæ pennarum paullo latiores, flavescentes; remigum 7, et in pennis maximis 8: ultima juxta apicem sita; rectricum utrinque 7 vel 8. — (*Ipoctonus* Mus. Hein. 114).

124. *PICUS cardinalis* Gm. (ex. Sonn. Voy. p. 72, t. 35; ubi tamen major, æqualis *P. viridi*, et ex ins. Luzon dicitur, sed descriptio

evidenter hujus): — Lath. sp. 23; — Mus. Hein. 119. — *P. fulviscapus* Licht. Verz. 1823 p. 11; — Wagn. Syst. n:o 45. — *Fuscus*, dorso albido fasciato; subtus sordide albidus, longitudinaliter nigromaculatus: maculis pectoris autici majusculis; hypochondriis crisoque nigrofasciatis. — Maculae tectricum latiores albæ; remigum et rectricum vix vel parum flavotinctæ. Tectrices caudales, in mare, sordide flavescentes, non rúbidotinctæ. — Vitta submalaris longa, lata, nigricans. Gula et latera capitis sordide alba, vitta postoculari nulla, vel (in junioribus) striolis paucis, sub-obtectis, nigris notata; sed regio auris colore sordidior. Pileus antice fuscescens; in habitu trito pallidus; postice, in *mare* ruber, in *femina* niger. Ala 95 mm. — *Juv.* paullo obscurior, maculis pectoris majoribus: Alter, Januario, vertice medio rubro-mixto; ala 86 mm; — alter, martio, albedine pectoris dorsique levissime flavidotincto; pileo non rubromixto; ala 88 mm. Scapi utriusque supra subtusque flavi. (Mus. Sthm.). — Habitat in *Africa maxime meridionali*: intra limites colonie capensis.

125? *PICUS hartlaubi* Malh. I, 201, t. 44; — Mus. Hein. 115; — simillimus præcedenti, a quo differt pectore levissime, fasciisq. dorsi paullo evidentius flavotinctis. Tectrices caudales lætius flavidæ, apice leviter rubrotinctæ (etiam in juniore). Maculae quoque pectoris paullo, sed parum, angustiores apparent. Magnitudine omnibusque reliquis exacte cum præcedente convenit, nec aliter nisi varietas ejus localis haberi potest. Hoc vero loco numero distinguuntur, quia idem in sequentibus, nobis minus cognitis, sed, ut videtur, vix melius distinctis, necesse fiat. — Habitat in *Caffraria*, a Portu Natal, usque intra plagam tropicalem. — Specimen ex Damara (σ° vetus, d. 27 Apr. 1854, prope Walfishbay, sub tropico, a J. Wahlberg occisus) differt magnitudine paullo minore rostro vero paullo longiore (ala 90; culmen rostri 22 mm), et rectricibus 2 mediis, ante mutationem decoloratis, pogonio externo sordide griseoflavo. (Mus. Sthm. specimina multa a Wahlbergio, nomine *P. fulviscapus*, allata). A Kirkio circa fl. Zambesi frequens dicitur (Ibis 1864).

126. *PICUS hemprichi* Ehrenb. Symb.; — Rüpp. Syst. Üb. 88, t. 35; — Malh. I, 199, t. 43; — Mus. Hein. 114; — *fuscus*, gastræo fasciisque dorsi alarumque sordide albidis (nec flavescentibus); gastræo (ut præcedentium) longitudinaliter, postice transversim, striolato; tectricibus caudæ apicem versus rubris; vitta submalaria dilutius fusca, postoculari obsoleta. — Iterum simillimus præcedentibus, sed minor: ala 80 mm. Pictura eorum omnino, colore, ut nuper descripsimus leviter mutato. Diff. sexus ut in illis. Frons non maculata, sed, ut in præcedentibus, plumis ante mutationem decoloribus, apice sæpe pallidis. — In *junioribus* partes nigricantes, eo tempore valde decolores, grisescentes. (Rüpp.). — Hab. in Kordofan et parte humiliore (maritima) abyssiniae.

127. *PICUS lafresnayi* Malh. I, 204, t. 44; — Mus. Hein. 116; — dorso fuscovirente, non fasciato; uropygio flavescente, plumis posticis apice rubidis. Gastræum flavoalbidum, parcius fuscostriolatum, maculis crassi paucis, transversis. Gula et latera capitis alba, vitta submalaria fusca; postoculari obsoletiore. Alæ fusce, maculis externis flavo-albidis. Rectrices virenti-fuscæ, maculis flavis, scapis flavidissimis. Pileus *maris* ut

in praecedentibus. Ala 85 mm. — *Femina* vix descripta videtur. — Hab. in *Africa occidentali*: Senegal—Gabon.

128. PICUS *lepidus* Mus. Hein. 118 (Ipoctonus); — dorso fuscovirente, immaulato; uropygio paullo flavidore. Subtus virentialbidus, fuscostriolatus, striolis crissi macularibus, obsoletioribus. Capitis latera alba, fuscovaria, vitta submalari fusca, elongata; postoculari latiore, obsoletiore. Alae et cauda virentifuseæ, maculis sordide flavidalbidis scapisque supra subtusque flavis. Pileus fuscescens, dilutior; in *mare*, ut in reliquis, pone oculos ruber. Ala 81 mm. — Hab. in *Abyssinia* (Mus. Hein. ♂♀). A praecedente parum differre videtur).

129. PICUS *abyssinicus* Stanley, Salts Voy. 1816; — Mus. Hein. 116 (Ipocet.); — P. *desmursi* Malh. 1849; — Mon. Pic. I, 202, t. 42; — dorso fuscoflavescente, immaulato; uropygio tergoque (utr. sexus) rubris. Vitta malaris et v. postocularis definitæ; obscurius fuscæ; haec paullo latior et brevior quam altera. Gastræum flavoalbidum, fuscostriolatum. Alæ fusceæ, fulvoalbido-fasciatae; rectrices fusceæ, maculis superne fulvis, subtus flavis. Scapi superne fuscescentes, subtus flavi. Pileus *maris* et *feminæ* ut in praecedentibus, sed antice pallidior. Ala 95—100 mm. — Hab. in *Abyssinia*. (Malh.)

130. PICUS *minutus* Temm. Col. 197; — Malh. I, 208, t. 45; — Mus. Hein. 114; — griseus, dorso minus definite fuso-albidoque fasciato; gastræo sordide albido, maculis fusceis, rotundatis vario, uropygio rubro. — Alæ et cauda fusceæ, albidomaculatæ, scapis flavis. Vitta malaris elongata, fusca; postocularis obsoleta. Pileus cinerascens; *maris* postice ruber. Ala 80 mm. — Hab. in *Africa occidentali* (Malh.; Mus. Leydense).

TRIBUS 5. *Pici menstrui.*

Superne fuscolutescentes, uropygio rubro, plaga ventris medii rubra vel flavescente, indefinita. Scapi nigrofusci (interdum subtus pallidi, nec flavi), rectricum apice concolores (nigri). — Rostrum ut in Tr. præcedente et in P. medio formatum; longius, capitè fere æquale. — Digitus 4:tus tertio evidenter longior. Cauda mediocris: æqualis $\frac{2}{3}$ alæ, brevius gradata sed pennæ longius acutæ, apice non pallescentes. Dorsum et gastræum non vel obsolete variegata. Pennæ alarum caudæque, cum variegatae sunt, maculis marginalibus, numerosis, pictæ, ut in sp. majoribus Tr. præcedentibus: rectrices saepe omnino immaculatae sed maculæ, dum adsunt, utriusque marginis 10, saepe in fascias confluentes. Remiges cubiti in utroque margine 8 v. 9-maculatæ; saepe tamen apice extusque immaculatae; primariæ semper apice longo, immaculato. — Differentia sexus omnibus eadem: pileo *maris*, præter frontem, rubro; *feminæ* non rubro. — Sp. tantum Africanæ, mediae magnitudinis. (Gen. *Scolecotheres* R:beh. Handb. Spec. Orn. 1854; — *Mesopicos!* Malh. pars).

1:o. Capite nigro alboque picto (*Camponomus Mus.* Hein. 137).

131. *PICUS pyrrhogaster* Malh. R. Z. 1845, 399; — Mon. Pic. II, 41, t. 58; — Mus. Hein. 137 (*Campom.*); — *Supra fuscus, luteo-tinetus, uropygio rubro; subtus albus, transversim nigromaculatus, vitta longitudinali, media, rubra.* Gula et latera capitis alba, vitta malaris vittaque postoculari elongatis, nigris, subæqualibus. Pileus *feminæ* totus nigricans; *maris* ruber, antice posticeque nigricans. Ale extus dorso concolores, obsoletius pallescenti maculatae. Remiges intus fuscae, albomaculatae. Rectrices nigricantes, immaculatae. Ala 117 mm. C. 74. — Hab. in *Afr. occidentali*: Sierra Leone (σ° Mus. Upsal. Afzel.); Ashantee ($\sigma^{\circ}\varphi$, Mus. Leyd.).

2:o. Capite cinereo, absque vittis ordinariis (*Scolecotheres M.* Hein. l. c.).

132. *PICUS menstruus* Scop. Delic.; — Mus. Hein. 134 (*Scolec.*). — *P. capensis* Gm. (ex Buff. et Pl. Enl. 786, 2); — Lth. 37; — Malh. II, 42, t. 62. — *P. caniceps* Wagl. Syst. 46; — Obscurior, alis extus immaculatis. — Obscurius fuscus, luteo-micans. præsertim in dorso et gutture inferiore. Latera capitis cum gula obscure cinerea immaculata; pileo *maris* rubro antice fuscocinereo, *feminæ* toto obscure cinereo. Uropygium late rubrum. Plaga ventris media, indeterminata, in σ° seniore rubra; in juniore et φ lutescens, levius rubidotincta; in φ juniore obsoleta, vix lutescens. Remiges intus albomaculatae. Cauda tota nigricans, immaculata, pennis lateralibus subtus pallescenti-micantibus. Rostrum nigrofuscum, max. inf. in senioribus, $\sigma^{\circ}\varphi$, albida, apice nigricante. Ala, σ° 110 mm.; φ 108; c. 76. — Habitat in *Afr. meridionali*: in *Colonia capensi* (juxta urbem fr.) et in *Caffraria*; ad Portum Natal. Specimina numerosa M. Sthm. a J. Wahlberg aliisque allata. (Specimina Caffra paullo minora: ala σ° 105, φ 102).

Obs. *Dendrobates immaculatus* Sw. W. Afr. II, 152; — Malh. II, 47; — M. Hein. 135; — præter dubium idem est, ac præcedens, neque in *Afr. occidentali* inventus, sed ex specimine capensi (majore) descriptus, de quo ipse auctor l. c. dicit, se patriam ejus ignorare. Eadem avis, olim quoque, a Sonneratio, ex insula Luzon allata dicebatur, unde oritur *P. manillensis* Gm., Lth. 31.

133. *PICUS goertan* Gm. (Pl. Enl. 320); Lth. 32; — pallidior, alis extus flavoalbidomaculatis. — Caput et gastræum pallide cinerea pileo *maris* rubro, (ante oculos cinereo). Crissum parum distincte, hypochondria obsolete, fusco albidoque, crebre et transversim variegata, plaga ventris media flavescente vel rubida. Dorsum fuscolutescens, uropygio late rubro. Alæ fuscae, extus flavoalbido-, intus albo-maculatae. Pennæ cubiti extus maculis 8: ultima ad apicem sita. Rostrum et pedes toti fusci. — Hujus speciei stirpes, vel varietates geographicæ, duæ cognitæ sunt, quas vero potius sub uno nomine conjugendas censeo quia specimina non semper, ad unam alteramve, nisi ex cognitione patriæ, certo referri posse videntur.

a) Orientalis; *P. spodocephalus* Bp. Csp. I, 125; — Malh. II, 49, t. 63; — Mus. Hein. 137. — $\sigma^{\circ}\varphi$, Seniores: plaga ventrali rubra; ala circiter 110 mm.; — Juniores: plaga ventrali lutescente vel obsoleta; rectricibus mediis intus albostriolatis.

Mas senior: totus paullo saturatius coloratus, quam femina et junior, gastræo tantum sub alis obsolete albidovario; ventre medio late, obsoletius flavescentitincto, plumis mediis apice indeterminate rubris. Dorsum omni signo fasciarum caret. Alæ extus virentifuscae tectricibus parvis mediisque immaculatis. Majores vero et remiges omnes extus maculis parvis, sordide flavoalbidis ornatæ. Rectrices nigricantes; extima striolis vel punctis albidis: marginis externi 10; interni, ad apicem sitis, 2 vel 3. Penna 2:da margine extero plus minusve albido-punctata vel (in veteribus) immaculata.

Femina senior: pileo toto pallide cinereo. Venter totus obsolete fusco pallidoque fasciatus, plaga media, ut in mare, rubra. Dorsum et alæ ut in mare; maculæ tamen alarum paullo majores et albidiiores; non vero plures. Rectrices nigricantes. Laterales, utrinque 2, striis ab utroque margine transversis, fascias fere 10 angustas, interruptas formantibus. Penna tertia extus albido-punctata; reliquæ, extus, vestigia obsoletis fasciarum; media intus striolis 3 v. 4 albis.

Mas junior: pileo, ut in seniore, rubro; plaga ventrali flavescente vel obsoleta, non rubra. Venter obsolete fasciatus quam in femina; dorsum vix præbet vestigia fasciarum. Alæ ut in ♀ seniore, sed maculæ adhuc latiores, et in pennis cubiti ultimis fascias integras formantes. Rectrices ut in ♀ seniore; mediæ tamen extus quoque maculis paucis albidis notatae.

Femina junior: tota reliquis pallidior, dorso evidentius fusco pallidoque fasciato. Venter ut in seniore fasciatus, plaga media lutescente. Alarum maculæ latiores, pallidiores; in ala complicata fascias integras, albidas formantes. Etiam tectrices mediae et proximæ minores late, definite albido-fasciatæ. Rectrices ut in ♂ juniore; sed maculæ lateralium latiores, fascias integras, flavoalbidas formantes.

Habitat circa *Nilum album* (Kordofan, Sennaar) freqvens, unde specimina numerosa nobis attulit Prof. Hedenborg, et in *Abyssinia*.

b) Occidentalis, *P. goertan* Gm. — Malh. II, 45, t. 63; — Hartl. Orn. West-afr. 179; — Mus. Hein. 136; — senior et junior: plaga ventrali flavescente vel obsoleta (nec rubra); rectricibus mediis immaculatis, nigrofuscis. — Ala senioris, utr. sexus, 107; ♀ junioris 103 mm. — Seniores, ut præcedentis, paullo obscurius cinerei; juniores paullo laetius flavidoinduti. Minus maculati videntur: dorsum fasciis omnino caret; gastræum, etiam feminæ junioris, non magis variegatum quam in ♂ adulto præcedentis. Alarum maculæ, in vario statu sexus ætatisque, paullo minores quam in præcedente, nec unquam fascias formare videntur (aves tamen hornotinas non vidi). Tectrices magnæ in mare immaculæ; in femina, extus, obsolete fusco-pallescenti maculatae. Eadem et mediæ, in ♀ juniore, maculis parvis, albidis; minores vero semper immaculatae. Rectrices 6 mediae immaculatae (in ♂, ♀ et juniore. Hartlaub vero l. c. in ♀ solum par medium immaculatum, reliquas omnes margine albopunctatas, describit). Laterales, utrinque 2, ut in mare præcedentis, margine albostriolatae (♂ senior et ♀ junior); quædam vero extimam solam striolatam, secundam vero margine vix nisi obsoletissime, pallidius fusco-punctatam, habent (♀ senior, ala 107 mm). — Habitat in *Senegambia* Africæ occidentalis.

Obs. *P. poliocephalus* Hartl. Orn. W. Afr. 179 (*poicephalus* Sw. W. Afr.), *paullo minor* (ala 3 $\frac{3}{4}$ p. = 98 mm), "rectricibus binis externis margine vix albidomaculatis", non magis, quam femina nuper descripta, distinguendus videtur.

TRIBUS 10. *Pici fuscorubidi*,

Majusculi, rufofusci, obscurius rubro-picti, non variegati; cauda brevi (æquali $\frac{3}{4}$ alæ). — Rectrices fasciis pallidis 6, in margines excurrentibus; remiges maculis utriusque marginis, vel fasciis, 8 v. 9, pallidis. Rostrum majus, longitudine capiti æquale, vel longius; rectum, validum, apice valde cuncatum. Carinæ nasales debiles, antice evanescentes, sed ut in præcedentibus, latissime distantes. Furca menti ante nares ducta, angulo menti sat prominulo. Pedes fortes, tetradaetyli, digitis magnis; dig. 4:us æqualis tertio (sed paullulum variabilis, major vel minor apparent). Plumæ narium setosæ paucae et parvæ. *Mas* a femina differt plagâ ad latera cervicalis rubra. — Patria: *Asia meridionalis et orientalis*. — (Genus *Blythipicus!* Bp.; *Lepocestes* et *Phœoistes* Cab. Mus. Hein. 110).

134. *PICUS pyrrhotis* Hodgs. Journ. As. Soc. 1857; — Malh. II: 37, t. 49; — Mus. Heinean. pag. 111; — supra subtusque obscure rufofuscus, dorso aliquæ lætius rufo fasciat. — Rostrum pallidum. Facies dilutius fusca. Plaga, in *mare*, ad latera cervicalis, magna, rubra. Dorsi fasciæ rufæ angustæ; tergum rufum, nigrofasciatum. Gastræum obscure fuscum; unicolor. Remiges nigrae, fasciis 8 integris, rufis. Rectrices læte rufæ, fasciis 6 angustioribus, integris, nigris. Longit. ala 150 mm. c. 92 (Mus. Britann.; M. Berol.). — Habitat in *Nepalia*.

135. *PICUS porphyromelas* Boie Mus. Lugd.; Malh. II: 39, t. 49; — *P. rubiginosus* Sw. W. Afr. II, 150 (1837; *Hemicircus*; — nec *P. rubig.* Sw. Zool. Ill. 1821, qui n:o 197, infra); — Mus. Hein. 111; — obscure fuscus dorso aliquæ rubrotinetis, non fasciat; ventre nigrore. — Rostrum pallidum. Plaga ad latera occipitis cervicalisque *maris* rubrovaria. Uropygium et alæ magis rubrotinetæ. Remig's primariae fusæ, fasciis pallidioribus, intus obsoletis. Cubitales intus et rectrices fusæ, fasciis angustis, pallescentibus vel obsoletis. Ala circiter 120 mm. c. 72. (Mus. Bremense, Britann., Lugdun. Berol.). — *Malacca, Sumatra, Borneo*.

TRIBUS 11. *Pici debilipedes*.

Fuscovirentes, paullum rubidopicti, non variegati; pedibus tridactylis, parvis (pro Pico). — Rostrum mediocre, fortius compressum, culmine curvato, angulo menti prominulo. Apex cuneatus; carinæ nasales fere obsoletæ, sed latissime distantes ut in præcedentibus: ad nares, latius

a etdmie quam a tomiis remotæ). Digitæ breves, tenues; 4:tus tertio brevior; primus deest. Fasciæ remigum et rectricum ut in Tribu præcedente formatæ. Cauda brevis ($\frac{2}{3}$ alæ). Patria *India*.

136. PICUS grantia Mc. Clell. Z. Pr. 1839; — Malh. II, 104, t. 72; — Mus. Hein. 174 (Geciniscus); — virentifuscus dorso c. uropygio aliquæ sordide, pallidius rubris. — Rostrum pallidum. Caput et collum sordide virentia; plaga verticis, in *mare*, magna, rubra; in *femina* nulla. Corpus subtus virentifuscum. Remiges primariae fuscae, extus rubidae maculis magnis rubidoflavidis, pallidis; remiges omnes intus maculis albidis majoribus. Rectrices fuscorubidae, intus fasciis 4 v. 5 latis, sordide pallidis. Ala circa 125 mm. Cauda 80. (Mus. Britann.). — *Assam* et terræ subhimalayenses, orientem versus.

137. PICUS scotochlorus nob., — *Gecinulus viridis* Blyth. 1862; — Mus. Hein. 174 (Geciniscus); — supra subtusque fuscoviridis, cervicem versus flavescenti-tinctus. — Plumæ tergi apice obscure rubidae. Remiges intus maculis albis, minoribus. Rectrices fuscescentes: 2 mediae immaculatae, reliquæ intus maculis 4 albidis. Rostrum album. Pedes virentes. — *Mas* ignotus. — Habitat in peninsula *indica orientali* (Burmah).

TRIBUS 12. *Pici subvirides.*

Submajores, læte, purius virides; tetradactyli, scapis fuscis, occipite rubro-cristato. Rostrum submajus, leviter compressum (ut in P. medio formatum), carinis nasalibus altis; ante nares fere æque a culmine et a tomiis distantibus. Remigum maculæ marginales in pennis maximis fere 8 (ut in Picis nigrovariaris). Cauda mediocris (æqualis $\frac{3}{4}$ alæ); pennis sat acutis, fasciis multis (fere 11) sed indefinitis (ut in P. viridi). Digitæ 4; quartus tertio brevior. — Patria *Vestindia*. (Genus *Xiphidiopicus*! Bp.).

138. PICUS percussus Temm. Pl. Col. 390 et 424; — Malh. II, 147, t. 86; — superne viridis uropygio vix flavidore; subtus flavo-albidus, striolis sparsis nigris, in pectore longitudinalibus, in hypochondriis crisoque transversis. Latera capitis cum fronte antica alba; vitta pone oculos fusca; malaris nulla. Gula longitudinaliter nigra; plaga juguli rubra. *Mas* pileo cum cervice rubro; *femina*, vertice nigro, albostriolato, occipite cervicque rubris; occiput utriusque suberistatum. — Remiges primariae extus pallidimaculate; omnes intus albomaculate. Rectrices fusco-cinerascentes, fasciis multis, indeterminatis, paullo nigrioribus, secundum medium pennæ obsoletis. Ala circa 125 mm. Venter medius in *seniore* flavus, immaculatus; in *juniore* sordide coloratus. — Habitat in ins. *Cuba*. (Mus. Bremen, Berol.). — Hæc sp. sola inter americanas, affinis videtur P. viridi europæo, a cuius tribu præsertim differt rostro paullo minore, carinis latius distantibus.

Series 3. Pici Ligonirostres.

Carinæ rostri supranasales culmini, quam tomiis, propiores, antice evanescentes (neque tomia attingentes). Nares plumis setosis tectæ; collum largius plumatum, nec angustatum. — Digitus 4:tus plerumque tertio brevior, (interdum ei æqualis; numquam longior). Rostrum plerisque majuscum, leviter compressum; culmine altius carinato, leviter curvato; carinis reliquis minus prominulis, vel obsoletis, præsertim ad apicem. Rostrum igitur in plerisque teretiusculum, vel convexum, nec angulatum. Apex interdum non vel vix cuneatus. Cutis pedum non vel vix oscinina. Alarum tectrices cubitales majores.

1:o. *P. ligonirostres non flaviscapi, americanus. Colore non virescentes* (Tr. 13—15).

TRIBUS 13. *Pici dominicanus*

Nigri et albi, non fasciati vel maculati. Rostrum longius: capiti æquale, carinis nasalibus late distantibus, sed parum prominulis. Digitus 4:tus tertio æqualis. Sp. unica cognita, medite magn:s, *Americana*.

139. *PICUS dominicanus* Vieill. Enc. 1306 (ex Azara); — Malh. II, 217, t. 101; — dorso alisque totis nigris, tergo albo; capite, cum collo, gastræoquo albis; cervice maris flavo. Vitta pone oculos angusta ad dorsum ducta, nigra. Venter medio, longitudinaliter, pallide flavus. Remiges omnes totæ nigræ, immaculatae. Rectrices omnes nigræ, intus, basim versus, late albae, nigrofasciatae (interdum tamen fasciis vix ullis). Ala 160—170 mm. — Carinæ rostri supranasales parum minus, quam in præcedentibus, a culmine distant: ad nares, fere mediæ culmen inter et tomia, sed debiles et antice evanescentes. Totum etiam rostrum fere ut in *P. viridi*, vel *P. aurato*, formatum: longius, culmine leviter curvato, apice minus cuneato. Orbita latius nuda. — Habitat in *Brasilia* et *Regione platensi* (Mus. Bremen, Leyden, Britann., Berol.).

TRIBUS 14. *Pici nigropicti.*

Nigri, albo, rubro vel flavo-picti, dorso alisque, extus, fasciis maculatis ordinariis nullis; rectricibus nigris, basi quoque intusque immaculatis (obs. tamen *P. erythrocephalum*). — Rostrum fortius, capite paullo brevius, apice evidenter cuneatum, culmine leviter arcuato, carina inferiore evidente. Carinæ nasales debiles, antice obsoletæ, culmini, quam

tomiis, proprieores; sed tamen paullo distantiores quam in plerisque sequentium. Furca menti brevior quam dimidia maxilla inferior. Orbita nuda. Alæ et cauda longiores. Digitus 4:tus subæqualis tertio. — Sp. americanæ, mediæ vel minoris magnitudinis. (Gen. *Melanerpes* Sw. *Melampicus!* Malh.).

A. Tergo albo, remigibus basi nigris, intus (extusque) immaculatis.

140. *PICUS erythrocephalus* L. — Malh. II, 209, t. 97, — pennis cubiti albis, basi nigris. — Senior, utriusque sexus: capite colloque, cum gutture toto, rubris; ventre tergoque albis. Dorsum et tectrices alarum cœruleonigra. Remiges primariae totæ nigrae, immaculatae. Rectrices nigrae; laterales, utrinque 2, basi apiceque albæ; sæpe vero dextræ et sinistre disparres. Rostrum basi pallescens. *Mas* purius coloratus; rostro basi latius albido. *Femina* differt gutture rubro inferius nigrocineto; rostro basi vix pallido. Ala. ♂♀, circiter 135 mm.

Junior, capite colloque, cum gutture toto, fuscis, obsolete maculatis, pileo obscuriore. Dorsum fuscum. Venter sordide albidus. Alæ, fere ut senioris, pennis cubiti albis, macula ad apicem nigra. — In *America septentrionali* (inter .30 et 45° lat. frequens. In California quoque inventus; Gambel). Hieme meridiem versus frequentior (Audub.).

141. *PICUS portoricensis* Daud. — Malh. II p. 217, t. 97; — supra niger, capito concolore, loris, orbitis tergoque albis. Gastræum cum gutture toto rubrum, lateribus griseis. Alæ et cauda totæ nigrae. Ala 120 mm. — Hab. in ins. *Portorico*. (Malh.).

B. Tergo albo; remigibus nigris, intus albomaculatis.

Remiges basi quoque nigrae maculis 5 v. 6 albis, parvis, marginis interni. Venter lateribus albido nigroque fasciatus, vitta media, lata, rubra.

142. *PICUS rubrifrons* Spix Brasil.; — Malh II, 196, t. 98; — et *P. melanocephalus* Natt., Malh. p. 195 (♀); — supra niger tergo flavid-albo. Plaga verticis *maris* rubra, *feminæ* nulla. Caput præterea totum, cum collo pectoreque antico, nigra; immaculata. Venter, ut nuper descriptum, medio ruber, lateribus fasciatus. Ala 110 mm (♂♀ M. Sthm.; 120 Malh.). — *Brasilia* interior.

143. *PICUS hirundinaceus* Linn. X (Albin 3, t. 23); — Lth. 8; — Malh. II, 192, t. 98; et — *P. meropirostris* Wagl. Malh. p. 197; — simillimus præcedenti; unice differt vitta supra oculos incepta, flava, occiput eingente ibique fulvo-lutea. Diff. sexus et cet. ut in deser. prioris. Ala 115—120 mm. (Malh. M. Stockh.). Tergum cum tectr. caudæ album, leviter flavidotinctum. — Habitat in *Surinamo* (M. Sthm.), *Brasilia* int. et *N. Granada*.

144. *PICUS flavifrons* Vieill. N. Dict.; — Wagl. Syst. sp. 63; — Malh. II, 107, t. 100. — *P. rubriventris* Vieill. Dict., et Enc. 1324; — fronte gulaque (c. gutture medio) flavissimis; vertice occipiteque *maris* rubris, *feminæ* nigris. — Vitta per oculos lata, nigra. Corpus superne nigrum, cœrulescentineus, linea dorsi media tergoque albis. Guttur inferius et latera corporis antica flavidogrisea; latera posteriora et crissum flavidio nigroque fasciata, venter medius longitudinaliter, late

ruber. Variat gutture rubro adperso. Ala 120 mm. — *Brasilia*. (M. Sthm.).

C. Tergo, albo; remigibus basi intusque albis.

Venter albus. Pennæ cubiti, intus, macula sœpe una vel altera, a reliqua albedine distincta.

145. *PICUS melanopogon* Licht. Temm. Col. 451. — *P. formicivorus* Sw. Phil. Mag. I; — Malh. II, 199, t. 99, — niger, fascia juguli latissima alba, in medio pallide flava, utrinque ad angulos oris adscendente. Gula et plumæ nasales nigræ; frons alba. *Mas* vertice, pone frontem albam, occipiteque rubris; *femina* vertice nigro, occipite rubro. — Ala 140—150 mm. Tergum et venter alba. Fascia antepectoralis lata nigra, postice maculata; in mare sœpe rubrovaria. Remiges primariæ pleræque, basi, extus intusque longe albæ; cubitales extus non, intus longe lateque albis. — *Junior* subtus sordidius albus, nigrostriolatus. — *Mexico* (M. Berol.); *California* (M. Sthm.).

146. *PICUS flavicularis* Selater Z. Pr. 1856, 307; — *P. flavigula* Natt. Malh. II, 202, t. 99, (nec *P. flavig.* Bodd.; v. n:o 34); — similissimus præcedenti; differt fascia juguli tota (etiam ad latéra) flava. Fascia antipectoralis nigra, tota albomalata. *Mas* occipite solo rubro; *femina* caret colore rubro capitis. Ala 147 mm. — *Columbia, Panama*. (Malh.).

147. *PICUS xantholarynx* R:bach, Handb. Sp. Orn.; — Malh. II, 204, t. 100; — niger, subtus albus, lateribus guttureque infimo nigrostriolatis. Gula tota pallide flava (absque plaga nigra); vitta malaris nigra. Pileus *maris* totus ruber; (*femina* ignota). Plumæ nasales et latera capitidis alba (absque vitta per oculos nigra). Alæ et cauda ut in 2 præcedentibus. Ala 148 mm. — *Patria* ignota. (Malh.).

D. Nigri, ænescentes, tergo c. tectr. caudæ, remigibusque totis, nigris.

148. *PICUS torquatus* Wils. Am. Orn.; — Malh. II, 214, t. 96; — niger, viridiænescens, collo undique (torque) pallide cano; ventre c. gutture inferiore roseo (pallide cano, crebre rubrostriato). Caput supra nigrum, capistro, cum vitta per oculos brevi, rubris. *Mas* senior: gula nigra, mento rubro; *femina* gula mentoque albis. — Alæ et cauda immaculatae, nigræ. Ala 170 mm. (M. Sthm. ♂).

Junior gutture transversim nigromaculato. — *Hornotinus* fuscior, torque nullo, gula nigra, rubidonotata; gastræum totum sordidius cinerascens, minus rubropictum, striolis transversis, nigris notatum. Remiges apice albdomarginatae. (Malh.). — Habitat in America septemtr. occidentali: *California, Oregon*.

149. *PICUS herminieri* Lesson. Traité, 228; — Malh. II, 198, t. 100; — totus niger, æneoniteus, gula ventreque rubido lavatis. Alæ et cauda unicolores. Ala 133 mm. *Mas* pileo antice fuscorubido. — *Guadeloupe* (Malh.; Mus. Berol.).

TRIBUS 15. *Pici albofasciati*

dorso aliquo nigro, crebre albido fasciatis; rhachidibus pennarum nigris, subtus fuscis, non flavescentibus. — Caput et gastræum pallide cinerescentia, plus minusve rubro vel flavidopicta, non maculata: plaga vel vitta indefinita ventris medii, fere semper rubra vel flavescente. Crissum nigroværiegatum. Remiges nigræ, maculis utriusque marginis albis: in cubitalibus fere 8, ultima ad apicem sita; in primariis paucis, confluentibus. Rectrices nigræ, plerumque albomaculatae: extima in margine externo, media in interno maculatis; utraque in altero margine immaculata. Pennæ vero interiacentes non vel minus maculatae. (Maculae rectricum typice, in lateralibus fere 10, in mediis 7 v. 8 apparent; quædam vero, basi, semper desunt). Iris in adultis rubra; rostrum nigrum, ut in Tribu præcedente formatum, sed carinae nasales a culmine minus distant, et carina inferior plerumque rotunda. Digihi 4: quartus tertio subæqualis vel paullo brevior. — Patria: *America calidior*, ab æquatore septentriones versus, fere ad 50° lat:s, præsertim vero regio mexicana. — (Genus *Centurus* Sw.; *Zebrapicus!* Malh.).

1:o. *Uropygio rubro; rectricibus non maculatis.*

150. *PICUS striatus* Gm.; Lth. 39; — Malh. II, 231, t. 107; — dorso aliquo nigro, latius flavescenti-fasciatis, tergo rubro. Macula ad latera cervicis unica, nigra albaque. — Latera capitis cum fronte antica cinerascentia, unicoloria. Pileus *maris* ruber; *feminae* niger, postice ruber. Gastræum sordide fulvescens, immaculatum, vitta ventrali nulla, sed antice rufescenti-, postice flavescenti-lavatum. Rectrices nigræ; laterales, utr. 2 vel 3, plus minusve pallescenti-tinctis et marginatis. Ala 120 mm. — *Junior* similis seniori, colore vero sordidior. — Hab. in insula *Hayti*. (M. Sthm.). Sp. a reliquis sat distincta.

2:o. *Uropygio albo, vel colore dorsi fasciato; cauda albo-notata.* (Sp. typicæ, fasciis dorsi non flavidis).

A. Rectrices nigræ, tantum media et extima striolis maculatis marginibus parvis notatae. Orbita immaculata. (Obs. P. gerini, n:o 162).

151. *PICUS radiolatus* Wagf. Syst. Sp. 39, — et *Isis*, 1829, 512; — Malh. II, 237, t. 104; — supra niger, dorso, cum tergo aliquo, striis transversis tenuissimis, albis, undato; facie, plumis nasi, gulaque albis. — Gastræum fuscescens, ventre medio rubro. Remiges maculis paucis parvisque albis. Rectrices nigræ, mediae intus, extima extus, striolis marginalibus, angustis, albis. *Mas* pileo toto rubro; *femina* occipite solo rubro. Ala 134—140 mm. — Striae dorsi albæ tenuissimæ, sed æque ac in *P. carolinus* (sp. 155) distantes; uropygii latores. — *Jamaica* (Malh.).

152. *PICUS albifrons* Swains. 1827; — Cabanis, Journ. 1862, 324; — *P. dubius* Cabot; — *P. erythrophthalmus* Licht.; — Malh. II, 243, t. 105; — supra niger striis transversis albis, angustis, cebri-

oribus; uropygio albo, immaculato; plumis nasalibus rubris, fronte sordide albida. — Caput et gastræum grisea, ventre medio rubro, crasso transversim nigrostriato. *Mas* pileo c. occipite rubro, fascia frontis albida (Mh.; ♂ M. Sthm plaga verticis rubra ab occipite rubro distincta: Vera Cruz, Januari 1843, Högberg); *femina* pileo griseo, antice albido, postice rubro. Rectrices ut in præcedente. Striae dorsi circiter 7 albæ in spatio 20 mm numerantur. Ala 125—130 mm. Habitat in *Mexico* (♂♀ M. Stockh.).

Obs. *P. Santa Cruzi* Bonap. 1837; Malh. 241, t. 105; — a præcedente unice differt plumis nasalibus ventreque medio flavescentibus, plus minusve rubidotinctis, quod vix nisi ætatem juniores indicare videtur (Cab.). Frons eodem modo albida. Hic inventus in *Mexico* meridionali et in *Guatimala*, Cab., et usque ad fines Texanas, Baird, Report 110: *C. flaviventris* Sw. Two Cent. 110. Ala ♂ 130—125 mm; ♀ 120 (Mus. Berol.).

153. *PICUS aurifrons* Licht. Wagl. Isis 1829, 512; — Malh. II, 240, t. 104, — cervice fronteque c. plumis nasalibus flavis. — Caput et gastræum cinerascentia. Pileus *maris* plaga majore rubra; *feminae* totus cinereus. Venter medio flavidus; crasso lateribusque postice nigrofasciat. Dorsum et alæ nigræ, fasciis albis minus angustis (fere ut in *P. carolinus*); uropygio albo. Rectrices mediae immaculatae vel macula singula, parva, alba, ad basim; penna extima maculis marginalibus, albis, non parvis; (proxima interdum apice albonarginata Malh.). — Ala 131—136 mm. — Hab. in *Mexico* septentrionali (nec prope Bogotá; Cabanis, Journ. 1862, 323). (Mus. Berol.).

B. Orbita immaculata. Rectrices nigræ maculis albis majoribus pictæ. (Penna extima maculis et, apicem versus, fasciis, latioribus picta; 2:da maculis marginalibus parvis; media pogonio interno albo fasciis maculis nigris vario, externo juxta scapum albo).

154. *PICUS polygrammus* Cabanis, Journ. 1862, 326 (Centurus); — supra niger, crebrius albofasciatus, uropygio albo; plumis nasi plagaque cervicis luteis. — Caput et gastræum grisescentia, ventre medio flavo-tincto, postremo maculis angulatis, nigris vario. Fasciae dorsales crebrae. (fere ut *P. albifrons*), sed albae et nigræ latitudine subæquales. Rectrices mediae latius albo-, quam nigro-pictæ: pogonio interno albo, maculis 5 parvis nigris; externo, vitta, secundum scapum, longa alba; limbo externo, scapo apiceque nigris. Penna extima extus apiceque albofasciata; proxima extus parum albonacula. Femina pileo griseo antice pallido, subalbido. *Mas* ignotus. Ala 130 mm. — *Mexico*: St. Bartholo. (Mus. Berol.).

155. *PICUS carolinus* L. — Malh. II, 232, t. 103; — supra niger fasciis albis nigrisque subæqualibus; uropygio albo, maculis fasciis paucis, angulatis, nigris; plumis nasalibus rubris. *Mas* pileo toto cum cervice rubro; senior quoque stria malari obsoletiore rubra; *femina* pileo obscurius cinereo, fronte antica cerviceque rubris. — Caput reliquum et gastræum pallide grisea, gula albidiore, vitta ventrali pallidius rubra, crasso nigromaculato. Rectrices nigræ; media pogonio interno

albo, fasciis 6 nigris; externo vitta juxta scapum alba, angustiore. Penna extima fasciata; proxima circa apicem albomaculata vel marginata. In dorso, fasciæ 4 albæ spatium explet 20 millimetrorum; fasciæ nigræ paullo latiores quam albæ. Ala, in senioribus utriusque sexus, circa 130 mm. (M. Sthm). — Hab in *America septemtrionali*, præsertim inter 35° et 45°, vel fere ad 50°; vix autem in regione occidentalí, juxta mare pacificum; hieme meridiem versus, in Carolina — Florida et Texas, abundat (Audub.). Color ruber in speciminibus occidentalibus saturatior, in occidentalibus dilutior (Baird. Rep.).

156. *PICUS uropygialis* Baird. Philad. Proc. 1854 (Centurus); — Report 1858, 111; — Cab. Journ. 1862, 330; — *P. kaupii* Bp.; — Malh. II, 245, t. 106; — superne albo nigroque, paullo latius fasciatus, uropygio quoque fasciato. Caput et gastræum fulvogrisea, cervice concolore, ventre medio luteo, crasso nigrofasciato. Plaga verticis *maris* rubra, *feminæ* nulla. Plumæ nasales dilute griseæ (nec flavescentes). Rectrices ut in *P. carolino* pictæ: media pogonio interno late albofasciato, externo nigro, juxta scapum angustius albo. Penna extima latius fasciata; proxima, extus maculata, apicem versus interrupte fasciata. Ala 125—130 mm. — Habitat in *Mexico*, et *Texas* (Baird. Non in *Bolivia*). Mus. Berol.

157. *PICUS hoffmanni* Cabanis, Journ. 1862, 322; — supra (fere ut præcedens) fasciatus, uropygio albo; plumis nasalibus plagaque cervicis flavis. Vertex *maris* ruber, *feminæ* cinerascens. Caput reliquum et gastræum grisescentia, ventre medio luteo (interdum rubido-tineto). Crissum nigrovarium. Rèctrices medie albæ, fasciis nigris in pogonio externo regularibus, in externo macularibus; extima extus, 2:da non vel parum maculata. Ala circa 122 mm. — Hab. in isthmo Americæ medio: *Costa rica* (M. Berol.). Picturâ similis *P. aurifronti*; parum vero sequente differt.

158. *PICUS tricolor* Wagl. Isis 1829, 512; — Malh. II, 247, t. 106; — Cabanis, Journ. 1862, 327; — minor, fasciis dorsi albis parum angustioribus quam nigris; uropygio pure albo; rectricibus mediis albis, fasciis nigris, intus regularibus, extus obliquis v. macularibus, (scapo apiceque nigris); extima extus albomaculata; secunda immaculata (vel apice albonotata). Caput et gastræum sordide grisescentia, cervice ventreque medio lutescenti-rubris. Plumæ nasales flavescentes; frons paullum albidipallens. Pileus *maris* plaga magna rubra, a pictura cervicis frontisque distincta; *feminæ* grisescens, paullum fuscovarius. Crissum fuscomaculatum. Ala 108 mm (♀ jun. Venez. 98). — Habitat in *Nova Granada* et *Venezuela* (Cab.; M. Berol.; M. Stockh.).

Obs. Variat colore cervicis et ventris medii, in mare seniore intensius rubido; plumis nasi, in mare, apice sëpe rubidis; in femina et juniori subgriseis, vix flavis.

Quædam: facie undique flavescente et uropygio nigromaculato (Patr. incerta, M. Berol.; typus descr:s Wagleri, Cab.); Veris: *C. subelegans* Baird, Report 109, (sub. *C. carol.*); ex "Mexico septémtr." (an rite?). Fasciæ dorsales albæ hujus avis angustiores dicuntur; ala (4½ p. angl. =) 113 mm.

Neque distinctus videtur *P. rubriventris* Sw. — Malh. 248, t. 107; — striis albis dorsi angustis, (ut in *P. albifronte*), pileo cervice que *maris* continuis, rubris; ventre medio rubro; facie c. reg. nasali flava; uropygio albo, immaculato; rectricibus ut supra descriptis; ala 106 mm; *patria* ignota (ex conjectura, Mexico); — præter dubium ex Venezuela vel N. Granada interiore, unde specimina, recentissima allata, a Cabanisio l. c. describuntur, neque a *P. tricolore* Wgl. distincta habentur. (Veris. mas senior).

C. Orbita vel striola supra oculum nigra.

Rectrices fere ut in præcedentibus (B) pictæ. (Sp. minus typicæ).

159. PICUS *hypopolius* Wagl. Isis 1829, 514; — Malh. II, 228, t. 103; — capite, collo gastræ quo obseure fulvogriseis, fronte albida, orbita fusconotata. Pileus *maris* anterior ruber: *feminæ*, præter frontem, totus fuscogriseus. Stria malaris, in senioribus utriusque sexus, rubida. Corpus superne, fere ut in *P. carolino*, fasciatum, uropygio albo, longitudinaliter nigrostriolato. Vitta ventralis nulla rubida; crissum fuscovarium. Rectrices nigræ; mediæ fasciis pogonii interni fere 4, vittaque parva in basi pog. externi, juxta scapum, albis; laterales, utrinque 2, margine externo albomaculatæ, interno minus albonotatæ. Ala 123—130 mm. — Mexico (Malh., Mus. Berol.).

160. PICUS *elegans* Swains. 1827; — Malh. II, 225, t. 102; — orbita tota latius nigra, cervice flava. Dorsum c. alis et uropygium nigra, albofasciata; gastræum sordide griseum, ventre medio flavo, crasso nigrofasciato. Frons albida. Plumæ nasales et vitta capitis lateralis, indefinita, a maxilla inferiore ad occiput ducta, flavæ. Pileus *maris* ruber, *feminæ* fuscogriseus. Rectrices mediae in utroque pogonio latius albofasciatae; laterales, utrinque 2, in utroque margine albomaculatae; maculis tamen in pena secunda parvis, paucisque. Ala 120—130 mm. — Mexico. (Mus. Berol.).

161. PICUS *superciliaris* Temm. Col. 433; — Malh. II, 223, t. 102; — plumis nasalibus rubris; fronte latius alba. Pileus *maris*, pone frontem, cum cervice, ruber, striâ laterali, juxta oculos, nigra; *feminæ* antice latius albus; dein niger, cervice rubra. Dorsum et alæ latius albo nigroque fasciatæ, uropygio albo, fasciis nigris angustis. Gastræum grisescens, ventre medio rubro, hypochondriis postice crisoque maculis transversis, angulatis, nigris. Rectrices nigræ; media pogonio interno, extima extus, latius albofasciatis. Ala circa 140 mm. — Hab. in Cuba (Malh.; Mus. Berol.).

162. PICUS *gerini* Temm. Pl. Col. in deser. tab. 433 (ex Gerini Orn. II, 48, t. 171; — Lath. sp. 18, *P. carol. d.*) — Malh. II, 231; — *P. pucherani* Malh. 1849 — et II, 227, t. 103; — Lateribus capitis nigris, striolâ pone oculos albâ, inter vittam superciliarem (ad latera pilei) vittamque postocularem sitâ; regione nasali flava. — Superne albo nigroque fasciatus, uropygio tergoque albis, immaculatis. Pileus *maris* ruber; *feminæ* antice grisescens, medio niger, postice ruber. Gastræum grisescens, gula albidiore; ventre medio rubro, lateribus nigrofasciatis. Rectrices minus quam in reliquis albopictæ; mediæ pog. interno fasciis

paucis, angustis albidis; laterales, utr. unica, pog. externo albomaculato, et, ut in proxima, apice albidonotato. Ala 125—130 mm. — Hab. in Ins. Antillis (Tabago), Guatimala, Nova Granada (Malh.), Ecuador (Mus. Berol.).

Obs. *Picus aurocapillus* Sw. Z. Proc. 1832, 4, ex Mexico, male descriptus; a Cl. Malherbe (II, 250) post sp. hujus Tribus memoratus, similis praecedenti (*P. pucherani* Mh.), sed dubius habetur. Descriptio vero allata potius *Picum americanum*, tridactylum, exhibere mihi videtur.

2:o. *Pici ligonirostres non flaviscapi*, Veteris Orbis. Omnes colore virescentes vel rubidi. (Tr. 16—19).

TRIBUS 16. *Pici guttiventres*

Sp. minores, fuscovirides, subtus alboguttatae, scapis fuscis (nec flavis). Remiges intus late albæ (non maculatae); extus albomaculatae. Rectrices totæ nigrae, vel maculis paucis, albis, marginalibus. Rostrum capite multo brevius, culmine curvato, apice acutius cuneato, carinis nasalibus fortibus, sed culmini proprioribus, apice evanescens. Digi 3:us et 4:us, in sp. 2 cognitis, subæquales. Stria malaris nulla. Patria, Africa. Afines *Picis chrysuris*, Tr. 20. (Ab auctt. in varia genera imposita; *Pardipicus* Bp. Csp. Zygod.; etc. v. infra).

163. *PICUS caroli* Malh. Rev. Z. 1852 (Chlorop.); — Monogr. II, 157, t. 91; — *Cripotheres caroli* Mus. Hein. 131; — fuscoviridis, gastræo, cum gula lateribusque capitis, crebre albidoguttato. — Pileus obscurius fuscus, *maris* posterius rubro-varius; *femine* unicolor. Regio postocularis late fusco-rubens. Corpus superne unicolor. Remiges primariæ extus maculis paucis, parvis, marginalibus, albidis; remiges omnes intus late albidæ, quasi limbo latissimo, e maculis confluentibus formato. Rectrices nigrae, extima sola extus albomaculata. Guttulae gastræi rotundatae, diametro $2\frac{1}{2}$ mm. Regio superciliaris etiam guttatus. Ala circa 100 mm. — Habitat in *Africa occidentali*, sub æquatore: Gabon, Malh., Camma, Mus. Hein. (♀ Mus. Berol.).

164. *PICUS pardinus* Temm. Mus. Lugd. — *Stictocraugus pardinus* Mus. Hein. 130; — *Dendromus nivosus!* Sw. W. Afr. II, 162; — *Chrysop. nivosus* Malh. II, 151, t. 92; — fuscovirens, subtus crebre albidoguttatus, lateribus capitis gulaque pallidis, fuscostriolatis; cauda tota nigra. Pileus fuscior; *maris*, occipite solo rubro; *femine* absque rubro. Remiges omnes intus late fulvoalbidæ; primariæ extus albomaculatae. Parvus: ala 90 mm. — *Africa occid.* (sub æquatore et in Senegambia, M. Hein.; Guinea, Malh.).

Obs. Nomen antiquius, *nivosus*, pessime huic datum, rejiciendum. — In descriptione hujus, ut sæpe in Vol. 2:do operis Malherbiani, nomina remiges et rectrices commutata vel confusa sunt.

TRIBUS 17. *Pici mesospili*[†]

Virescentes, parum variegati, cauda longius gradata, tota nigra, lateribus capitis vittatis, occipite cristato. Rostrum fortius, longitudini capitis æquale, culmine recto, alto; apice valde cuneatum; carinis nasi debilibus, culmini propius sitis. Furca menti longa: sub $\frac{3}{3}$ suturæ extensa. Remiges nigrae, maculis paucis albis (fere ut in *Picis* plerisque); sed maculæ internæ in medio pogonii int. sitæ, nec marginales, quod huic sp. fere peculiare. (Indeque nomen hujus Tribus petitum est). Pedes minores, in sp. cognita tridactyli. Digitus 4:us tertio brevior. Patria Malayasia. (Sp. cognita, a plerisque, cum *P. javanensi*, infra n:o 228, congesta).

165. *PICUS rafflesii* Vig. — Malh. II, 102, t. 72; — Mus. Hein. 173 (Chrysonotus); — tridactylus, virentifuscus, dorso, cum uropygio alisque, luteomicante; gula fulvoalbida; vitta malari (antice imperfecta) vittaque postoculari nigris, longis, cum vittis 2 albis alternis. Pileus postice crista status; maris ruber stria superciliari, ad latera sita, nigra; feminæ totus niger. Gasterum fuscum, maculis in hypochondriis paucis, albis. Cauda tota nigra; longa: æqualis $\frac{3}{4}$ alæ. Remiges omnes intus nigrae, maculis 3—5 parvis, rotundis, albis, a margine remotis, in medio pogonio interno sitis. R. primariae extus quoque nigrae; 3—7 apice griseæ. Quædam, in margine externo, maculis perparvis, albidis notatae (in femina 3—5. Hæ maculæ in mare obsoletæ). Rostrum pedesque fusi. Ala circiter 140 mm (maris 135, feminæ 148 mm; M. Stockh.). — *Juv.* superne minus luteo-micans; ♂ hornot. pileo nigro, crista sola rubra (Mh.). — *Singapore*; *Sumatra* (Java, M. Hein.).

TRIBUS 18. *Pici flavinuchales*.

Sp. mediæ vel submajoris magnit:s, virides vel rubro-tinetæ, plumis occipitis longis, cristam formantibus: inferioribus læte flavis (superioribus rubris vel virentibus). Cauda elongata: æqualis $\frac{3}{4}$ alæ; fortius gradata, nigra, unicolor. Remiges omnes intus nigrae, maculis 4—6 albidis, a margine plerumque paullum, vel saltem ad latera, distinctis; primariae sæpius extus quoque maculatae. Rostrum, plerumque, capite paullo brevius, crassiusculum, apice acutius, subcuneatum; culmine curvato, carinis nasi fere obsoletis, furca menti longa (fere ad $\frac{3}{3}$ suturæ). Pedes fortiores; dig. 4:0 multo breviore quam 3:tio. — Asia meridionalis. (Gen. *Chrysophlegma* Gould; *Venilia* Bp.; *Brachylophus* Strickl.; *Chloropicus*, pars, Malh.).

166. *PICUS flavinucha* Gould Z. Pr. 133, 120; — Malh. II, 106, t. 73; superne lætius viridis, capite fusco-virente, superne rufescens-lavato, gula maris flava, feminæ fuscorufescente; plaga juguli nigra, albo-

maculata. Crista inferior flavissima. Venter fuscovirens, antice obscurior. Remiges primariæ utrinque, cubitales intus, nigræ maculis majoribus rufis. Cauda nigra, immaculata. Rostrum albidum, basi latius fuscum. Ala circa 165 mm ($\sigma^{\delta} \varphi$, M. Berol.; M. Stockh.). — *India septentrionalis* (etiam Assam, Burmah, Jerd.).

167. *PICUS mentalis* Temm. Col. 384; — Malh. II, 112, t. 75; — supra subtusque obscure viridis, alis extus fuscorubris; gutture infimo lateribusque colli obscure rufis, jugulo nigro, albostriolato. — *Mas* laetiæ coloratus, gula (ut jugulum medium) nigra, albostriolata; regione malari fusca, albidotata; lateribus capitis colore pilei. *Femina* paullo major, sordidius picta, gula cum reg. malari lateribusque capitis rufescens. Pileus utriusque sexus obscurius fuscoviridis, crista inferiore flava, elongata. Remiges, ut in precedentibus, nigræ, rufomaculatae; cubitales fere 3 ultimæ virentes; reliqua extus et tectrices omnes rubræ. Cauda nigra immaculata. Rostrum nigrum, circa angulum menti albidum. Ala σ^{δ} 135; φ 146 mm (M. Sthnn). — *Java; Singapore.*

168. *PICUS puniceus* Horsf. L. Tr. XIII, 176; — Malh. II, 110, t. 70; — fuscoviridis dorso laetior, gula paullo dilutiore, fulvescente; alis extus pileoque toto (in utr. sexu) rubris. Crista inferior flava. Gasterum dorso paullo obscurius, immaculatum; hypochondriis cerebro albo-maculatis. Vitta malaris *maris* rubra, *feminae* nulla. Remiges omnes, intus, maculis parvis albis, primariæ, extus, 1 vel 2 adhuc minoribus pictæ. Cauda nigra. Rostrum nigrum maxilla inferiore albida. Ala 130—140 mm. — *Junior* sordidius coloratus, ventre quoque sparsius (subobtekte) albonaculato. — *Java, Sumatra, Malacca.*

169. *PICUS chlorolophus* Vieill. Enc. 1309 (descrip. mala); — Malh. II, 108, t. 74; — superne hæto viridis; pileo concolore; striæ superciliari rubra. Jugulum viridifuscum; venter c. criso fusco albidoque fasciatus. — *Mas*, stria superciliari, a naribus orta, pileum totum cingente, striaque malari rubris. *Feminae* stria superciliaris tantum pone oculum adest; malaris nulla. — Crista occipitis inferior latissima flava. Latera capitum et gula albida, fuscovaria. Remiges intus tantum albonaculatae; mediae quædam extus rubidotinctæ. Cauda nigra. Ala circiter 146 mm. — *India septentrionalis*, præsertim juxta Montes Himalaya. (Mus. Berol.; Jerdon.).

170. *PICUS xanthoderus* Malh. Rev. Z. 1845; — Monogr. II, 114, t. 75; — fuscoviridis, alis extus viridibus, plumis rubrolimbatis; ventre transversim albonaculato. *Mas* pileo vitta que malari rubris; *femina* pileo virescente, occipite late rubro; vitta malari nulla. — Remiges omnes intus, primariae quoque extus, fulvo-albido maculatae. Crista occipitis inferior flava. Ala 120 mm. (Malh.). — *India meridionalis*: Malabar, Ceylon (Jerd. Ind. I, 290: "P. chlorophanes Vieill.").

Obs. Nomen *P. chlorophanes*, huic, a Blyth, Catal. p. 59 [impr. 1852] lapsu datum, pro *P. chlorolopho* Vieill., quod tamen est sp. præcedentis. — Idem verisimiliter "*P. chlorophanes* Vieill.", R:bach Handb., Picinæ 359, c. figg. φ tab. 629, etsi remiges prim. extus rubræ, cubitales extus virides exhibeantur.

171. *PICUS miniatus* Forster Z. Ind.; — Lth. 50; — Malh. II, 116, 76; — pileo alisque fuscescentirubris; dorso tergoque maculatis; ventre fulvescente, fasciis crebris, nigris, flexuosis et angulatis, vario. — *Mas* vetus, superne laetius ruber, dorso antico rubro, vix pallidimaculato, postico flavovirenti; gula c. lateribus capitis laete rufofulvis, punctis cerebrimis, parvis, albidis, nigrocinetis; fronte antica fusciore, punctis minoribus, albidis. *Femina* sordidius rubra, gutture lateribusque capitis rufescentibus, immaculatis; dorso virenti, fuso, pallido rubidoque maculato. Cetera ut in mare. — *Junior* sordidior magisque maculatus. — Plumæ occipitis elongatæ; inferiores subvirentiflavæ. Remiges omnes intus, primariae etiam extus fulvescentimaculatae. Rectrices tote rubido-nigrae. Rostrum basi crassum, latum; apice sat acuto; nigrum maxilla inferiore pallida. Ala circiter 130 mm. — *Malacca* (freq. ex Singapore); *Sumatra* (Raffl.); *Java* Horsf. (ex Batavia M. Sthm).

TRIBUS 19. *Pici virides*.

Majores, lætius virides (vel canescentes) superne immaculati, uropygio viridiflavo, nitente; subtus pallidiores. Non cristati. Cauda elongata: æqualis $\frac{4}{3}$ v. $\frac{4}{3}$ alæ, pennis fuscis plus minusve pallidifasciatis vel maculatis (in plerisque ut in *P. viridi pictis*; cf. infra). Remiges primariae utrinque, cubitales intus, nigricantes, albomaculatae. Maculae numerosæ: cubitalium submarginales, intus fere 10; sed 11 et 12, juxta apicem, plerumque omnino desunt. In primariis fere 9 extus adsunt, apice toto, intus longius, immaculato. — Rostrum capiti subæquale, vel longius, ut in *Tr. præcedenti* formatum, vel apice paullo fortius cuneatum. Pedes fortes, digito 3:o ceteris longiore. Patria Asia cum Europa et Africa septentrionali, sicuti *Pici nigrovarii*. — Genus *Gecinus* Boie, *Isis* 1828; *Brachylophus*, Sw. Classif. II, (1837).

a) Ventre fuscescenti-striolato: plumis ventris pallidis, stria intramarginali, concentrica, virentifusca ornatis. Scapus quoque saepe fuscus. Rectrices nigriores (Sp. indicae).

172. PICUS *vittatus* Vieill. Dict.; et Enc. 1317; — *P. dimidiatus* Temm. descr. absque icone post descr. *P. leucogastrum*, Pl. col. tab. 501; — Wagl. sp. 88; — Malh. II, 132, t. 76; — minor, gutture toto pallide virentifulvo, immaculato; cauda nigra, immaculata, vel maculis paucis, parvis, pallescentibus in pennis mediis et in marg. externo extimae. — Ala circa 130 mm. Pileus *maris* totus ruber, stria superciliari nigra; *feminæ* totus niger. — In utr. sexu: latera capitis cinerea, fuscovaria; vitta malari nigra, albovaria. Venter, dorsum, remiges, cf. descr. generalem. Alæ extus paullo obscuriores, fulvoindutæ. Rostrum fuscum, max. inferiore albida. (M. Sthm.). — Java, Sumatra, Malacca, Arracan.

173. PICUS *squamatus* Vig. Z. Proc. 1830, 8; — Malh. II, 131, t. 78; — simillimus precedenti, sed major: ala 170 mm. — Præterea

differt: rostro fere toto pallido; gutture (immaculato) pallide virenti-grisecente; rectricibus nigrofuscis, fasciis griseo-albidis, scapo interruptis, evidentibus, sed indefinitis. Diff. sexus ut prioris. (Mus. Berol.). — *Nepal, Caschmir.*

174. *PICUS striolatus* Blyth. Journ. As. S. XII; — Malh. II, 134, t. 78. — Iterum simillimus P. vittato (172), eique magnitudine aequalis. Differt gutture toto fuscescentiostriolato: striis, ut ventralibus formatis, sed latioribus, fuscovirentibus. Rectrices nigrofuscæ; mediæ fasciis griseopallescentibus, interruptis; laterales, extus, maculis griseo-albidis. Differentia *sexus*, rostrum et pictura P. vittati, sed uropygium lætius flavum; alæ extus purius virentes; vitta malaris potius alba, nigrostriolata. (M., Stockh.). *India* fere tota: Himalaya — Malabar (Jerd. Ind. 287).

b) *Gastræum seniorum non striolatum,*
vix, vel tantum postice, maculatum; sed in juv. hornotino, plerumque majore parte, maculis transversis, angulatis, varium. (Extra-tropicæ).

175. *PICUS viridis* L.; — Lth. 27; — Malh. II, 118, t. 79; — lateribus capitis, a rostro, paulum pone oculos, nigris. Pileus utr. sexus totus ruber plumis basi cinereis. Vitta malaris, a nigredine faciei non distincta, nigra, *maris* rubro varia; *feminae* tota nigra. Ala 165—170 mm. — Viridis, interdum cinerascens; subtus pallidior, postice, praesertim in femina, maculis transversis, fuscescentibus notatus. Uropygium viridiflavum, nitens. Rectrices fuscae, fasciis pallescentibus, indefinitis, scapo interruptis, numerosis; in mediis fere 9, sed apex longior niger, immaculatus; in lateralibus, (utrinque 2 vel 1) fere 11. Iris senioris albida. — Habitat in *Europa*, a mari mediterraneo, ad lat. 60 v. 61°; sed in Hibernia deest, nec in aliis partibus mundi cognitus.

Juv. hornotinus: superne maculis plumarum mediis, albidis vel pallidis, subtus maculis crebris, transversis, subsagittatis, nigris, varius. Gula et latera capitis collique fuscostriolata. Fasciae caudæ et maculæ alarum pallidiores et evidenter quam in senioribus.

176. *PICUS avokera* Temm. Pl. Col. 585; — Malh. II, 128, t. 80; — simillimus P. viridi: virescens, lateribus capitis collique cinereis, loris (totis, ante oculos) nigris. — Pileus *maris* ruber, *feminae* cinerascens, postice ruber. Vitta malaris utriusque sexus rubra. Crissum et hypochondria maculis majoribus, nigris, transversis. Rectrices ut in præcedenti, vel paullo nigriores. Ala circiter 135 mm. (M. Berol.). — Hab. in *Japonia*.

177. *PICUS algirus* Vaillant, Expl. de l'Alg. 1849; — R:beh Handb. p. 348 (1854); — *P. vaillanti* (Chlorop.) Malh. Cat. d'Ois de l'Alg. — Monogr. II, 122 t. 82; — viridis, lateribus capitis virenti-anis, striola lori tenui, malari lata, nigris; pileo *maris* toto rubro; *feminae* cinereo, fuscomaculato, occipite rubro. Ala 155—160 mm. — Inter P. viridem et P. canum intermedius. Gula albida; fasciolæ abdominis arcuatae, fuscovirentes. Uropygium læte flavum. Alæ et cauda ut in P. viridi. — *Algieria; mons Atlas.* (Mus. Stockh.).

178. *PICUS occipitalis* Vig. Z. Proc. 1830, 8; — Malh. II, 129, t. 77; — saturatus viridis, rostro toto nigro, lateribus capitis cum loris cinereis, stria malari utriusque sexus nigra; pileo cum cervice nigro, plaga frontali in *mare* maxima, rubra, in *femina* nulla. Crissum et hypochondria non maculata. Rectrices fuscæ; laterales immaculatæ; fasciæ tamen pallidiores in mediis adsunt. Ala circa 150 mm. (M. Berol.). — *Nepal, Assam, Burmah.* (Jerd.).

179? *PICUS tancola* Gould Z. Pr. 1862, 283; — Swinh. ibid. 1863, 268; — et Ibis 1863, 389. — Simillimus *P. occipitali*, a quo differre dicitur maxilla inferiore albida, apice fusca, loris nigris, alis extus fulvescenti-viridibus, maeulis externis remigum fulvis. Rectrices laterales plus minusve pallidifasciatæ. Iris alba. Paullo minor dicitur, quam *P. occipitalis*: ala 140 mm (5½ p. Swinh.). — A Swinhœ, l. c. intermedius dicitur inter *P. occipitalem* et *P. guerini*. Patria quoque intermedia: montes *Chinæ meridionalis* et insulæ *Formosæ*. (Mihi ignotus).

180. *PICUS guerini* Malh. Rev. Z. 1849; — Monogr. II, 127, t. 80; — latius viridis, capite pallido, cervice nigrōmaculata. Stria lori et stria malaris nigræ. Pileus *maris* antice late ruber; *feminae* cinerascens. Ala 150 mm. — Simillimus *P. cano*, et inter eum et præcedentem medius; differt maeulis cervicis, coloreque latiore; alis fulvescentiviridibus. Alæ et cauda ut in illo. (Malh.). — *China* (Shanghai etc. circa 30° lat. Swinh.).

181. *PICUS canus* Gm. (Edw. 65); — Malh. II, 124 et 294, t. 81; — *P. norvegicus* Lath. 33; — dilutius viridis (vel cinerascens), subtus pallidior, capite pallidius cinereo, stria lori striaque malari angustis, nigris; cervice immaculata. *Mas* plaga frontali rubra; *femina* pileo toto cinereo. Ala circa 150 mm. — Remiges extus purius albomaculatae; rectrices dilutius fuscæ, fasciis, in media et extima, parum distinctis, pallidis. Reliquæ pennæ ut in præcedentibus, fere unicolores. Seniores subtus immaculati. Iris dilute rubra. — *Juvenis* auni, supra subtusque minus vel obsoletius maculatus. — Hab. in *Europæ* dimidio orientali, a Græcia, fere ad circulum polarem; deinde, præsertimque, per *Asiam septentrionalem*, usque ad mare japonicum et *China septentrionali* (Swinh. Z. P. 1863, 167).

Obs. *P. Karelini* Brandt Bull. Petersb. X, 12; — Malh. II, 126 (fig. nulla); — ex *Persia*; pileo cano, plumis medio nigris, apice rubris, vel, in fronte, albis. Latera capitis collique et gastræum albida, vitta malari nigra, infra albovaria, supra albomarginata; gutture medio ventreque fuscomaculatis. Plumæ dorsi fuscæ, albofasciatæ, apice flavovirides. — Videtur juv. hornotinus sp. cuiusdam hujus Tribus. Cl. Malh., ex indicio Brandtii, eum l. c. juv. ipsius *P. viridis* suspicatur. (Vix *P. persicus* Gm.; Lth. 34 (unice ex Aldrovando); cuius in descriptione neque Picum, nec aliam avem agnoscere possumus).

3:o. *Pici Ligonirostres flaviscapi*, Veteris orbis. Omnes africam.
Tribus 20, 21).

TRIBUS 20. *Pici chrysuri*

Sp. mediae vel minoris magnitudinis, virescentes, gastræo nigrovario, non rubropicto. Pileus niger, rubropictus, vel totus ruber. Remiges, intus, maculis marginalibus fere 6; — 7 a et 8 va, ad apicem sitæ, plerumque obsoletæ, non observandæ. Cauda mediocris, circiter $\frac{3}{5}$ ale æqualis, fasciis rectricum pallidis, interdum nullis, plerumque fere 10, indeterminatis vel subobsoletis. Scapi pennarum utrinque, vel tantum subtus flavi. Rostrum capite brevius, vix compressum, sutura recta; culmine leviter arcuato, furca menti $>\frac{1}{2}$ suturæ. Apex acutior, plus minusve cuneatus. Digitus 4:us tertio brevior. (Sp., a plerisque, cum sequenti Tribu, vel cum sp. Tribus 16mæ, quibus affines videntur, conjunctæ).

a) Minores, superne immaculati.

Scapi superne fuscæ.

182. *PICUS brachyrhynchus* Sw. W. Afr. II, 160; — Malh. II, 152, t. 91; — Mus. Hein. 132 (typus gen:is *Campotheræ* Gr.); — dorso alisque extus lætius fuscoviridibus, immaculatis; gastræo sordide flavoalbido, cerebro nigrofasciato; jugulo lateribusque capitis fasciis nigris arcuatis, cerebrioribus; gula fulvescentialbida, nigromaculata; subalaribus flavoalbidis, late nigrofasciatis. *Mas* pileo toto rubro, plumis basi cinereis; *femina* pileo nigro, tenuius fulvoalbido striolato, occipite cum cervice rubro. — Remiges margine externo immaculatae (vel "vestigiis macularum in summo margine primariarum"); intus maculis majusculis. Rectrices nigrofuscæ, extus late virescentes, immaculatae. Rostrum capite multo brevius, basi sat latum; fuscum, subtus, basim versus, paullum pallescens. Ala 100 mm. — Junior: pileo antice et medio nigricante, plumis sparsis apice sordide rubris. Ala 91 mm. Culmen r. 16 (M. Sthm.). — *Gabon.*

183. *PICUS maculosus* Valenc. Dict. 1826; — Malh. II, 156; et — *P. chloronotus* Cuv.; Malh. tab. 92; — *Campethera vestita*, Cassin Philad. Proc. 1863, 197, et — Trans. 1863, t. 51; — simillimus præcedenti. *Femina* differt: plumis subalaribus fulvoalbidis, fere immaculatis; collo undique, cum lateribus capitis cerviceque, dilute rufescens; nigrovariis (ut in præcedenti); remigibus primariis extus distinctius albomaculatis. Pileus niger, punctis rufis varius. Ala 100—105 mm. (Malh., l. c., ubi tamen icon et deser, inter se differunt). — *Sierra Leone, Senegal.*

Obs. Hanc avem ipse non vidi, crederem vero eam a præcedente non, nisi sexu et ætate differre. Hæc enim (*P. maculosus*) est femina senior; altera vero sp. (*P. brachyrh.*) ex junioribus et ex mare seniore ejusdem speciei descripta videretur.

184. *PICUS gabonensis* Verreaux, Rev. Z. 1851, 513 (Dendrobrates); — Malh. II, 149, t. 91; — Mus. Hein. 129 (Gen. *Ipopatis* M. Hein.); — subetus flavoalbidus, nigromaculatus: maeulis parvis, crebris, oblongis vel subcordatis. Latera capitis fuscostriolata. Vitta malaris in utroque sexu angusta, fusca. Superne fuscovires, immaculatus; pileo *maris* rubro, fronte virentifusco; *feminae* toto fusco. Rectrices fuscae, extus paullum virescentes, subetus flavidomicantes. Parvus, ala 80 mm. (Malh.). — *Afr. occid.*, sub æquatore: Gabon. — (Obs. In descr. Malherbii dig. 4:tus tertio longior dicitur. Incertum an hoc loco enumerandus sit).

185? *PICUS* (*Polipicus*) *elliotti* Cassin, Philad. Proc. 1863, 196, et — Trans. 1863, tab. 51; — *Femina*: superne virescens, immaculata, alis extus luteo-, uropygio rubido-mieantibus, pileo toto nigro. Gastræum sordide flavoalbidum, nigrostriolatum. Remiges omnes extus immaculatae, intus maeulis majoribus albidis; scapis supra fuscis, *subetus flavoalbidis*. Tectrices subalares albidae, nigromaculatae. Rectrices nigrofuscæ, subetus flavoviridi-mieantes; laterales in pagonio interno maeulis sordide pallentibus. (Scapi?). Latera capitis sordide fulvopallida, vittis ordinariis nullis. Rostrum subalbidum, max. superiore basi longius fuscenscente. Ala (3 $\frac{3}{4}$ p.) 95 mm. — *Africa occidentalis*, ad flumen Muni, juxta mare, sub æquatore. (Cassin).

Obs. Avem hanc, quam non vidi, hoc loco, post præcedentem, mihi non magis cognitam, dubius affero, eas vero inter se affines esse suspicor. Forte prope Tribus nostras SVM vel 9am cumerandæ?. *P. ellioti* a primo descriptore affinis *Picis viridibus* et præsertim Tribui *P. punicei* (nostri n:o 168) habetur, a quibus tamen differt magnitudine exigua, "dígito 4:to longiore quam 3:tio", picturâque omni. Præterea de forma dicitur: ala elongata, pennâ 5:ta longiore; cauda elongata; rostrum subrectum, basi latum. (Apex, carinæ, furca menti, nares, non descriptæ).

b) Superne flavidovariegati,

subetus flavoalbidi, nigromaculati; rectrices maculatae vel subfasciatæ. *Mas* pileo vittaque mali rubris (pileus vero antice potius fuscus, rubro-maculatus); *femina* pileo nigro, alboguttato, postice rubro, vittaque mali albovaria. — Remiges primariae et cubitales extus albidomaculatae. Notæ albidae dorsi et tectricum alarum, in singula pluma 2 v. 3, in senioribus minores, maculas circa scapum exhibentes, in junioribus plerumque latiores, fascias formantes. — *Africanus*. (Gen. *Chrysoptilus* Sw.; *Chrysopici* pars Malh.; *Ipagrus* Mus. Hein.).

186. *PICUS bennetti* A. Smith, Report 1836, 53 (Chrysoptilus; tantum ♂); — Mus. Hein. 123 (*Ipagrus*; non bene descr. nec synon. corr.); — *P. variolosus* Licht., Malh. II, 165 (et t. 95, lapsu "*P. abingtoni*" inscriptus); — *Mas*: gula et lateribus capitis (cum vitta ad nares ducta) pure flavoalbis, immaculatis; vitta mali lata pileoque toto rubris (plumis basi nigrocineris); — *Femina*: gula lineaque a naribus, sub oculo ducta, pone oculos valde dilata, rufescentinigris; vitta mali latissima et v. postoculari angustiore, albidis, tenuius nigrostriolatis; pileo nigro, crebre alboguttato, postice rubro. — *M.* et *fem.* Corpus superne obscure

fuscescens, fasciis maculisve flavoalbidis pictum: 1 apicis et 1 media eujusque plumæ. (Fasciæ 5 albidae spatium fere 21 mm. occupant; in mare seniore abbreviatæ, maculas circa scapum exhibent). Uropygium æque flavescenti et fusco fasciatum. Gastræum (præter gulam) sordidius flavum, maculis parvis nigris guttatum. (Maculæ antice rotundatae, dein oblongæ, in medio ventris nullæ, in lateribus transversæ; magnitudine sat variabiles: majores, in gutture inferiore, lat. $1\frac{1}{2}$ —3 mm; in senioribus fere majores, quam in junioribus, apparent). Alæ extus albidomaculatae. Maculæ remigum cubiti posteriorum fascias albidas, (in mare seniore late interruptas) formant. Remiges primariae extus, in mare seniore, immaculatae; in reliquis, maculis parvis albidis notatæ. Rectricæ fuscæ, plus minus distinæ pallidifasciatæ, subtus flavidonitentes; apice nigritantes. Scapi remigum et rectricum supra subtusque flavissimi. Rostrum nigrofuscum, carinis nasalibus debilibus, culmini propioribus. Iris rosea. Ala: maris 122—127; feminae circa 120 mm. — Hab. in *Caffraria superiore* (intra fines Reipublicæ hodiernæ transvaalensis; circa 24° Lat., unde plura specimina attulit J. Wahlberg. (M. Stockh.).

187? PICUS *capricorni* Strickl. & Slater, Contrib. to Orn. 1852, 155 (Campeth.); — Malh. II, 169; — *Mas* simillimus præcedenti, differt vero rostro paullo fortiore, et uropygio nigromaculato: fasciis in maculas solutis. Plumaæ enim flavoalbæ, macula intra apicem cordata fasciisque 2 vel 3 interruptis, pectæ. Macule quoque gastræi minores dicuntur. Ala 123 mm. — Hab. in *Africa merid.* ad occidentem, circa tropicum *capricorni* (Auctt. citt.). Femina ignota.

188. PICUS *chrysurus* Sw. dorso punctis flavescentibus maculato (nec fasciato); gula lateribusque capitis plus minus nigrovariis; gastræo flavoalbido longitudinaliter nigromaculato: maculis majoribus in apices plumarum productis et cum nigredine basali conjunctis (indeque medio angustis, quasi a binis compositis). Rostri carinæ nasales fortiores et a culmine paullo remotiores, quam hæ carinæ in reliquis sp. Rectrices fuscescentes, maculis pallidis interrupte fasciatæ: subtus flavomicantes, apice flavescentes; scapo superne flavissimo, subtus pallidius flavo. Scapi remigum superne fuscoflavescentes; subtus lète flavi. *Mas* pileo vittaque malari rubris, plumis basi late cinereofuscis (unde pileus antice fuscus, rubromaculatus). *Femina* pileo nigro, alboguttato, (guttulis rotundis, diam. 1 mm; nec in striolas formatis), postice rubro; vitta malari albo-nigroque varia (plumis nigris, macula apicis albida)

a) Occidentalis, *P. chrysurus* Sw. W. Afr. II, 158; — Hartl. W. Afr. (ex Sw.); — Mus. Hein. 128; — colore magis griseescens minusque flavotinctus, lateribus capitis nigromaculatis. Præterea sequenti similimus ab auctt. citatis exhibetur. Magnitudo varia videtur: ala 106 mm (4", 2 angl. Sw.) vel 120 mm (4" 9 Germ. Mus. Hein.). *Afr. occid.* Sv.; *Casamanze* (Gambia, 12 $\frac{1}{2}$ Sept.) Mus. Hein. — Ipse hunc non vidi; neque cl. Malherbio exinde cognitus. Curatus igitur inquirendum an specimina re vera ex Afr. occid. allata sint?

b) Meridionalis, *P. abingoni* A Smith Report 1836, 53 (Chrysoptilus); — *P. chrysurus* Malh. II, 153, t. 94; — undique lætius flavidus, sed scapi remigum superne fusciores. Latera capitis cinerea, scapis tenuibus nigris striolata; inferius non albidiiora, postice nigro-

maculata. Maculæ gulae parvæ, discretæ, oblongæ; in femina apices plumarum attingentes ibique dilatatae. Maculæ gastræ reliqui angustæ, sed longæ. Maculæ dorsi et tectricum flavescentes, in singula pluma due: altera in apice, altera in medio scapi; parvæ subrhombicae, non in fascias dilatatae, sed striolâ scapi longa, tenui, albida, conjunctæ. Uropygium irregulariter fasciatum. Rostrum nigricans, subtus paullo pallidius. Diff. sexus et eet, conf. deser. generalem. Ala, ♂ 103; ♀ 109 mm (et fere ita in omnibus speciminiibus nostris). R. culmen 23 mm. — Habitat in *Caffraria*, circa Portum Natal, unde specimina multa, mensib. Junio et Julio occisa, nobis attulit J. Wahlberg. — Hæc forma proxime ad *P. notatum* accedit. A cl. Gurney, B. of Natal, Ibis 1862, 37, nomine "*P. Smithii* Malh." exponitur, quod minus rectum videtur. Hi tamen Pici, hoc loco, non nisi dubie separantur. Colore quidem generali et formâ macularum distincti videntur; an vero constanter differant, ideoque species distinctæ habendi sunt, ulteriore examine determinandum est.

Obs. *Chr. calliaudi* Malh. II, 167 (fig. nulla), nil aliud videtur nisi juvenis hornotinus hujus (*b*). Hinc forma rostri brevis, acuta, carinis fere obsoletis, et pictura paullo sordidior. Cl. Malherbe duo tantum specimina noverat, quee feminas, seniorem et juniores, habuit; quorum hoc, ad *Portum Natal* d. 26 Dec. 1839 occisum, in museo Stockh. invenitur, mihiique hodie ad manum est. Quod præter dubium est specimen juvenile avis nuper descriptæ. Ab adultis præcipue differt maculis gastræ latioribus et brevioribus, rotundatis, minus in apicem plumæ excurrentibus et striolâ tenui cum macula basali, occultata, conjunctis. Maculæ gulae latae, sed fere obtectæ. Maculæ quoque albidae dorsi, paullo majores. Pileus nigrofuscus, antice crebre albopunctatus; medio (triturâ?) immaculatus, postice ruber. Reliqua fere ut in senioribus, sed specimina nostra hujus avis, omnia, paullulum inter se differunt. Striole inter maculas dorsi, in deser. citata, nigrae dicuntur, et in plumis dorsi anterioribus, brevioribus, spatium inter maculas latius, nigricans, adest, ubi scapus niger; sed in plumis longioribus, ut in avi seniori, scapi albidi sunt. Ala 102 (nec 108) mm. Rostrum culmen 21.

Alterum specimen Malherbio cognitum, in museo Nantesiano asservatum, patriâ ignotâ, a Stockholmiensi differre dicitur: pileo, etiam medio, albopunctato, et "scapis rectricum! superne fuscescensibus"; mihi vero ignotum.

189? PICUS *smithii* Malh. R. Zool. 1845, 403; — *P. abingtoni?* Bp. Csp. 128; — *Mas*, vix vel parum flavescenti-tinctus, superne fuscus, albidofasciatus, subtus sordide albidus, longitudinaliter nigromaculatus. Latera capitis fuscoalbida, superne posticeque nigromaculata, vitta paullo pallidiore, vix vel parum nigrovaria, a naribus, sub oculos auresque ducta, lata, indefinita, maculaque pone oculos nigra, irregulari picta. Apices rectricum minus flavescentes (resinâ quadam obliti indeque potius fusi dicendi). Pictura pilei, alarum et caudæ, etsi color paullo obscurior, exacte ut in præcedente (*b*). Scapi remigum et rectricum utrinque laete flavi, (scapi remigum superne vix infuscati). — Pictura totius

gastræi, generatim ut in præcedenti et maculae codem modo formatæ, sed tamen sat variabiles. Alterum specimen nostrum (*mas* junior, sed 2:do habitu?) in gula totoque gastræo, exacte ut pleraque præcedentis, maculis angustis pietum; alterum vero (evidenter *mas* senior, rostro validiore) maculas habet gutturis medii et inferioris latas, extremitate angustiore in apicem plumæ excurrentes. Hinc pluma quævis nigra, limbo, vel maculâ, ad utrumque latus apicis sita, albida. Quedam etiam maenlam medium, albida, exhibit. Maculæ nigrae menti perparvæ, formâ variae, sed in apicibus plumarum latiores; gula posterioris latiores; plumæ enim basi margineque nigrae, maculam rotundatam albida, nigro-cinctam, exhibit; sed plumæ laterales, juxta vittam malarem sitæ, albidiores, puncto medio, oblongo, nigro, notatae. — Pictura dorsi, a præcedentis, in eo differt, quod plumæ fasciis irregularibus, albidis, pictæ sunt. Hæ fasciæ in plumis posterioribus 2 vel 3, in anterioribus solitariæ adsunt; macula vero apicis in omnibus parva, oblonga, adest. Rostrum fortius, longitudine culminis circiter 26 mm, totum nigrofuscum. Ala senioris 111 mm; alterius 115. — *Femina* mihi ignota. — Specimina duo descripta, in regione Caffrariae edita, montana, intra flumen Limpopo, prope tropicum Capricorni sita, ab amico defuneto J. Wahlberg, d. 29 Oct. et 11 Nov. 1843 occisa.

Hic, etsi præcedenti simillimus, ab eo distinctus videtur. Differt præcipue: dorso fasciato, picturâ capitis lateralî paullum diversa rostroque majore (sed forma rostri simillima). Color obscurior, minus flavescens, tritûrâ plumarum forsan oritur et anni tempestati proprius esse potest? — Hæc pici forma confusionem quandam sp. affinum in Monographia Malherbiana attulisse videtur; sed in descriptione P. chrysuri et inter synonyma hujus et P. benetti memoratus appetat.

190. *PICUS brucei* Malh. II, 170, t. 93; — gutture toto lateribusque capitum nigris, alboguttatis; vitta genarum latissima, alba a naris in latera collî ducta. *Mas* pileo vittaque mali ut in præcedenti, rubris, plumis basi longe fuscis. Corpus superne fuscum, maculis transversis virescentibus et uropygio fasciato; subtus viridialbidum, maculis nigris, sagittatis vel V-formibus. Scapi rectricum utrinque flavi; (remigum?). Alæ ut in præcedenti pictæ. Cauda flavescentifusca, colore nigriore fasciata, apicibus fuscis. Ala 105 mm. *Femina* ignota. — Habitat in *Africa meridionali* "apud Betjuanas". (Malh.).

Obs. Hæc sp. mihi ignota, maxime affinis præcedenti appetat. Differt quidem pictura capitis lateralî distinctius alba nigraque, et, ut videtur, plumis totius gutturis nigris, macula centrali alba. Vix tamen impossibile videtur, hanc non esse nisi statum perfectiorem præcedentis, qua de re judicent illi, quibus ambos propius cognovisse contigerit. Specimen P. smithii, a Malh. l. c. descriptum, intermedium fuisse videtur.

191. *PICUS notatus* Licht. Verz. p. 11; — Malh. II, 162, t. 95; — Mus. Hein. 127; — fuscior, lateribus capitum cinereis, creberrime nigromaculatis albidoque striolatis; gastræo toto, cum gula, sordide flavo, maculis magnis, rotundis, nigris, crebre vario; scapis remigum et rectricum superne fuscis, subtus sordidius flavis. — *Mas* plumis pilei vittæque malaris nigris apice rubris. *Femina* occipite rubro; pileo

reliquo vittaque malari nigris, albovariis: guttulis pilei rotundis. — Dorsum viridifuscum, parce flavidio punctatum, e puncto minimo, obseuro, in apice ejusque plumae. Punctum alterum, in scapo medio situm, vix majus, sed purius albidum. Hoc et striola tenuissima alba ipsius scapi, plerumque obiecta. Uropygium dorso concolor, fasciis crebris, flavidis, punctatim interruptis. Maculae gastræ ubique fere æque crebræ; maximæ, circa guttur infimum sitæ, reniformes, transversæ, usque ad 6 mm latæ; aliae, ad latera pectoris, minus latæ; sed longiores, cordatae; minimæ, in gula et in medio ventris sitæ, rotundatae, circa 2 mm latæ. Remigum maculae interne majusculæ; externæ, in primariis definite, albidae, non parvæ; in cubitalibus multo minores; in pennis ultimis lineolas transversas, tenues, interruptas, formant. Rectrices nigrofuscæ, superne parum, subtus latius viriditinctæ; fasciis 6—8 angustis, interruptis, definitis, flavoalbidis pictæ; apice flavescentes, (apex vero saepe resinæ oblitus, fuscus appareat). Rostrum fuscum, subtus pallescens; long. culm: s 22 mm. Ala circa 104 mm (σ , φ). (Mus. Sthm.). — Hab. in *Africa maxime meridionali*: intra coloniam capensem et in Caffraria adjacente, (sed non prope Portum Natal).

192. *PICUS nubicus* Gm.; Lath. 24 (Pic de Nubie Buff. et Pl. Enl. 667); — Malh. II, 159, t. 93. — Mus, Hein. 125; — *P. ethiopicus* Hempr. & Ehr. Symb. Phys. Dec. 1, uota; — Rüpp.; — (et in iconib. Malh. tab. 94, minus bonis); — superne virentifuscus, latius albidomaculatus; subtus flavoalbidus, maculis rotundis variis, gula, cum gutture medio ventreque medio immaculatis. Latera capitidis cinerea, nigrostriolata, linea angustiore a naribus, juxta vittam malarem, aliaque pone oculos, superciliari, albis. *Mas* pileo toto vittaque malari rubris; *femina* occipite rubro; pileo reliquo vittaque malari nigris, alboguttatis. — Maculae dorsi et tectricum majores, plerumque transversæ, fascias exhibentes et scapi tenuissimi, albidi; sed in *mare* vetere, maculae minores, fere rhombæ. Uropygium fasciatum; fasciæ tergi in maculas rotundas solute. Maculae gastræ minores quam præcedentis: maximæ, in gutture infimo, circiter 3 mm latæ, plus minusve cordatae. Latera colli præsertim crebre maculata. Scapi remigum et rectricum supra subtusque flavi. Remiges præterea ut in præcedente, sed maculae externæ cubitalium latiores. Rectrices dilutius fuscæ, apice flavidæ; fasciis latioribus, sordide pallescentibus, minus late interruptis. Rostrum fuscum, culmine 25 mm. Ala 111 mm (m. & f. sed unus mas 107. M. Stockh. Specimina numerosa). — *Senaar, Cordofan, Abyssinia*. — (Femina juv. pileo medio late immaculato).

193. *PICUS punctatus* Cuv. Valenc. Dict. 1826; — Sw. W. Afr. II, 163; — Mus. Hein. 124; — *P. punctuligerus* Wagl. Syst. sp. 36; — Malh. II, 164, t. 92; — superne dilutius virentifuscus, albidomaculatus, subtus pallide flavus, crebre nigropunctatus; lateribus capitidis albidis, pone oculum leviter infuscatis. — *Mas* pileo vittaque malari rubris. *Femina* pileo nigro, crebre albo-striolato (nec guttato), postice rubro; vitta malari nigra, albomaculata. — Maculae dorsi seniorum rotundatae, minores; juniorum transversæ. Tergum et uropygium fasciata. Gastræ puncta rotunda, minima: diametro vix 1 mm; in plumis singulis plura: antepectoralia 5 v. 7, circa scapum, in serie, cum margine fere concen-

trica, disposita. Puncta in gula rariora, in ventre medio nulla. Remiges et rectrices ut in praecedenti pietæ, scapis supra subtusque flavis. Ala circiter 125 mm. Carinæ rostri nasales tenues et culmni paullo propiores quam in sp. praecedentibus. — *Juv.* hornot. pileo nigrofuscō, non albostriolato, sed postice rubro (Mus. Berol). — *Africa occidentalis* (Senegambia).

194. PICUS imberbis nob. — *Chrysopicus malherbei* Cassin Philad. Proc. 1863, 198, — et Transact. 1863, 459, tab. 51 (nec *P. malherbei* Gray, supra n:o 5); — superne flavidovirens, maculis rotundatis albidis, pennis cubiti apice albidis, praeterea extus immaculatis. Pileus ruber, vitta malaris nulla! Gastræum pallide flavum, maculis rotundatis nigris varium. Rectrices flavo-fuscescentes, scapo apiceque flavis; laterales obsoletius fasciatæ (relique immaculatæ?). — Latera capitis parum, gula vix nigrovaria. Maculæ gastræi similes eis in *P. nubico* videntur, sed in ventre medio parvæ adsunt. Remiges manus nigrofuscæ, extus intusque albidomaculatæ; (scapis?). Minor: Ala (3 $\frac{3}{4}$ poll. angl. =) 96 mm. — *Africa occidentalis tropica* (Zanzibar). Cassin l. c. — Ab affinibus differt vitta mali nullæ, unde nomen petivi, sed avem non vidi.

TRIBUS 21. *Pici aratores.*

Rostrum longius: capiti subæquale, fortius compressum et evidentius curvatum, sutura quoque leviter areuata; apice depresso, rotundato (neque compresso, cuneato-acuto). — Carinæ nasales fere obsoletæ, prope culmen sitæ. Furca menti longior quam dimidia sutura. Sp. cognita fuscescens, tergo ventreque rubrotinctis, capite cinereo, superne non rubropicto. Remiges extus intusque maculatæ: maculis in cubitalibus 8; quarum ultima in ipso apice sita. Cauda elongata: paullo longior quam $\frac{3}{4}$ alæ; fortius rotundata, pennis (ut praecedentium) rigidis, acutis, apice bifidis, et pallidis. Rectricum fasciæ inter Picos plurimæ, sc. 12, et, in pog. externo pennæ lateralis, 14. Scapi remigum et rectricum superne fusi, subtus sordidius flavi. Digitus 4:tus tertio multo brevior. (Gen. *Geocolaptes* Burch.).

195. PICUS arator Cuv. R. An.; — Wagl. sp. 86; — Malh. II, 274, t. 111. — *P. olivaceus* Gm.; Lath. sp. 54 (ex Gen. Syn. I, 599, 50); — Vieill. Enc. 1323; — superne fuscescens, vix virentitinetus, pallide punctatus, tergo ventreque roseis. — Ala 126—130 mm (Mares feminis paullo minores videntur). Caput et collum sordide cinerea, gula sordide albida. Pictura capitis nulla, præter plumas vittæ malaris, in mare, apice obscure rubris (in *femina* immaculatis). Dorsum cum alis fulvescentifuseum punctis plumarum parvis, marginalibus, transversis, pallidis; in alis majoribus, albis. Tergum rubrum, paullum pallidivariegatum. Pectus dilutius rubrum, lateribus crisoque pallidius fuscis, albido fasciatiss. Remiges utrinque albomaculatæ. Rectrices superne nigrofuscæ,

subtus luteonitentes; utrinque fasciis angustis definitis, albidis. Apices rectricum flavescentes (et saepe, praesertim subtus rubro-inquinatae). Tectrices caudae, picturâ, præter apicem, rectricibus similes et insolite magnæ: medium caudæ fere superant, late, firmæ (Mus. Sthm.). — Habitat in Africa maxime meridionali, circa urbem et per coloniam capensem. Etiam circa Port Natal a J. Wahlberg inventus (Januario, habitu trito). Terram effodiendo insectis vermisbusque vescitur, cortici arborum parcere dicitur.

Juv. tergo pectoreque vix vel obsolete rubro-lavatis; dorso vix pallidipunctato; rostro breviore.

4:0. *Pici Ligonirostres flaviscapi*, Americani. (Tr. 22—26).

TRIBUS 22. *Pici canipilei*.

Sp. minores, rostro capite multo breviore, culmine curvato, apice acuto, leviter cuneato, angulo menti sub $\frac{2}{3}$ suturæ sito; carinis nasalibus tenuissimis, juxta culmen sitis. — Corpus superne fuscescens, luteo tinctum, immaculatum (in senioribus paullum rubidolavatum); subtus transversim fusco flavidoque varium. Scapi remigum et rectricum supra fusi, subtus flavi.

Pileus maris fuscescens, ambitu, postice latissimo, rubro; plumis quoque mediis, in senioribus, apice rubris; — feminæ fuscescens, tantum postice, vel non, ruber. — *Vitta malaris magna*; maris rubra; feminæ nigro pallidoque varia. — *Remiges* intus pallide fulvae, non maculatae. *Rectrices* omnes longius acutæ, sat gradatæ; corpori fere concolores, apice nigricantes; non vel obsolete fasciatæ: fasciarum vestigia, dum adsunt, fere 10. — *Digitus* 4:us tertio brevior. — *America merid. tropicæ*. — (Chloronherpes Sw. — Mus. Hein. 161).

196. PICUS canipileus Lafr. d'Orb. Voy. — Malh. II, 173, t. 90; — Mus. Hein. I. c. — dorso alisque æque lutescenti tinctis, gastræo antico regulariter fusco flavidoque fasciato, ventre reliquo (a sterno medio) flavescente, pallidius vel obsolete fasciato. Latera capitis albida, fere immaculata vel tantum postice (ad collum) fuscovaria. Pictura capitis et diff. sexus v. descr. generalem Tribus. Ala 125—130 mm. — ♂ vetus gula nigra, albidoguttata, uropygio lætius flavescente, non fasciato. Venter flavescens, vix fasciatus. Ex Peru Mus. Berol. — ♂ junior? gula tota albida, longit. nigrostriolata. Uropygium flavescens, fusco-fasciatum. Venter evidentius fasciatus. Malh. — *Peru, Ecuador*.

197. PICUS rubiginosus Sw. Z. Ill.; — Malh. II, 174, t. 89; — Mus. Hein. I. c. — dorso alisque concoloribus, fuscis, luteotinctis; gastræo toto regulariter fusco flavidoque fasciato (fasciis flavis posterius latoribus). Latera capitis antice albida, pone oculos fusciora, crebre transversim variegata. Pict. capitis et diff. sex. v. supra. — ♂ senior:

gula nigra, crebre albo guttata; uropygium lætius fulvescens, non fasciatum, postice rubrolavatum (etiam in ♀ seniore); rectrices laterales immaculatæ. (*Guyana*, M. Berol.). — ♂ junior gula antice (mentum) cinerascens, longit. nigromaculata, postice ut gastræum fasciata; uropygium fuscovirens, flavidofasciatum; rectrices laterales vestigiis obsoletis fasciarum fuscuarum variae (*Caracas* M. Stockh.; Malh.). — Ala 115—120 mm. — *Guyana*, *Venezuela*, *Ecuador* (Mus. Hein. sed vix Yucatan, ut dicit Malh.).

198. PICUS *yucatanensis* Cabot, Boston Journ. 1845; — Mus. Hein. l. c.: — *Chl. uropygialis* Cabanis, Journ. 1862, 321; dorso antico aliquis concoloribus, fuscis, luteotinctis; tergo c. uropygio lætius viridi (non fasciato). Latera capitidis tota pallide fuscovirentia, pone oculos obsolete, longit. fuscostriolata. Gula virentifusa, longit. albidomaculata; Gastræum reliquum fuscovirens fasciis angustis flavoalbidis. Pileus nigrocinereus ambitu postico late rubro. Ala 127 mm. (Mus. Berol.). — Ex *Costa rica* (s. isthmo Americae medio) et *Mexico*.

199. PICUS *aeruginosus* Licht. Mus. Berol. — Malh. II, 171, t. 90; — Mus. Hein. 161; — *Chl. yucatanensis* Cab. Journ. 1862, 321; — dorso toto c. uropygio sordide viridi; alis extus fuscō-lutescentibus (limite colorum bene distincto). — Gula albida, fuscostriolata; gastræum reliquum fuscō flavidoque fasciatum, fasciis curvato-flexuosis. Latera capitidis albida, pone oculos fuscostriolata. Cauda fere tote fusca. Diff. sexus ex pictura capitidis ut in precedentibus. Ala 130—135 mm. — *Mexico* (Mus. Britann. et Berol.).

Obs. *P. perspicillatus* Malh. (II, 176) t. 114 (nec *P. persp.* Licht. qui=canipileus); — *P. rubiginosus* Gray Gen. tab. CX (nec Sw.); — Icones citatae ostendunt gastræum fuscoviride, maculis majuseulis, definitis, subtriangularibus, flavoalbidis, crebre varium, et reliqua quæ apparent (pictura capitidis) ut in *P. rubiginoso* juniore. Descriptio vero Malherbei fere omnino *P. rubiginosum* seniorem exhibit, maculasque gastræi non memorat. Alanū vero adhuc minorem: "108—115 mm" dicit. *Trinidad* et *Columbia* pro patria afferuntur. — Incertum an sp. distincta, vel confusione et icona falsa orta? Icon Malherbei est imitatio iconis in opere Grayi expositæ, quæ igitur originaria.

TRIBUS 23. *Pici rivolii*.

Rostrum elongatum; capite fere longius, ceterum vero exacte ut in Tr. præcedenti formatum.

Sp. cognita major, dorso aliquis immaculatis (rubris), pectore squamoso-maculato. — Pileus et vitta malaris maxima, *maris* rubri, *feminæ* nigri. — Cauda omnino ut in Tr. præcedenti formata; tota nigricans, scapis supra subtusque nigricantibus. *Remiges* fuscæ, intus pallescentes, non maculatæ, scapis supra fuscis, subtus flavis. Digitus 4:us tertio parum brevior. *America merid.*

Sp. unica cognita sat affinis Tribui Piei viridis Picisque flaminuchalibus, sed praesertim Tribui praecedenti, etiamque sequenti. Gen. Hypoxanthus Bonap.

200. PICUS *rivolii* Boiss; — Malh. II, 267, t. 112; — superne ruber uropygio flavescente, fuscofasciato. — Pileus et vitta malaris *maris* rubri, *feminæ* nigri. Latera capitis collique sordide flava. Gula nigra, crebre pallidipunctata. Jugulum et pectus antictum nigra, lineolis transversis, valde curvatis, albis, nigro-cinetis, marginibusque plumarum rubidis ornata. Venter reliquus sordide flavus, antice lateribusque paullum nigromaculatus. Remiges fuscae, non maculatæ, sed intus pallescentes, scapis subtus flavis. Cauda fere tota nigra, scapis concoloribus, vel lateralibus subtus flavidis. Ala 140—145 mm. — *Columbia* (Bogota. Mus. Stockh.).

TRIBUS 24. *Pici aurati.*

Sp. submajores, grisecentes, capite fere concolore, non nigropicto (pileo non rubro sed fascia occipitis interdum rubra); rostro longiore. Corpus superne imperfecte nigrofasciatum, uropygio albo; subtus maculis rotundis fasciaque antepectorali nigris pictum. — *Remiges* superne nigræ, subtus fortius flavo vel rubro-incidentes; primariae extus maculis perparvis, marginalibus, notatae, intus late pallide; cubitales extus maculis fere 8, intus totidem, sed basim versus confluentibus; scapis totis supra subtusque flavis vel rubris. *Rectrices* supra nigræ, subtus, ultra $\frac{2}{3}$, rubræ vel flavæ, apice nigræ, scapis supra subtusque flavis vel rubris, apice nigris. *Rectr.* omnes apice longius acutæ, fortius gradatae; margine externo, in lateralibus albidiomaculato, in mediis tenue albidiomarginato. — Rostrum capite fere longius, culmine arcuato, acute carinato; apice subacuto, leviter cuneato; angulo menti ante medianam suturam producto; sutura quoque paullum arcuata. Carinae nasales obsolete, rarius juxta culmen observandæ. — Pedes fortes digito 4:to paullo breviore, quam 3:io. — *America septentrionalis* minus frigida. — Genus *Colaptes* Sw. — (Geopicus Malh. pars).

a) *Remiges et rectrices subtus flavomicantes, seapis utrinque flavis.*

201. PICUS *auratus* L. — Cuculus aur. L. X (ex Catesb. 18); — *Picus aur.* L. XII; — Lath. 52; — Wils. — Audub. — Malh. II, 255, t. 109; — pileo cerviceque cinereis, fascia occipitis (utr. sexus) rubra; gutture lateribusque capitis dilute griseorubidis. Vitta malaris *maris* nigra, *feminæ* nulla. Ala 150—160 mm.

Corpus superne cum alis rubidogriseum, striolis nigris, 2 mm latis et circa 5 mm inter se distantibus pictum; uropygio albo; — subtus albidum, maculis rotundis nigris, circiter 4 mm latis. Fascia pectoralis

nigra, circiter 15 mm lata, utrinque attenuata. Alæ subtus flavomicantes, scapis flavis. Rectrices subtus flavissime micantes, scapo flavo, apice ($\frac{4}{4}-\frac{3}{3}$ pennæ) nigro. (Deser. specialis remigum et rectricum v. supra). Rostrum totum nigrum. — *Juv.* hornotinus similis veteri, sed rostrum paullo brevius, apice obtusiusculum. Pileus interdum rubido varius. — In *America septentrionali ad orientem*, a sinu mexicano ad lat. 50° (vel ultra?), frequens.

201 b. *Picus hybridus aurato-mexicanus*. — *Colaptes hybridus* Baird, Rep. 1858, 122; — *Col. ayresii* Audub.; — Malh. II, 260 (fig. nulla); — Avis a *P. aurato* et *P. mexicanus* hybrida et notas ab utroque gerens, ita vero variabilis ut vix duas exakte similes invenias. Varietates principales, (sec. Baird, l. c.) haec fere sunt:

- A. similis *P. aurato*, sed vitta malari nigra, plus minusve rubro-varia.
- B. id. gutture superiore cinereo.
- C. id. vitta malari rubra. Pileus colore griseorubido coili laterumque capitis pictus (*P. ayresii* Auct.), vel etiam, ut in *P. aurato*, cinereus.
- D. id. fascia occipitali parva, vel, praesertim in junioribus, nulla.
- E. scapis remigum et rectricum aurantiis, vel plus minusve ad rubidum accendentibus; color dorsi obscurior et cet.

Habitat in regionibus, ubi convenientes parentes; non rarus.

202? *PICUS chrysoides* Malh. R. Z. 1852; — Mon. Pic. II, 261, t. 109; — Baird Report 1858, 125; — pileo cerviceque foscorufescensibus, fascia occipitali nulla; gutture lateribusque capitis cinereis; plaga pectorali nigra majore. Vitta malaris in *mare* rubra, in *femina* nulla; reliqua ut in *P. aurato*, sed multo minor: ala 145 mm (Malh.); 133 mm (5 $\frac{1}{4}$ poll.; Baird.). Inventus in *California*, Malh.; ad limites *mexicanos*, Baird. Incertum videtur an haec etiam avis sit hybrida. Corpus *P. auratum*, caput *P. mexicanum* refert.

b) Remiges et rectrices subtus rubro micantes, scapis rubris.

203. *PICUS mexicanus* Sw. Phil. Mag. 127; — Malh. II, 262, t. 110; — Audub.; — *P. rubricatus* Licht. Wagl. Isis 1829, 516; — pileo cerviceque fusco (obscure rufescenti cinereis) ante et supra oculos laetius rufis, fascia occipitis nulla; gutture lateribusque capitis pure cinereis; vitta malari *maris* rubra, *feminae* nulla. Remiges et rectrices ut in *P. aurato*, sed dilute rubrae, ubi illius flavae. — Ala circa 163 mm (juv. 155). Magnitudo paullum variat; sp. meridionalia plerumque minora (Baird). Lorum et regio superciliaris laetius rufescencia. Dorsum obscurius quam in *P. aurato*. Scapi rectricum basi, vix ultra medium rubri. Maculae ventris plerumque paullo majores quam in *P. aurato* et fascia pectoralis latior (20—25 mm); sed in genere pictura eorum similima, si rubrum flavumque commutas. Striae dorsales ut in altera sp. — Remigum 5:ta in *P. mexicanus*, 4:ta in *aurato*, plerumque ceteris longior; saepe vero in utraque sp. aequales, vel vice versa, inveniuntur. — Hab. in *America sept. occidentali*: Mexico, California, Ins. Quadra: M. Stockh.

204. *PICUS submexicanus* n. = *P. mexicanoides!* Lafr. — Malh. II, 265, t. 110; — simillimus precedentibus; differt pileo cerviceque late-

rufis (cinnamomcis), limite definito a colore cinereo distinctis; fasciis nigris dorsi alarumque multo latioribus, intersticiis magis rubidomicantibus, angustioribus. Vitta malaris *feminæ* rufa; *maris* intensius rubra. Ala 150 mm. (M. Berol.). Habitat in *California* et *Mexico* Malh. *Guatimala* Mus. Berol.

TRIBUS 25. *Pici flavifasciati*

Sp. mediae vel subminoris magnis: rostro capite paullo breviore, apice cuneato; dorso aliquo nigris, flavidofasciatis, uropygio flavidiore; gastræo flavidio, nigromaculato. Pileus utriusque sexus cum tota fronte niger, postice late ruber; (plumis rubris elongatis, dependentibus, cristam vero non exhibentibus). Vitta malaris magna: *maris* rubra; *feminæ* nigra, plus minusve albido varia.

Latera capitis, a naribus ad cervicem, flavo-albida. Pictura gulæ, a pictura gastræi reliqui diversa, usque ad jugulum medium continuata. Remiges nigræ, extus intusque flavidio-maculatæ, maculis majusculis, marginalibus; intus, in primariis confluentibus; in cubitalibus 7 v. 8, præter marginem apicis albidum. Rectrices omnes longius acutæ; pleraque nigræ, apice concolores; laterales, utrinque 2, flavidio fasciatæ: fasciis fere 11, situ, ad latera scapi, alternis. Rectrices mediae paris striolis marginalibus, transversis, flavidis pictæ. Scapi remigum omnium et rectricum latralium utrinque flavi. — Digitus 4:tus tertio paullo brevior. Rostrum ante apicem compressum; culmine leviter curvato, altius, acute carinato. Sutura bis, leviter areuata (s. levissime S-formi). Carinæ nasales debiles, vel fere obsoletæ. Furca menti longa: medianam suturam excedit. — Habitant in *America intertropica*. Genus *Chrysopitilus* Sw. 1831; Mus. Hein. 163. (*Chrysopicus*, pars, Malh.).

a) Minores, gastræo punctis rotundis, parvis (lat. 1—2 mm) insperso; gutture superiore nigro, albomaculato (plumis nigris, maculis 2 latis albidis ante apicem ornatis).

205. *PICUS punctigularis* (Slater; *P. punctigula* Bodd. ex Pl. enl. 613); — Gray. Gen.; — M. Hein. I. c. — *P. cayanensis* Gm.; Lth. 43 (ex Briss. sp. 27); — Wagl.; — Malh. II, 179, t. 87; — superne fulvovirens, fasciis nigris angustis, flexuosis, interruptis; uropygio flavidio, paullum rubro-lavato, crebrius nigromaculato, maculis cordatis vel rotundis, circa 2 mm latis, postice majoribus. Subtus sordide flavus, nigromaculatus; gutture infimo sordidiore, rubro-lavato; ventre antico punctis mediis majoribus (2½ mm latis); ventre medio purius flavo, vix vel non maculato. Guttur superius nigrum, maculis albis crebris, rotundatis. Caput, remiges et rectrices ut descr. generalis. Rectricum latralium fasciæ nigræ et fulvo-albidæ fere æquales, integræ, in pogoniis sub-alternantes. Ala circiter 105 mm. (M. Stockh.). — *Guyana*: — *Brasilia septentr.* (Para; M. Berol.).

206. *PICUS punctipectus* Mus. Hein. 163 (*Chrysoptilus*); — *P. hypostictus* Mus. Berol. 1864; — *Mas simillimus* præcedenti, sed lætius coloratus, uropygio purius flavo, fere immaculato; ventre immaculato, antice purius flavo; pectore antico solo punctis minoribus, nigris maculato. *Guttæ juguli albæ paullum transversæ apparent.* Ala 110 mm. (M. Berol.). — Venezuela.

206 b. *P. speciosus* Sclater, Malh. II, 181 (sub *P. guttifero*), tab. 87 f. 6; — Mus. Hein. l. c.; — *simillimus* *P. punctigulæ*; differt pectore purius flavo, punctis minoribus maculato. De cetero non descriptus. — Hab. in *Peru orientali* (circa flumen amazonum superius). Incertum videtur an a sp. præcedente (206) vere differat.

207. *PICUS guttifer* R:bach Handb. Sp. Orn. Picinæ, 420 (*Chrysop.*); — Malh. II, 181 (absque iconе); — similis præcedentibus, sed major; dorso nigromaculato (nec fasciato); fasciis alarum nigris angustis; uropygio pure flavo, punctis minoribus, rotundis, nigris ornato. Rectrices laterales flave, fasciis nigris ad scapum interruptis ibique angustatis. Maculæ gulae albæ, angustiores, oblonga. Ala (4 p. 4 lin.) 114 mm. — Mexico (Reichenb. — Mihi ignotus).

b) Majores, maculis gastræ majoribus; gula albida, crebre nigrostriolata *).

208. *PICUS icteromelas* Vieill. N. Dict.; — Enc. 1313; — Wagl. Syst. Piens sp. 43; — Malh. II, 182, t. 88; — ceteris minor (ala circiter 125 mm), lætius puriusque coloratus. Dorsum flavidо-virens late nigrofasciatum; uropygium paullo pallidius et, ut dorsum, nigrofasciatum. Gastræum pallide viridi-flavum, maculis nigris, cordatis, numerosis. Latera capitis purius alba (vel leviter flavolavata). Maculæ externæ remigum et rectricum lateralium fulvescentes; rectrices 6 mediæ nigræ, striolis marginalibus pallidis ornatae scapoque basi flavescente. — Vitta malaris maris rubra; feminæ leviter albido-striolata. Habitat in *Brasilia*. (Malh. — mihi ignotus).

208 b. *P. flavigularis* n. *Mas*: magnitudo præcedentis (ala 125 mm), color potius sequentis. A descriptionibus præcedentis differt: uropygio læte lateque flavo, immaculato; — sed tectrices caude fasciis maculatis, nigris pictæ. Dorsum flavo-virens fasciis latis nigris. Gastræum (præter guttur anticum, striolatum) flavidum, antice griseo-sordidum, maculis crebris, nigris, rotundis vel subcordatis, 3 mm latis; ad latera maculis minoribus, oblongis; ventre medio purius flavo, late immaculato; crasso flavoalbido, maculis nigris oblongis, vel cordatis. Latera capitis flavidо-alba. Vitta malaris nigra, plumis apice obscurius rubris. Alæ præcedentis. Rectrices laterales, utrinque 2, totæ fasciatæ: fasciis fulvoalbidis paullulo angustioribus, quam fasciis nigris. Rectr. medii paris nigrae, margine interno magis quam externo maculatae; secunda, basim

* Picos hujus subdivisionis, inter se parum distinctos, in museis exteris atque ditionibus perquirere neglexi; ipse vero non satis eorum ad manum habeo ad species rite definiendas. Neque auxilium apud autores invenio; descriptiones enim Malherbei omnia præter differentias specificas describunt; Museum Heineanum synonyma, fere nihil indicantia, affert, specimina vero non desribit; autores antiquiores nimia falsa habent. Incertus igitur procedo et species nominibus, fere tantum magnitudine definitis, affero.

versus, in altero specimine utrinque, in altero tantum intus, maculata. *Tertia* immaculata. Scapi remigum omninum et rectricum lateralium superne flavissimi, subtus minus late flavi; rectricum reliquarum nigri, basi, tantum subtus, flavescentes. — *Femina* mihi ignota.

Specimina duo maris senioris in museo Stockh. adsunt; quorum alterum ex *Bahia*, a consule D. Lindgren, a:o 1843 missum; alterum ex *Brasilia*, loco incerto. — Hæc specimina, etsi a descriptionibus præcedentis magnopere differunt, forte mares sunt veteres *P. iceromelanii*; interea nomen proponere fas visum est.

209. *PICUS chrysomelas* Malh. II, 189, t. 89: — præcedente paullo major: ala 135 mm (Malh.; 137 mm = 5 p. 3 l. Mus. Hein. 163); picturæ vero a nuper descripto (208 b) vix differre videtur. Gastræum lætius puriusque flavum, maculis rotundato-cordatis minoribus et paucioribus, quam in sp. affinis, pictum, ventre medio immaculato. Dorsum flavo-virens, nigrofasciatum, uropygio maris veteris' flavo immaculato; junioris et feminae maculis nigris, rotundato-cordatis (sicuti gastræum) pictæ. Latera capitis albido-flava. Vitta malaris *maris* obscurius rubro-varia; *feminae* nigra. Alæ et cauda ut in descr. præc:s; rectrices tamen 6 mediae nigrae, scapis nigris; tantum 2 mediae striolis marginalibus pallidis ornatae (Malh.). — Ex *Brasilia*, (Mus. Hein.).

Obs. Specimina duo masculina ex *Brasilia*, verisimiliter hujus sp., et in Mus. Hein. l. c. sub *P. chrysomelano* citata, Berolini vidi, sed describere neglexi. Tantummodo notavi: "uropygium maris maculis multis, non parvis, cordato-rotundatis ornatum". Queritur igitur an descriptio Malherbei maris veteris, "uropygio flavo, immaculato" confusione quadam cum sp. præcedente orta sit? vel etiam, an hic et præcedens vere distincti sint?

210. *PICUS melanochlorus* Gm. (ex Briss. et Pl. col. 719); — Malh. II, 187, t. 84 bis; — major: ala circa 145 mm. Latera capitis vix sordide flavidooalba, a rostro ad cervicem unicoloria. Dorsum flavo-viride fasciis latis nigris. Uropygium paullo flavidius, fasciis nigris paullo angustioribus et in maculas interruptis. (In *mare*: maculis nigris triangularibus, Malh.). Tectrices caudæ eodem colore, viridiflavidae, fasciis nigris integris, latis. Gastræum obscurius, sed purius flavum; totum crebre nigromaculatum: maculis rotundis, subcordatis, circa 3 mm latis; in ventre medio minoribus; in crasso latius cordatis. Rectrices ut in descr. generali; laterales, utrinque 2, purius nigræ, fasciis fulvo-albidis, definitis, angustis: scapum marginesque attingentibus, 3plo angustioribus quam intersticiis nigris. Penna 3:tia striolis utriusque marginis paucis, obsoletis; 4:tia immaculata; 5:tia s. media, margine interno, striolis tenuibus, definitis, fulvescentibus ornata. Pennæ laterales, utr. 2, subtus leviter flavomicantes. Alæ ut in omnibus pictæ. Vitta malaris nigra: *maris* rubrovaria; *feminae* tota crebre griseo punctata. — Hab. in *Brasilia* (Mus. Stockh. ♀).

211. *PICUS chlorozostus* Wagl. Isis 1829, 513; — Malh. II, 184, t. 84 bis. — "*P. cristatus* Vieill." Mus. Hein. l. c. — Magnitudo præcedentis: ala 140—150 mm. Latera capitis sordide flavoalbida, pone oculos leviter infuscata; limbo superiore et inferiore pallidioribus. Dor-

sum sordidius flavoviride, fasciis latis nigris. Uropygium intensius flavum, crebre nigromaculatum: maculis cordatis, parum minoribus quam maculis gastræi; in tectricibus caudæ latius cordatis, transversis, vel arcuatis. Gastræum sordidius flavovirens, antice fulvescenti-inquintatum; crebre nigromaculatum: maculis majusculis, exacte ut in præcedenti formatis. Striolæ gulae crebræ, latiores qv. præc:itis. Fasciæ rectricis extimæ fulvescentes, parum angustiores quam interjectæ fuscæ. Penna 2:da in juniore fasciis imperfectis picta: superne, fasciæ fulvæ abbreviatæ, maculares; plerique pagonii interni, vel etiam externi, infuscatae, obsoletæ (in penna dextra et sinistra dissimiles). Penna 3:ta et 4:ta basi obsoletius maculatae; 5:ta (media) fasciis pog. interni abbreviatis, fulvis, in ♂ vet. angustis; fasciæ pog. externi obsoletiores. Rectrices omnes multo latiores quam sp. præcedentium. Extima subtus fortius flavo-micans; secunda, jun:s, circa scapum fasciatum flavomicans. Scapi laterales, senioris sola extima, junioris utrinque 2, supra subtusque flavi; reliqui nigri. Alæ ut in præcedentibus pictæ, sed fasciæ et maculæ externæ latiores et paullo obscurius fulvæ. Vitta malaris nigra: *maris* rubrovaria, *feminae* creberrime griseostriolata. — *Brasilia* (Parà, ♂ vet. ♀ jun. Mus. Stockh.; Wagl.); *Montevideo* (M. Hein.).

Obs. Dubium est an hæc sp. sit *P. cristatus* Vieill. Enc. 1321, ex Azara n:o 252 ("maculis gastræi longitudinalibus"). Hoc præterea nonen ineptum est avi non cristatae, præsertim inter Picos, quorum numerosi valde cristati.

c) Gula (seniorum) nigra, immaculata.

212. *PICUS melanoleucus* Malh. II, 185, t. 89; — gula tota nigra; uropygio ventreque flavis, nigroguttatis. — Præcedentibus major: ala 160 mm (Malh.). Pileus pure niger, postice brevius (quam in præcedentibus) ruber. Vitta malaris a nigredine gule non distincta et in *femina* concolor, nigra; in *mare* rubra. Latera capitis flava. Dorsum et alæ nigra, flavidofasciata; gastræi maculæ nigræ, rotundato-cordatae, majusculæ (ut in sp. 2 præcedentibus), sed in medio ventre vix ullæ. Alæ ut præcedentium, sed fasciæ angustiores. Rectrices laterales fasciis (ut in *P. melanochloro*, n:o 210) angustis, fulvoalbidis: penna extima pogonio utroque, secunda tantum externo, picta; vel, in mare vetere, sola extima, tantum in pogonio externo, maculata. Pennæ mediæ et reliquæ, in juniore, margine interno, basim versus striolatae. Scapi alarum utrinque flavæ; caudæ laterales subtus flavæ, superne flavidofuscæ (Malh.). — *Bolivia*, *Chili* (Malh. — Præcedentibus maxime affinis).

Junior, gulâ nigra, pallido striolata: pluma quavis pallida, linea media lata, nigra (Malh.).

213. *PICUS atricollis* Malh. Rev. Zool. 1850, 156; — Mon. Pic. II, 178, t. 88; — *Chr. peruvianus* R:bach, Handb. 419; — *Mas*, gula juguloque medio nigris; uropygio ventreque virenti-albidis, nigrofasciatis; pileo cinereo, plumis apice rubris, postice lineaque lateral, vittaque mali, rubris. — Minor: ala 123 mm. Pietura corporis alarumque præcedentium, sed maculæ ventris nigræ, transversæ, fascias angustiores, interruptas præbentes. Latera capitis flavoalbida. Rectrices laterales, (utrinque 2, R:bch) pallide fulvofasciatæ; reliquæ striolis marginalibus pallescentibus notatae. Scapi remigum et rectricum omnium, supra sub-

tusque flavi. *Femina* ignota. — *Peru* (Malh.; R:bach. — Obs. *Picturā* pilei ventrisque a praecedentibus differt, et sequentibus subsimilis videtur; sed minor).

TRIBUS 26. *Pici campestres.*

Sp. majores, rostro majore, longitudine capiti subæquali, apice imperfecte vel non cuneato; dorso alisque nigrofuscis, crebre albido fasciatis, uropygio plerumque albo; gastræo albido, nigrofasciato. Scapi remigum semper, rectricum interdum, subtus, vel utrinque, flavi.

Latera capitis (ut præcedentium) albida vel flava. Fasciae corporis supra subtusque irregulares. Remiges ut in Tribu præcedenti maculatæ. Rectrices, ut in Ligonirostribus plerisque, longius acutæ; plerumque nigrae, mediae et extimæ margine pallidimaculatae, numero macularum, typice, adhuc majore quam præcedentium, sed omnes raro apparent. Differentia sexus e vitta malari, *maris* rubropunctata, *feminae* colore rubro carente, appetet. Rostri culmen leviter arcuatum, altius carinatum. Carinae nasales juxta culmen sitæ, sed obsoletæ. Furca menti longa. Digitus 4:tus tertio brevior. — Habitant in *America meridionali*, campestri; sed sp. ultima, sat aberrans, in insula Cuba. (Geopici pars Malh. Malherbipicus! Bonap. Melius Pediopipo dicendus: $\pi\epsilon\delta\sigma\nu$, campus). Sicuti *Pici* aurati et aratores, campos apertos inhabitant, in terra ambulantes ibique victum querentes; arbores vero etiam adscendent.

214. *PICUS campestris* Vieill. Dict.; — Enc. 1322 (ex Az. 253); — Licht Verz. p. 10; — Malh. II, 251, t. 108; — pileo nigro; gula (cum regione malari) nigra, luteo-cincta. — Superne cum alis nigrofuscus, undatim, angustius albido fasciatus, uropygio albo, immaculato vel transversim fuscostriatu. Subtus flavidio-albus, anguste nigrofasciolatus, gutture infimo lateribusque colli capitisque, pone oculos, cum cervice, flavidissimus, immaculatus. Remiges nigrae, flavoalbido maculatae, scapis superne subtusque flavidissimus (sed in juniore pallidioribus). Rectrices nigrae, extima extus, media intus vel utrinque albido maculata. *Mas* regione malari crebre rubro-, antice albido-varia; uropygio plus minusve fasciato; fasciis ventris latioribus, subrectis, vel in maculas cordatas, nigras interruptis. *Femina* regione malari non rubro-, sed antice albido-varia; uropygio immaculato, albo; fasciis ventralibus angustioribus, V-formibus. Ala 150—160 mm. *Femina* vix mare minor (Mus. Stockh.). — Habitat in *regione platensi* et in *Brasilia* (Bahia Licht. Pr. Max.).

215. *PICUS agricola* Malh. 1859, — et Mon. II, 254, t. 108; — *P. subcampestris* Reich.bch Handb. 419 c. figg. — Simillimus *P. campestris*; differt gula flavoalbida, immaculata; sed vitta malaris nigra, definita; in *mare* rubro-, in *femina* albo-varia. Capitis collique latera, cervix et guttur inferius, ut in præcedente, flavidissima. Rectrices laterales, utrinque 2, et media, margine pallido maculatae. Uropygium pure album. Ala 150—160 mm. — *Montevideo* Mus. Berol. *Brasilia* R:bach.; Malh. (Bolivia et Chili? Malh.).

216. *PICUS rupicola* Lafr. d'Orb. Voy. — Malh. II, 271, t. 113; — pileo vittaque malari nigrocinereis, in *mare* postice rubris, in *femina* unicoloribus. — Gastræum, cum gula lateribusque capitis, pallide, sordide flavidum, maculis gutturis inferioris crebris, lunatis, nigris. Superne cum alis nigrofusces, angustius flavoalbido-fasciatus, uropygio flavoalbido. Tectrices caudæ longæ, albidae, nigrofasciatæ. Rectrices nigræ, striolis transversis, angustis, flavidis ornatae; (fere omnes hoc modo pictæ in ♂♀, Mus. Paris.; sed tantum extima in ♂ seniore, Mus. Berol.). A reliquis differt occipite maris rubro; a sequente, vitta malari definita, nigricante. Ala 160—170 mm. — *Peru*; *Bolivia* in campis alpinis.

217. *PICUS chilensis* Garnot, Coq. t. 32; — Lesson, Man. II, 113. — Malh. II, 269, t. 111; — *Col. pitius* (Mol.) R:bch, Handb. 414; — *Col. pitiguus* Gay, Chile, I, 373; — lateribus capitis gulaque sordide fulvoalbidis, vitta malari parum apparente: angusta, indefinita, sparsim fuscopunctata; *maris* præterea pallide rubido-punctata. — Pileus fuscocinereus. Corpus superne fuscum, albido-fasciatum, uropygio albo. Gastræum, antice, a gula usque; lateribusque nigrofusco albidoque fasciatum, lateribus collи concoloribus; ventre medio albido, immaculato. Remiges albidiomaculatae, scapis, supra subtusque, pallide flavis. Rectrices purius nigræ; extima margine externo leviter albido-punctata summoque apice albido; media margine interno albido-striolata. Scapi omnes utrinque nigri. Rostrum apice obtusiusculum, fere ut rostrum *P. aratoris*. Cauda minime brevis, sed inter Picos insolite longa: æquat $\frac{1}{2}$ alæ. Iris flavovirens. Ala circa 160 mm. (M. Stockh.). — Juv. pileo albido-vario, facie obscurius fulvescente, ventre medio quoque maculato. (Malh.). — Hab: in *Chili*, ubi silvas vel arboreta colit, in arboribus cavis nidificans, ova 3 alba pariens. Victum in terra fodiendo quærunt (Gay; — Bridges, Z. Proc. 1843, 114).

Obs. *Picus pitius* Molina, Chili (ed. gallica 216 et 322); indeque Gm. et Lath. 26 (unice ex Mol.), evidenter confusus cum Alcedine torquata, subsimili et in Chili frequenti: "cauda brevi", et "in ripis præruptis, fodiendo nidificans". Nomen igitur rejiciendum.

218. *PICUS fernandi*. "*Colaptes fernandinæ*" Vig. Z. Journ. 1827; — Wagr, Isis 1829, 517; — Malh. II, 273, t. 113; — supra subtusque crebre flavescenti nigroque fasciatus, capite sordide flavido, superne tenue nigrostriolato; gula nigra, plumis tenue albomarginatis. — Vitta malaris cum nigredine gulae continua et in *femina* colore vix diversa; in *mare* postice leviter rubropunctata. Fascie ventris flavidæ nigris latiores. Rectrices omnes subtus flavonitentes, superne crebre nigro flavoque fasciatæ. Scapi remigum et rectricum subtus flavi, superne obscuri. Ala 150 mm. — *Cuba* (Mus. Berol.). Iris fusca (Malh.).

Obs. Nescio qua lege formatum sit nomen vigorsianum "*fernandinæ*", in memoriam patricii hispanici, cui nomen *Fernando* erat, datum. Hoc vero nomen latine *Fernandus* dicendum, et nomen avis, inde derivatum, *Picus fernandi* sit, nobis videtur.

Series 4. Pici Nudinares

naribus apertis, setis non tectis. — Membrana narium postica plumulis brevibus, rotundatis, erectis et recurvis, non setaceis, tecta. Furca menti semp̄er excedit medium rostrum.

Obs. In Picis plagae tropicæ, supra descriptis, plumæ narium setosæ paucæ brevesque plerumque sunt et, in avi occisa, putredine, ibi cito incipiente, sœpe decidunt, qua re nares nude apparent. Aves tamen, hoc modo mutilatæ, plerumque a Picis hujus seriei dignoscuntur: plurimis quibusdam, in basi rostri relictis, setigeris, rectis, antrosum directis, neque ut nuper descriptis formatis.

TRIBUS 27. *Pici sultanei*.

Rostrum validum, capite paullo longius, culmine recto, apice valde cuneato, carinis nasalibus fortibus, a culmine latè distantibus. Digitus 4:tus tertio longior. — Dig. 1 (hallux), magnitudine, inter Picos ordinarius (i. e. articulo 1m:o digiti proximi paullo longior). Corpus superne flavo-aureo micans vel rubrum; subtus albo nigroque varium. Species majores, cristatæ, pleræque picturæ et differentiâ sexus inter se simillimæ, de qua re videoas deser. sp. primæ. Sola sp. ultima a reliquis magis differt. Omnibus vero peculiaris est pictura gulæ genarumque. Haæ enim partes albæ sunt, lineaæ gulæ media nigra et vitta malari magna, alba, linea tenui, nigra, undique cincta, striatæ. Lineæ igitur 5 subparagraphæ, subæque distantes, nigræ, ibi numerantur. Remiges nigræ, maculis paucis, albis, infus rotundatis, a margine remotis; (extus plerumque nullis). Rectrices elongatae, totæ nigræ. Sp. omnes indicæ. — Gen. Chrysocolaptes Blyth 1843; Mus. Hein. 166; — Indopieus Malh.

219. PICUS *sultaneus* Hodgs. Journ. As. Soc. 1837; — Malh. II, 77, t. 64; — Jerdon Ind. I, 281; — Mus. Hein. l. c.; — dorso aliisque luteis (hic illie rubrolavatis), tergo rubro. Pileus cum crista, *maris* ruber, *feminæ* niger, alboguttatus. Capitis et colli latera cum cervice alba, vitta pone oculos lata, nigra, ad dorsum ducta. Lineæ genarum gulæque 5 nigræ. Gasterum, anterius, cum jugulo, plumis albis, undique nigromarginatis; posterius album, transversim nigrostriolatum. Cauda tota et remiges primariae extus nigræ, immaculatae. Rostrum fuscum. Iris flava Jerd. (rubra Hodgs). Ala circiter 170 mm. — India.

a) Forma major, septemtrionalis: *P. sultaneus* propr. (synonymia supra data); ex *Nepal*, *Assam*; — Maximus; Ala, ♂ 177, 175 mm; ♀ 172 mm. Mus. Berol.; 175, Mus. Hein. l. c. (185, Malh. forte lapsu?); cauda fere 120.

Obs. Forma indica: *Picus delesserti* Malh. 1848; — et Monogr. II, 79, t. 64; — ex India propria: septemtrionali — meridionali (Jerd. Ind. I, 281); plerumque paullo minor: ala 165 mm. Mus. Hein. l. c.; (170—180 mm. Malh.); ceterum nulla re a præcedente differt, neo distinctus habendus.

b) Forma minor: *Picus strictus* Horsf. L. Tr. XIII, 176; — Malh. p. 80, t. 65; — ex *Java*, iterum paullo minor, nec alia re distinctus: ala 145 mm. (Mus. Hein. Dimensio hujus a Malh. data, ut praecedentium, major: 160 mm). — Sed observandum est specimen (prioris?) ex *Cochin. Indie meridionalis*, in Museo Berolinensi, non majus: ala 145 mm. Hinc credi licet, specimina hujus, ut avium multarum aliarum, meridiem versus, sensim minora gigni.

Mas hornotinus hujus? Malh. sub *P. stricto* l. c.; — *P. strictus* ♀ Horsf. — Adhuc paullo minor, pileo (cum crista brevi) flavo; tergo et uropygio fuscoviridis, rubrovariis. Omnis color corporis sordidior.

220. *PICUS philippinarum* Lath. sp. 30 (Sonnerat; Pl. Enl. 691); — Malh. II, 85, t. 66; — *P. aurantius* Bodd. (nec Linn. qui = *P. bengalensis*, infra n:o 224); — Mus. Hein. 168; — lateribus capitis albis, vitta pone oculos nulla nigra. Superne luteus plumis margine late rubrotinctis; tergo rubro. Rectrices nigrofuscæ, basi, utrinque, macula albida, majore, pictæ. Subtus, cum jugulo et regione gulari, ut in praecedente. Ala circa 140 mm (140—148 Malh.). — In insulis *Philippinis* (Malh.).

221. *PICUS haematurion* Wagl. Syst. sp. 95; — Malh. II, 84, t. 68; — Mus. Hein. — dorso, alis extus tergoque rubris; jugulo toto fuso, maculis rotundis, crebris albis; ventre fulvo, striis transversis fuscis. — Latera capitis et gula fulvescentia, striis 5 ordinariis, nigris. Vitta pone oculos lata, fusca, ad dorsum ducta, sed antice albidovaria, vel pallida, fuscomaculata. Rostrum fuscum. Diff. *sexus* ut praecedentium. Ala 135, 130 mm. Mus., Berol.; 143 Malh., Mus. Hein. — Habitat in insula *Luzon*.

222. *PICUS carlotta* Malh. Rev. Zool. 1854; — et Monogr. II, 87, t. 67; — *Brachyp. stricklandi* Layard 1854 (sed non *P. strickl.* Malh., supra, sp. 48); — Mus. Hein. 169; — rostro majore, flavopallido; dorso, alis extus tergoque rubris. Vitta per oculos nigra, latissima, latera capitis superiora implens. Genea gulaque albæ, lineis 5 ordinariis pictæ. Gastræum reliquum, ut in sp. prima, antice nigrum maculis magnis, rotundatis, albis; postice, maculis sensim majoribus, relictis tantum lineolis nigris. Ala 152 mm. — *Ceylon* (Malherbe).

223. *PICUS festivus* Bodd. (Pl. Enl. 696); — Gray. Gen. (Chrysocol.); — Mus. Hein. 168; — *P. goensis* Gm.; — Lath. 27 (Buff.); — Malh. II, 82, t. 66; — dorso antico, lato, cerviceque albis. Vitta pone oculos lata, cum scapulis nigris conjuncta, tergum et uropygium nigra, plagam dorsalem, albam cingentia. Alarum rectrices luteæ; remiges cubitales fuscovires; primariae nigræ, extus fasciis paucis, latis, pallidis. Pileus *maris* ruber, *feminæ* (?) flavus; fronte antica utriusque alba. Gula alba striis 5 ordinariis picta. Gastræum albidum, marginibus plumarum angustius nigris. Ala fere 150 mm. (Malh.); *Feminæ* 144, (Mus. Hein.). — Hab. in *India media et meridionali*, (Jerdon, p. 282; Cochin, Mus. Berol.). — Senior, plumis nigris et flavis apice rubrolavatis (Malh.).

TRIBUS 28. *Pici auropalliati.*

Corpus, ut praecedentium, superne flavidum, aureo micans, vel rubrum; subtus albo nigroque varium (plumis albidis, margine laterali, vel toto, nigro). Rostrum capite vix longius, culmine leviter curvato, carinis nasalibus obsoletis, juxta culmen sitis; apice parum cuneatum, vel sub-acutum. Digitus 4:tus tertio brevior; *primus minimus vel nullus*. — Picturā et habitu similes praecedentibus, sed paullo minores: magnitudine mediæ. Ut in illis: crista occipitalis, mollis, sericea. Plumæ colli breviuscule, fere ut in serie Picorum prima. Rectrices longius acute, totæ nigræ. Maculæ remigum internæ albæ, paucæ, rotundatae, marginem pagonii non vel vix attingentes. Vitta postocularis nigra, lata, elongata, inter 2 albas sita, sed cervix nigra. Habitant cum præcedentibus, in *Asia meridionali*.

a) *Hallux minimus*. (Articulo 1:mo ditti proximi brevior).

A sequentibus differunt uropygio tergoque nigris; gula cum regione malari totis nigris, albovariis; remigibus primariis margine externo albo-maculatis. — Pileus *maris* totus, cum crista, ruber; *feminæ* niger albo-punctatus, crista sola rubra. — Gen. *Brachypterus* Strickl.; Mus. Hein. 169; — *Brahmapicus*. Malh.

224. *PICUS bengalensis* L. X, 113 (Alb. & Edw. 182) ♀; — et XII, 175 (Briss. sp. 2); — Lth. 29. — Malh. II, 93, t. 69; — *P. aurantius* L. XII, 174 (Briss. sp. 30) ♂; — Lath. 35; — Mus. Hein. 169; — *P. nuchalis* Wagl. Syst. 94; — dorso splendide luteo, (non rubromaculato). Alaे sordidius fusco-lutescentes, tectricibus minoribus albido-maculatis, minimis nigricantibus. Vitta postocularis albo-striata. Gula albostriolata: vitta plumarum longitudinali alba, inter maculas 2 laterales magnas, rotundatas, nigras. Nigredine vero aucta, in senioribus et præsertim in meridionalibus, vitta alba minuitur, vel evanescit, relictis tantum puncto apicis, maculaque transversa media albis. Plunæ quoque ventrales tantum lateribus, non apice, nigromarginatae. Reliqua descr. v. supra. In senioribus, mare feminaque, plunæ dorsi interdum apice rubrotinctæ. Ala 144—140 mm. — In *Bengalia* et majore Indiæ parte.

Obs. *Brachyp. dilutus* Blyth; — Jerd. Ind. 297; — Var. præc:s, Malh. I. c. 96; — paullo minor: ala (5½ p. angl. =) 140 mm; maculis striolisque albis ubique latioribus (in vitta postoculari, in gastræo toto, in remigibus et tectricibus); præterea pennæ cubiti ultimæ ("tertiaries") albomaculatæ et dorsum minus luteo-pictum, (Jerdon, I. c.). — Sp. dubia; an junior præcedentis? cui notæ albæ secundum ætatem, vel fortuito, paullum variabiles. Unicum specimen, ex *Sindh*, descriptum dicitur.

P. thibetanus Natt.; Var. *P. bengalensis*, Malh. I. c.; — ex *Thibet*: "capite [an feminæ?] gulaque nigrioribus, striolis, nec punctis, albidis variis. Ala antice latius nigricans maculis tectricum albidis majoribus, cordatis" (Malh.). — Sp. non minus dubia.

225. *PICUS chrysonotus* Lesson Traité 220 (descr. manca); — Jerdon Ind. I, 296; — *Br. micropus* Blyth, 1845 (nomen ineptum, ob *Conspectus Picorum*.

pedes non parvos); — sub *P. bengalensi*, Malh. I. c.; — dorso luteo, plumis non rubrolimbatis; tectricibus alarum parvis non albomaculatis. — *Similis P. bengalensi*. *Pileus maris* ruber, antice plumis basi longius nigris; *feminae* niger punctis rotundatis, subtransversis, albis, postice c. crista ruber. — *Vitta postocularis* definita, nigra, parum vel vix albo striolata. *Gula nigra*, punctis crebris, albis, rotundis varia. *Guttur reliquum nigrum*, macula plumarum apicis majore, transversa, albida, aliaque media, longitudinali. In pectore antico plumae partim nigrae maculis 2 magnis, albidis: apicali rotundata, media cordata, interjecta fascia nigra, angulata; — partim vero haec fascia interrupta, vel in maculam nigram conversa. *Plumae ventris* reliqui lateribus late nigromarginatae. *Cervix* cum antica dorsi parte nigra. *Dorsum* c. regione scapulari splendide aureum. *Tergum* et *uropygium* nigra, antice virentimixta. *Alae extus* fuscolutescentes, tectricibus parvis obscurius fuscis, nigriganti-marginatis, maculis albis nullis. *Remigum maculae* albæ paullo minores quam praecedentis. *Cauda nigra*. *Rostrum* nigrum, apice acutius, vix cuneatum. *Ala* 137 mm. ♀ M. Sthm.; 133, Jerd. (5½ p. angl.). — *India meridionalis*: Madras, M. Sthm.; Malabar, Carnatic, Jerd.

226. *PICUS puncticollis* Malh. II, 92, t. 70; — *P. chrysonotus* Less., Malh. Rev. Zool. 1845, 404; — Monogr. II, 92, t. 70; — dorso aliquo extus luteis, plumis latius rubrolimbatis; tectricibus alarum parvis albomaculatis. — Ceterum praecedenti similis videtur et, nisi tectrices alarum minores maculatae describerentur, eundem, sed seniorem, crederem. Plumæ tamen pectoris, secundum descriptiones, simplicius pictæ apparent. *Pileus maris* et *feminae*, gulaque ut illius. *Jugulum quoque nigrum* punctis albis varium. *Vitta postocularis* nigra; leviter albotriolata. *Dorsum* et *tectrices alarum* majores lutea, plumis margine late rubrotinctis. *Tectrices minores* fuscae maculis parvis, albis, triangularibus vel cordatis. *Ala* 145 mm. (Malh. — Mihi ignotus). — *Habitat* in montibus Indiæ meridionalis (Malh.).

Junior, *Plumis dorsi* alarumque levius vel vix rubrotinctis; *gula crebre*, transversim albotriolata (Malh.).

227. *PICUS erythronotus* Vieill. N. Dict.; — Enc. 1307; — *P. bengalensis* Var., Gm.; Lath. (ex Forst. Naturf. 13, p. 14, t. 4; Specht v. Zeylon, Kerella); — id. Vieill. sub *P. beng.* sp. 68; — *P. ceylonus* Cuv. 1829; — *Br. ceyl.* Blyth; — Mus. Hein. 171; dorso aliquo superne rubris. — *Tectrices alarum* sordidius rubræ; minores albidiomaculatae. *Vitta postocularis* albidovaria. *Gula nigra* punctis crebris albis; *plumæ ventris* margine toto nigro. *Tergum* nigrum, leviter rubrovarium. *Reliqua deser.* v. supra. *Ala*, ♂ 137, ♀ 132 (Mus. Berol. — 143 Malh.). — *Ceylon*.

b) *Halluce nullo*.

Magnitudine omnique forma, præter dig. primum, similes praecedentibus; picturâ vero propiores *P. sultaneo*; tergo rubro; remigibus extus immaculatis; gula alba, fere ut in illo picta. *Pilei quoque pictura* ut in illo, pro sexu, differt. Gen. Tiga (!) Kaup; — *Chrysonotus* Swains.; Mus. Hein. p. 172; — *Chloropicoides* (!) Malh.

228. *PICUS javanensis* Ljungh Act. Stockh. 1797, 134; — Mus. Hein. 172; — *P. tiga* Horsf. L. Trans. XIII, 177; — Malh. II, 97, t. 71; — magnitudine medius: ala circa 133 mm (130—140 Malh.); dorso splendide luteo-aureo, tergo uropygioque rubris. Linea gulae media nigromaculata, sublinearis, in plerisque antice, in mare vetere tota, evanescens. — Pileus, cum crista: *maris* ruber; *feminæ* niger, albo striolatus, striolis 3—5 mm longis. Vitta ocularis nigra, lata, pone oculum vix albovaria; inter vittas 2 albas sita, quarum inferior ad alas ducta. Vitta malaris antice fulvescens, superne nigromarginata (qs. subbifida), dein latior, juxta lineam colli albam sita, infra alas ducta. Cervix cum parte brevi antica dorsi, ut in prioribus, nigra. Dorsum medium tantum in senioribus leviter rubrolavatum. Plumæ gastræ albæ (plerumque a cortice vel resina arborum inquinatae), margine laterali latius, apicali tenuius, nigris; pictura vero sat varia; pars enim, ventrales et laterales, fascia media V formi, plerumque interrupta, ornatæ. Alæ extus luteo micantes, tectricibus præsertim lutescenti marginatis; ipsa vero flexura alæ fusca. Remiges primariae extus nigrae, longiores, apice fuscantes. Maculæ parvæ albæ marginis externi, sœpius in feminis, rarius in maribus, observantur: una ad apicem; una alterave, adhuc minore, in margine reliquo. Tectrices caudæ superiores nigrae. Rectrices nigrae, interdum, in mare vel femina, maculis 1 vel 2 parvis, albis, in pogonio interno pennarum; in lateralibus utrinque 1 vel 2; quas vero in latero dextro et sinistro dissimiles vidimus. Rostrum nigrum. Iris rubra. Habitat in *Java* et *Sumatra* (M. Sthm.).

b) Varietas major: *Tiga intermedia* Blyth; — Malh. II, 99, absque iconie; — paullo major: ala 140 mm ($5\frac{1}{2}$ p. angl. Jerd. Ind. 299). Ceterum nulla re ab avi javana differre videtur, et a cl. Malherbe eadem habetur. Habitat in locis editis, montanis totius *Indiae* propriæ et *peninsulæ Indiae orientalis*; sed in regionibus non montanis *Indiae* specimina non majora quam javana dicuntur (Malh.).

c) Var. minor? *Chr. erythropygus* Mus. Hein. 173; — *Chl. rubropygialis* Malh. II, 100, t. 70 (nomen hybridum); — Jerd. Ind. I, 299; — Ala 127 mm, Malh.; — 124, Jerd.; — Color ubique minus lætus quam *P. javanensis*: superne olivaceus, in dorso luteo-rubido-lavatus; stria malaris antice nigricans (?): maculæ remigum primar. externæ albæ; striolæ pilei feminæ latiores quam præcedentis (Jerd.; sed tenues, sec. Malh. R. Zool. 1845, 400). Ex *Bengalia* Malh.; *Malabaria* merid. Jerd. Pauca specimina cognita, quæ juniora dicuntur. An igitur juv. nuper e nido evolans præcedentis?

229. *PICUS shorei* Vig. Z. Proc. 1831, 175; — Malh. II, 101, t. 71; — similis *P. javanensi* sed multo major: ala 264 mm; dorso medio, saltem in mare, ut tergum, rubro; alarum tectrices in senioribus margine rubrolavatae. Gula lineis 2 angustis, nigromaculatis, in mento contiguis, retrosum divergentibus, aream subtriangularem, fulvescentem complectentibus. Striolæ albæ pilei longiores. Reliqua ut in sp. cit. (Malh.; mihi ignotus). — Habitat in montosis *Indiae* septemtr. (Himalaya) et meridionalis (Malabar). Jerdon. Ind. I, 298.

TRIBUS 29. *Pici fulviceristati.*

Pileus flavus, fulvus aut rufus, plumis elongatis, firmioribus (distinctis), cristatus. Vitta malaris *maris* latior, rubra; *feminae* nulla vel tantum fuscostriolata. — Color corporis flavo vel rufo nigroque varius. Digitus 4:tus tertio brevior; hallux adest, ordinarius. Cauda, ut praecedentium, longior ($\frac{2}{3}$ alae), acutius gradata. Rostri culmen altius, acutius carinatum. Furca menti longior quam $\frac{1}{2}$ suturæ; ceterum forma rostri sat varia. Sp. magnitudine mediae; omnes *americanæ*, *tropicæ*. — Gen. Celeus Boie; *Celeopicus!* Malh.

Div. 1 rostro fortiore, culmine fere recto.

Rostrum longitudini capitidis fere æquale, apice fortius cuneatum, carinis nasalibus validis, prominulis, sed prope culmen sitis. Remiges et rectrices fasciatæ, apice late nigrae. Caput cum gula fulvum, gutture inferiore nigro. Crista longa.

230. *PICUS tinnunculus* Wagl. Isis 1829, 516; — Malh. II, 36, t. 52; — rufus dorso aliquæ latius nigrofasciatis; gastræo, cum jugulo, nigro, in ventre albido-fasciato. Caput, cum gula, fulvum. Remiges et rectrices nigræ fasciis rufis, angustioribus. Ala 155 mm. — *Brasilia* (Mh.; Mus. Berol.).

231. *PICUS multicolor* Gm. — Lath. 46 (Buff. et Pl. Enl. 863); — Malh. II, 34, t. 32; — superne rufus, parum vel vix nigromaculatus; ventre pallidiore, immaculato. Caput, cum gula, fulvum; gutture reliquo, cum lateribus colli cerviceque infimo, nigris. Remiges et rectrices rufæ, fasciis angustis nigris, in senioribus interruptis. Ala 160 mm. — *Brasilia* (Mh.; Mus. Berol.); *Guyana* (Malh.).

Div. 2 rostro debiliore, culmine fortius arcuato, plerisque breviore; apice parum vel vix cuneato; carinis nasi vix eminentibus, antice obliteratis.

a) *Rectricibus totis nigris, remigibus fasciatis.*

Obscurius colorati, tergo flavescente. Crista plerumque ampla, flavescentia.

232. *PICUS flavescens* Gm.; Lath. 42 (Brown Ill. 12); — Malh. II, 21, t. 53; — niger, subtus unicolor, superne flavofasciatus; capite, cum crista prolixa, cervice gulaque, tergo tibaliisque flavescentibus. Ala 145—150 mm (M. Sthm.; 160—165 Malh.), — Tectrices caudæ nigræ, maculis paucis vel margine solo flavidis. Fasciæ remigum flavæ. Regio malaris, in femina et juniore, plerumque fusco-striolata; in *mare*, vitta malaris, ut in omnibus hujus generis, magna, rubra. — Hab. in *Brasilia*.

Colore variat: Mas vetus, capite tergoque fulvescentibus, plumis cristæ rubropictis. — Alii, utriusque sexus, capite reliquisque partibus pallidis. albidis.

233? *PICUS lugubris* Natt. Malh. II, 19, t. 54; — similis præcedenti, sed fuscus pro colore nigro præc:s, tectricibus caudæ remigibusque crebrius rufofasciatis. Color flavescentis variabilis, saepe rufescens. Ala 150—157 mm. — *Brasilia, Paraguay*, (Malh.; mihi ign.).

234. *PICUS ochraceus* Spix Bras. I, 59; — Malh. II, 23, t. 54; — superne flavidus nigromaculatus, subtus nigrofuscus, lateribus flavidus. Caput totum, cum collo, et tergum flavidus. — Similis P. flavescenti; præsertim differt lateribus corporis flavidis, maculis nigris variis. Plumæ ventris angustius rufomarginatæ. Remigum fasciæ paucæ, maculares, rufæ; sed, in cubitalibus, extus flavidæ. ♂♀ Mus. Berol. ala 150, 145 mm. (142, Mh.). — *Brasilia*.

235. *PICUS cinnamomeus* Gm.; Lath. 45 (Lath. Syn.; Pl. Enl. 524); — Malh. II, 32, t. 56; — supra subtusque saturate rufus, pileo (cum crista) tergoque (c. uropygio) flavescentibus. — Alarum tectrices et scapulares maculâ vel striolâ mediâ, parva, pallida, saepe obtectâ, ornatae. Ala, ceterum, extus immaculata; sed remiges intus nigrofasciatæ. Gastræum totum, cum gula, et latera capitidis colore dorso similia, non fasciatæ; hypochondria vero pallida. Rostrum flavescentis. Ala: 160—170 mm (Mus. Stockh., Berol.; — 150—163, Malh.). — Mares et feminæ promiscue majores. — Habitat in *Guyana* (et ins. Trinidad, Taylor, Ibis 1864). — Junior (Mas. M. Sthm) tectricibus alarum, majoribus et minoribus, fascia media obtecta et margine apicis albidis. Remiges intus latius fasciatæ.

Obs. Specimina quedam, utriusque sexus, differre videntur pileo c. crista colore corporis, rufis. In his hypochondria quoque, vel etiam tergum, saepe eodem colore tineta. Quod inquinatione resinæ cujusdam arborum oritur; plumæ igitur, in parte obtecta, vel saltem ima basi, flavæ. In aliis tergum viridi-inquinatum.

236. *PICUS reichenbachii* Malh. II, 28, t. 56; — obscurius fusco rufus, ventre medio alisque extus fuscofasciatis; pileo, tergo crisoque flavescentibus. Maculæ pallidæ scapulae tectricumque ut in præcedente, a quo præcipue differt plumis nigricantibus, apice latius rufis. Alæ extus rufæ, plus minusve fusco fasciatæ. Paullo major dicitur: ala 170—180 mm. — *Columbia; Brasilia* (Malh.; mihi ignotus).

237. *PICUS junana* Spix Bras. I, t. 47; — Malh. II, 27, t. 55; — superne subtusque rufus, pileo concolore, tergo flavescente. — Color paullo obscurior quam P. cinnamomei; alæ extus immaculatae. Remiges, ut in præcedentibus, intus flavidofasciatæ. Ala 160 mm. (M. Berol.; Mh.). — Hab. in *Brasilia* (etiam in *Columbia* et *Peru* Malh.). — Obs. Pileus et crista non a sorde vegetabili colorati; plumæ enim basi concolores vel obscuriores.

b) *Rectrices totæ nigrae; remiges intus pallidæ, non maculatae.*

238. *PICUS exalbidus* Gm. (Lath. Syn., ex Briss. sp. 31); — Malh. II, 30, t. 55; — P. flavigans Lath. sp. 44 (nomine Gmeliniano mutato); — P. semicinnamomeus R:beh, Handb. 407 (mas senior?); Malh. p. 26; — pallide fulvo-flavidus, alis fuscis vel rufis; rostro brevi,

flavo, basi fuscescente; cauda tota nigra. Ala circiter 140 mm. Magnitudinem in speciminiibus numerosis perparum variabilem inveni; sed pictura secundum etatem differt.

Junior flavo albidus, tectricibus alarum fuscis, late albidiomarginatis; dorso antico guttureque, vel aliis partibus gastrae, fuscomaculatis; remigibus fuscis, tenue rufescenti marginatis.

Senior non maculatus. Tectrices alarum fuscæ; majores plerumque striola scapi rufescente. Remiges fuscæ, secundum scapum plus minusve rufæ; vel latius rufæ, fuscomarginatae; intus late, pallide rufæ.

Mas vetus fulvoflavidus, vitta malari magna, rubra; tectricibus alarum minoribus nigrofuscis, plerisque ad apicem late flavidolimbatis; tectr. majoribus rufis, apice nigromarginatis. Remiges cubiti rufæ: intus paullo pallidiores, summo apice macula parva nigra. Primariae nigræ: due primæ extus immaculatae; reliquæ extus intusque, gradatim longius latiusque rufæ, relieta, in ultimis, tantum vitta apicis nigra, parva, basim pennæ versus angusta, ad scapum decurrente. Cauda tota nigra. Ala 140 mm. Guyana (M. Sthm).

c) *Rectrices nigræ, basi late rufæ, non fasciatæ;*
remiges intus late pallidæ, non fasciatæ, extus rufæ. (Color corporis rufus, nigrovarius; rostrum, præc: s, brevius, flavidum).

239. *PICUS castaneus* Licht. Wagl. Isis 1829, 515; — Malh. II, 25, t. 50; — superne subtusque rufus, fasciis dorsi totiusque gastræ abbreviatis, curvatis, nigris, non crebris; alis (maris) immaculatis, vel (feminæ) tectricibus, ut dorsum, maculatis. Caput, cum crista et gula, sordide fulvoflavidum, immaculatum. Tergi pluma basi flavescentes, apice rufæ (color tamen sorde externo non ortus videtur); non maculate. Rectrices basi rufæ, apice longo nigro. Remiges rufæ, absque fasciis, intus vix flavescentes; primariae apice fuscæ. Vitta malaris maris latissima, rubra; feminæ nulla. Ala 127—128 mm (Mus. Berol.). — Habitat in Guyana (Surinamo M. Berol. — Mexico, Peru, Malh. An rite?).

240. *PICUS verreauxi* Malh. R. Z. 1858; — Mon. Pic. II, 14, t. 51; — rufus, gutture tectricibusque alarum minoribus nigromaculatis: maculis transversis, arcuatis. Caput, cum crista, saturatius rufum, macula plumarum media, longitudinali, nigra. Reliquæ partes immaculatae. Plumæ dorsi tergique dilutius rufæ, basi flavidæ. Ala 133 mm. — Ecuador (Malh.; non vidi).

241. *PICUS grammicus* Natt. Malh. Mem. de Liege 1845; — Mon. II, 18, t. 51; — rufus, dorso alisque, collo undique, cum jugulo pectoro que, nigrofasciatis, plumis basi flavidis. Tergum et hypochondria flava immaculata. Caput cum crista gulaque rufum, immaculatum. Remiges cubiti extus angustius nigrofasciatæ. Ala 120 mm. — Brasilia (Malh.; mihi ign.).

d) *Rectrices et remiges rufo nigroque fasciatæ (vel maculatæ).* Corpus rufum, transversim nigrovarium, crista concolore. Rostrum brevius. Sat similes sp. Tribus sequentis; differunt vero

digito 4:to breviore, rostro apice paullum cuneato; crista dilutiore, plerumque majore: usque a vertice medio incipiente.

242. *PICUS rufus* Gm.; Lath. 48 (Pl. Enl. 694, 1); — Malh. II, 13, t. 50; — rufus, supra subtusque crebre nigrofasciatus, gutture inferiore nigrofusco, plumis tenuius rufomarginatis striolaque scapi pallida (plerumque obtecta). Caput cum gula flavescens, nigropunctatum. Remiges primariae intus non fasciatæ. Ala 118 mm (♀ Mus. Sthm; 120, Malh.; 112, ♂ M. Berol. vitta malari larga, rubra). — *Guyana*.

Obs. *Picus flavigollis* Vieill. N. Dict. et Enc. p. 1305, ut sp. ignota a Malherbio, II, 24, enumeratur: sed nobis videtur idem ac *P. rufus*, male descriptus voce "longitudinaliter", in descriptione striarum corporis, lapsu eulami, pro transversaliter, adhibito. Idem vitium, aliis, quoque locis, in eodem opere invenitur (e. gr. in descr. gallica *P. brachyuri*, Enc. 1324).

243. *PICUS undatus* L. XII (Edw. 322); — Lath. sp. 47; — *P. multifasciatus* Malh. Mem. de Liège 1845; — Mon. II, 16, t. 50; — supra subtusque rufus, crebre nigrofasciatus, pectore concolore. Caput et tergum flavidio-rufa, nigropunctata et striolata. Remiges omnes extus intusque nigrofasciatæ. Ala 112 mm (♂ Mus. Sthm; 113 Mh.); — *Guyana, Brasilia*.

244. *PICUS loricatus* R:bach Handb. p. 405; (Vollst. Naturg. t. 681, fig. 4495—6, *Meiglyptes lor.*); — *C. multifasciatus* Var. minor Malh. Mon. de Liège 1845 p. 18; — *C. fraseri* Malh. II, 16, t. 43 bis; — rufus, superne aliquo angustius nigrofasciatus. Caput c. gula concolor, immaculatum, præter pileum antice nigropunctatum. Gastræum pallidius fulvescens, fasciolis submarginalibus, arcuatis, nigris, squamoso-maculatum. Cauda superne nigra, maculis marginalibus albidis. Ala 118 mm; Long. tot. 204 (s. fere 8 poll.) Malh. — Ex *Babahoyo* ("Amer. Centr." Malh.; veris. lapsu, pro *Ecuador*). — Cauda nigra, basim versus fulvofasciata (R:bch; sed, in icon, cauda subtus tota fasciata); — *Peru, R:bch*.

Obs. Longitudo totalis, in opere R:bachii. "6 poll. 10 lin." (i. e. 179 mm, s. fere 7 poll) dicitur; qua re sp. ab eo descripta non agnoscitur et a cl. Malherbe pro var. *minore* *P. undatus* habita est. Icon vero citata rem illustrat; ostendit enim cutem hujus avis male præparatam esse, caudâ ita retracta, ut apices alarum non attingat. Cauda igitur in situ naturali restituta. avis pollicem fere longior fit, s. fere 8-pollicaris, sicuti *P. fraseri* Malh. — Præterea digiti et unguis et cet. a cl. R. dimensi sunt; sola vera mensura non fallax, longitudo alæ, omittitur. Tantum femina descripta videtur. (Mihi ignotus).

245. *PICUS pholidotus* N. — *Celeus mentalis* Cassin Philad. Proc. 1860, 13; — et Philad. Trans. 1863, t. 52 (nec *P. mentalis* Temm., supra sp. 167); — *C. squamatus* Lawr. Ibis 1863, 184 (nec *P. squamatus* Vig., supra sp. 173); — superne læte rufus, dorso anteriore, tectricibusque alarum paullo obscurioribus, tergo paullo pallidiore; maculis paucis frontis fasciisque angustis, nigris, dorsi, tergi et tectricum alarum. Subtus tetus pallide rufus, striolis submarginalibus nigris, curvatis, squa-

moso-pictus. Cauda nigra fasciis rufis integris (s. "rufa, apice fasciisque nigris"). Remiges extus intusque lète rufis, utrinque maculis paucis nigris pictæ. Regio malaris et gula *feminæ* diluta rufæ, *maris* totæ rubræ (angulo tamen menti rufo). *Mas*, ala 120 mm, (4 $\frac{3}{4}$ p. Cassin; cauda lapsu, "1 $\frac{3}{4}$ p."); *femina*, ala 122 mm (4 $\frac{7}{8}$ p.; c. 3 $\frac{1}{8}$ p.=78 mm; Lawr.). Habitat prope *Panama*. — Affinis *C. fraseri* Malh. (= sp. præcedenti) sed vere distinctus (Slater, *Ibis* I. cit. in nota. Mihi ignotus).

TRIBUS 30. *Pici acutirostres.*

Rostrum brevius, crassius, convexum, apice acutum (non cuneatum); culmine fortius, sutura quoque leviter, arcuatae; carinis omnino obsoletis: culminis hunili, parum acuta. Furca menti excedit suturam medium.

Sp. mediæ vel minoris magnitudinis, rufæ vel fuscæ, fasciis maculisque transversis, fuscis pictæ, capite fere concolori. *Crista* posterior: occipitis, vel fere cervicis; dependens, plumis planatis, apice rotundatis composita. *Ala* brevis, pennis primariis cubitales parum excedentibus. *Cauda* brevius gradata; brevis, sed alâ dimidiâ semper longior. *Digitus 4:us* tertio subæqualis vel longior, — Sp. omnes ex *India* et *insulis indicis*.

Gen. *Meiglyptes* Sw. — *Phaiopicus*: Blyth, Malh.

Sectio 1. *rufi, nigrofasciati, halluce minuto.*

Hallux (ut in *P. bengalensi* (224) et aff.) brevior quam articulus primus digiti 2:di. Remiges et rectrices colore corporis rufæ, nigrofasciatae. Fasciæ nigrae rectricis lateralis 9; rectricis mediae 6 et apex longius niger. Gula cum regione malari (in plerisque) squamoso-picta: plumis oblongis, pallidimarginatis. *Mas* a *femina* differt, regione infra-oculari (neque malari), ab angulo oris, fere ad aures, cerebre rubropunctata. — Sp. vel formæ plures, inter se simillimæ, nec satis pro differentia ætatis et varietate individuali cognitæ, ideoque dubiae. De hac re conf. deser. P. badii, n:o 250. — Gen. *Micropternus* Blyth. 1849.

246. *PICUS rufinotus* Malh. in Musæis variis 1844; — Mon. II p. 1, tab. 46. — *P. phaiiceps!* Blyth J. As. Soc. 1845; — major: fere 9-pollicaris, ala 135—140 mm; pluinis gulæ rufis, pallidimarginatis. Remiges et rectrices rufæ fasciis angustis nigris; rectricibus mediis apice brevi (15 mm longo), nigro. — Corpus lète rufum, fasciis dorsi ventrisque crebris, nigris, sed pectus anterius late immaculatum. Rostrum nigrum angulo menti pallescente. — *Nepal* (Malh. Mus. Berol.); *Assam*, *India media*, *Burmah* (Jerd.). — Obs. nomen *phaiiceps* hybridum.

247. *PICUS gularis* Jerdon Madr. Journ. — et Ind. I, 294; — Blyth Catal. 278; — R:bach Handb. 403; — *P. jerdoni* Malh. II, 3, t. 47; — paullo minor: ala circiter 115 mm (120 Malh.); plumis gulæ

læte rufis margine laterali pallidiore, lato. — Rufus, dorso alisque fasciis angustis, crebris, nigris pictis; gastræo immaculato; pileo fuscescente. Cauda minus rotundata, fasciis rectis, subintegris, sed in penna media, intus nullis. Apex brevissime fuscus: in pennis mediis, 8 v. 9 mm; (color tamen fucus multo longius extensus, sed fasciæ angustâ rufâ divisus). — Ex *Bengalia* (Mus. Berol. Mas).

Alia specimina, plumis gulæ fuscis, margine albido pictis, describuntur (Malh. et Jerdon I. c. — An juniora?). — *India meridionalis*. — Caput sœpe resina quadam inquinatum. Iris fusa (Jerd.).

Varietas paullulo fuscior in insula *Ceylon* invenitur (Jerd.).

248. *PICUS brachyurus* Vieill.? Dict. — et Enc. 1324 (male deser.); — Malh. II, 5, t. 46; — minor: 7 pollicaris; ala 105, feminæ 109 mm; plumis gulæ læte rufis, tenuæ, definite albidomarginatis (et, in femina, utrinque, intra marginem, puncto fuso ornatis). Corpus supra subtusque læte rufum, fasciis vix ullis; pileo concolore (in femina paullum fuso mixtum). Remiges omnes in pog. interno fasciis non latis, nigris pictæ. Ala maris (senioris?) extus immaculata; feminæ (junioris?) extus, tota, angustius fasciata. Rectrices fuscæ, fasciis rufis paullo angustioribus quam fasciis interjectis nigricantibus, apiceque longius nigricante (in mediis 20 mm vel longius). Fasciæ rectricum rufæ in mare interruptæ et obliquæ; in femina integræ et regulares. *Java* (Mus. Berol.).

249. *PICUS squamigularis* n. — (Forte M. *badius* Jerd. Ind. I, 295, obs. post M. *gulare*? non vero P. *badius* Raffl., "plus quam 8 pollicaris"). — Magnitudine æqualis præcedenti; circiter 7 pollices longus, ala maris 103, feminæ 107 mm; plumis gula nigrofuscis margine laterali latiore, pallide fulvescente, striolaque media (plerumque obtecta) rufescente. Corpus supra subtusque læte rufum, dorso postico alisque totis nigrofasciatis, pectore dorsoque antico immaculatis; pileo fuscumixto: plumis pallide fuscis, margine late, pallide rufescientibus. Remiges omnes rufæ, late nigrofasciatæ: fasciis nigris in pog. interno multo latioribus, quam interjectis, rufis; in pog. externo paullo angustioribus. Fasciæ rectricum nigrae et rufæ subæquales, vel nigrae angustiores; plerumque rectæ, regulares. Apex rectricis mediae brevius niger (7—13 mm) Rostrum, ut præcedentium, totum nigricans. Digitus 4:us tertio paullulo brevior.

Mas (hodie nobis præsto forte junior?) regione suboculari rubropunctata; plumis cristæ (cervicis) vitta media, vel maculis, nigrofuscis, obtectis, pictæ; dorsi antici obtecte nigromaculatis; abdomine paullo fusciore quam pectore; tantum in crasso postremo nigrofasciato. Rectrices mediae fasciis sat obliquis, apiceque nigro, 13 mm longo.

Femina (senior videtur) regione suboculari non rubromixta. Margines pallidi plumarum gulae latiores quam maris. Plumæ cristæ rufæ, immaculatæ. Plumæ dorsi antici immaculatæ; dorsi medii stria teuui nigra, intra marginem, concentrica, sed obtecta, ornatae. Plumæ laterum corporis abdominisque stria ejusmodi, sed non obtecta, pictæ. Fasciæ caudæ nigrae angustiores, magis regulares, apices pennarum medianarum brevius (7 mm) nigricantes.

Specimina descripta ex *Malacca* (Mus. Sthm, in oppido Singapore emta). — Ob differentias remigum et rectricum, minime junior præcedentis.

250. PICUS *badius* Raffl. L. Trans. XIII, 289; — major: Long. totalis fere 22 centim. (8 p. gall; 8 $\frac{3}{4}$ p. angl.); Ala circa 120 mm. — Plumæ gulæ, ut præcedentis, nigrofuscæ, sed margine.toto (etiam apicis) pallido, striolaque media rufuscens. Corpus late rufum, supra subtusque transversim nigrovarium, gutture inferiore (c. pectore antico) intensius rufo, immaculato. Fasciae caudæ alarumque similes præcedentis, sed apex rectricum longius nigricans. Rostrum totum nigrum. Digitus 4:tus tertio paullo longior. Specimina duo masculina, *javana*, præsto sunt.

Mas senior, plumis gulæ striola media dilute rufa, basi lata, notatis; juguli immaculatis; pectoris antici, fascia media, obtecta, dilute fusca, pictis. Venter et latera corporis fasciis crebris, angustis, interruptis, fuscis, areuatis et, postice, margini concentricis, varia. Plumæ pilei basi et medio pallide fuscae, margine lato, sordide rufescente. Plumæ cervicis basi tantum fuscae; dorsi totius, fasciis fuscis obtectis, curvatis, interruptis. Fasciæ in uropygio maculatim apparentes; in tectricibus caudæ integræ, latiores. Fasciæ rectricum nigrae regulares, rectæ, integræ, fasciis rufis paullo angustiores. Nigredo apicis, in pennis mediis 19 mm (sed in penna dextra, fasciæ angusta, rufa divisa; quare apex totus niger in hac penna tantum 13 mm). Fasciæ remigum nigricantes, in pog. interno, rufis latiores; in externo multo angustiores (præter pennam spuriam et secundam, in quibus latiores sunt. Ala 118 mm. — (*Bataviæ* a:o 1842 in coll. majore avium entus).

Mas junior, regione suboculari vix minus quam præcedentis rubropunctata. Plumæ gulæ striola pallescente media tenuissima, parum apparente. Plumæ gastræ reliqui, ut in seniore, nigrovariae; sed fasciæ, in ventralibus et lateralibus, integræ, parum curvatæ, non angustiores quam fasciæ interjectæ, rufæ. (Plumæ tamen paucæ, novæ, letius rufæ, stria nigra angustiore, margini concentrica ornatae, identitatem specificam hujus et præcedentis indicant). Plumæ pilei totæ fuscae (quædam, apie, trituræ pallescentes); cervicis totæ rufæ; dorsi antici et postici, sicuti tectrices caudæ alarumque, fasciis nigris rectis, integris, latitudine fasciis rufis subæqualibus. (Tantum in dorso maxime antico fasciæ paullo minores et interruptæ sunt). Fasciæ remigum ut in deser. senioris; nigrae tamen ubique paullo latiores quam in illo. Fasciæ rectricum nigrae, rufis ubique evidenter latiores. Nigredo apicis in pennis mediis fere 25 mm longa; sed, in utraque, fascia rufescente, imperfecta, tenuissima, fere 18 mm ab apice sita, divisa. Ala 120 mm. — In vicinia urbis *Bataviæ*, a Doct. Mellerborg, suecano, a:o 1827 occisus.

Obs. Specimina plura hujus et præcedentium sp. in muscis exoticis descripsi; differentias vero ætatis, mihi tum ignotas, minus adcurate notavi, quare incerta sunt, satiusque duxi, ea præsertim exponere, quæ hodie ante oculos habeo. Specimen tamen hujus Pici, ex *Sumatra*, in Mus. Berol. vidisse suspicor, cui ala fere 125 mm et nigredo apicis caudæ 12 mm.

251. PICUS *badiosus* Temm. Mus. Lugd.; — R:bach Handb. p. 404. — Hinc: Malh. II, p. 6, absque icone; — similis praecedentibus, et, ut videtur, in primis *P. gulari*; sed minor: ala (4 p. germ. =) 105 mm. — Rufus, superne nigrofasciatus, subtus fere immaculatus; capite leviter infuscato; gula pallidius fusca, margine striolaque media plumarum pallidioribus. Remiges fasciatæ, sed prima (spuria) fusca, immaculata; qua re ab omnibus præcedentibus differre videtur. — *Borneo* (R:bach).

252. PICUS *fokiensis*; — *Brachypternus!* fok. Swinhoe Z. Proc. 1863, 87; — fuscus, dorso angustius rufofasciato; remigibus rufis, late nigrofasciatis; cauda rufa fasciis nigris, angustis. Plumæ pilei cervicisque elongatæ, angustæ; in *mare* fuscofulvescentes, in *femina* late rufis; stria media fusca, in *femina* dilutiore, pictæ. *Mas* præterea regione suboculari rubropunctata agnoscitur. Rostrum fuscescens, angulo menti pallido. Iris rubido-fusca. Ala maris (5 p. =) 127 mm, feminæ 133. — Hab. in *China* (circa oppidum Foochow, prov. Fokien; ad mare, ca 25° lat.). Ab affinibus differt colore saturatiore et præsertim gastræo toto fuso, pro rufo. (Swinh. l. c.).

Sectio 2. *Fusci, transversim albidostrati, halluce ordinario.*

Hallux, præter unguem, ar icudo primo digiti 2:di longior. Remiges et rectrices nigricantes, maculis marginalibus, albidis, pictæ. Gula transversim tenuissime striata. Vitta malaris *maris* rubra, ordinaria; *feminæ* nulla. Genus *Meiglyptes* rec.

253. PICUS *brunneus* Eyton Z. Pr. 1839, 106; — *P. luridus* Nitzsch Pterylogr. 137 (nomen re vera antiquius, sed non ante 1840 in publicum editum). — *P. pectoralis* Malh. II, 8, t. 47 (nec *P. pect.* Lath.); — fuscus, transversim tenui pallidistriatus, uropygio concolore. — Supra subtusque obscure, sordide fuscus. Caput superne lateribusque immaculatum, præter vittam malarem maris rubram. Striolæ transversæ dorsi flavidæ, tergi obsoletiores. Gula fulva, lineis transversis tenuibus nigris, crebre striata; gutture reliquo nigro, inferius transversim striato maculâque lateralí majore, fulvoalbida. Venter fuscus, lateribus tenui flavidofasciatis. Remiges, margine externo punctis (fere 8 v. 9), intus maculis majoribus, marginalibus, sordide albidis. Rectrices corpori concolores, maculis parvis, albidis, utriusque marginis 5 v. 6 (sed spatium satis est maculis fere 10). Rostrum fuscum, subtus paulum pallescens. Dig. 4:us tertio definite longior. Ala circiter 100 mm. (98—104; *femina* plerumque mare major). Habitat in *Sumatra* et *Malacca*.

Hic plerumque *P. pectoralis* Lath. habetur, etsi nulla res in illius descriptione, cum hoc Pico convenit. Conf. sp. spurias.

254. PICUS *tristis* Horsf. Linn. Tr XIII, 177; — niger, transversim albido striatus, uropygio fulvoalbido. — Caput et collum sordide albida, creberrime, transversim nigrostriata; striis in genis et gula tenuissimis; in gutture inferiore ventreque sensim latioribus. Lorum c. orbita fulva. Vitta malaris *maris* rubra. Venter fuscus vel niger, minus vel parum striatus. Dorsum anterius, alæ, hypochondria et crissum nigra

paullo latius albido fasciata. Dorsum posticum fulvoalbidum, immaculatum. Remiges nigræ, maculis utriusque marginis albidis; externis, in primariis, parvis. Rectrices nigræ, maculis majoribus, albidis; utriusque marginis 5, præter marginem apicis lateralium, albidum. Rostrum nigrum. Pedes fuscescentes. Digitus 4:us tertio æqualis. Ala 92—100 mm (feminæ plerumque minores). Habitat in *Java*, *Sumatra* et *Malacca*.

a) pectore, ad pedes usque, cum gutture infimo pure nigro, non striato; loris nigropunctatis. — *Mas* (*vetus?*), ex *Java*, in Mus. Berol. adest; relictis, in pectore nigro, plumis paucis, ut in forma sequenti (*b*) fasciatis. — *P. tristis* propr., Horsf. l. c.; — Malh. II, 10, t. 48; — *P. poicilophus!* Temm. Col. 197. — Hæc forma, a quibusdam, unice *javana* habetur; Malherbe vero etiam in *Malacca* etc. inveniri credit. Differentias a forma sequenti, præter memoratas, non inveni; neque feminam vidi, quæ vero a Malh., l. c., ventre nigro prædicta, describitur.

b) Ventre toto nigrofusco, striis crebris, pallescentibus, plus minusve interruptis, vario; loris haud nigropunctatis. *Mares* et *feminæ*, in *Sumatra* et *Malacca* collecti, frequentius ex oppido *Singapore* afferuntur. Hæc igitur forma his terris propria habetur: *P. grammithorax* Malh. II, 12, t. 48; — (*P. tristis* Raffl. L. Trans. XIII, 290). — Sed in Mus. Stockh. adest *mas* (ex *Singapore* 1852), inter ambas formas intermedius: plaga ventris anterioris magna, nigrofusca, immaculata, indeterminata et ad latera paullum albido-varia. *Femina* quoque, aliasque *mas*., plaga pectorali minore, nigrante, instructi, pluresque, utriusque sexus, ventre toto striis integris picto. Præterea *mas* nigriventris, nuper descriptus (lit. *a*), plumas fasciatas (ptiloseos præcedentis) relictas ostendit. Nigri-ventres igitur (*a*) aves seniores, fusciventre, juniores esse suspicamur.

Pici incerti et spurii.

a) Species dubiae.

1. *P. pectoralis* Lath. Suppl. Ind:s, ex Syn. Suppl. II, p. 372: "rufus, nigroundulatus, abdomine rufescente, nigromaculato; fascia pectorali nigra. Long. 9 poll Hab. in *Nova Zelandia*." "Similis *P. rufo sed major*" (Lath.). — Hanc descriptionem suspectam et, saltē patriā, falsam esse, jam observavit Wagl. Syst. 74. Gray et Malherbe descriptionem *P. brunnei* essse crediderunt; cum quo tamen vix ulla re convenit. Nomen igitur potissimum incertum habendum, vel plane rejiciendum.

2. *P. quadrimaculatus* Miller Cimel. Phys. 99, t. 54; — Wagl. Syst. Pici inc., sp. 4 (ex Mill.): magnitudo *P. viridis*; non cristatus. Superne (dorso e. tectr. alarum, cerviceque) viridis, pileo toto uropygioque flavis. Gastræum canum (cæruleo-cinerasc.); gula nigra, vitta laterali alba. (Præterea, ex iconè: crissum album; tectrices alarum maculis 4 albis ornatæ; remiges et rectrices nigræ; rostrum nigrum; pedes olivacei). Hab. in *Ceylona*. (Ex Wagleri opere). — Hic videtur sp. quædam e. tribu *P. viridis*, male vel ad libitum colorata.

3. *P. turati* Malh. v. sp. 45 c.
4. *Meiglyptes jugularis* Blyth Journ. A. S. 1845, — et Catal. p. 669 (c. deser.); — Malh. II, 11 (ex Blyth, fig. nulla). "Similis *P. canenti* (supra sp. 27), differt vero cervice fulvo-albido, gula nigra striolis albidis varia, et præsentim forma rostri alia" [quam propter a Blythio in genus *Meiglyptem* disponitur]. "Ala (4 p.) 101 mm; cauda (2 $\frac{1}{2}$) 53 mm. — Nigrofuscus, vitta malari *maris* rubra; plumis occipitis elongatis nigris; collum fulvoalbidum tæniâ ante alas ducta continuatum. Uropygium et vitta obliqua alæ fulvoalbida. Remigum fasciæ basi, intus, latæ, maculeque externæ parvæ albidae. Frons et gula plus minusve albidopunctatæ vel striolatæ. — *Tenasserim*" (Blyth). Conf. post seqv.
5. *Meiglyptes sordidus* R:bach. Handb. 402 (fig. 0); — Malh. II, 8 (ex R:bch); — "nigrofuscus cristatus; cervice, lateribus colli, scapulis margineque scapulari (?) et ala subtus, punctis (sprenkelfleckchen) remigum primariarum, fasciis latis maculisque cubitalium, tergoque sordide fuscofulvis. Ala (4 p. 5 l. =) 116 mm; cauda (2, 5 =) 65 mm. Rostrum forma ut in genere *Meiglypto*; ceterum similis *Hemicercis*. *Tenasserim* 2 specim. cognita." (R:bch).
- Pici ambo h. l. descripti (sp. 4 et 5) maxime affines et fere ut *P. canente* picti videntur, a quo tamen differunt cervice pallido, gulaque nigricante. Cauda brevissima etiam sp. Tribus nostræ tertiae indicare videtur, sed ob formam rostri inter *Meiglyptos* (in Tribu nostra 30) enumerantur, quæ mira sane characterum consociatio. Si a tironibus in ornithologia descripti essent, hos Picos juveniles credidisse; plerique enim Pici, in statu juvenili, rostrum ut sp. tribus nostræ ultimæ, acutum et breve habent.
6. *P. thibetanus* Natt. v. post *P. bengalensem*, sp. 224.
7. *P. khan* Philippi; descriptio nobis adhuc ignota. Conf. post sp. 63.
- b) Sp. descriptione manca vel falsa non determinandæ.
8. *P. persicus* Gm. Lath. 34. Conf. obs. post Tribum 19.
9. *P. flavipes* Gm. (ex Penn. Arct. Zool.). Determinari nequit sed a Lathamo, qui sp. Pennanti plerumque melius noverat, inter synonyma *P. hirundinacei* enumeratur.
10. *P. fasciatus* Gm.; Lath. 12; — Wagl. Syst. 54 (ex Lath.); — deser. incompleta, sp. quandam *P. lineato* affinem indicare videtur.
11. *P. nigroflavus* Actes Soc. d'hist. Nat. I, n:o 33 (indeque Wagl., post gen. Picum); — non determinandus; an *Picus*?
12. *P. aurocapillus* Sw. Conf. obs. post *P. gerini*, sp. 162.
13. *P. flavigollis* Vieill. v. post *P. undatum*, sp. 242.
14. *P. cristatus* Vieill. v. post *P. chlorozostum*, sp. 211.
15. *P. karelini* Brandt. v. post *Picos virides*, Trib. 19.

c) Sp. defectu partium non agnita.

16. *P. semirostris* L. est *P. viridis* juv. in spiritu vini asservatus, vagina cornea maxillæ superioris amissa. Specimen in Mus. Stockh. asservatur.

17. *P. leucurus* Pr. Paul. conf. sp. 45 d.

d) Sp. aliorum generum avium, cum Picis confusæ.

18. *P. altivolans* Lath. Suppl. 2:dum, ex Gerini Orn. II, 49, t. 173, ubi nil præter nomen et icon, subsimilis *Galbulæ*, nec Pico, exhibetur.

19. *P. pitius* Mol., Gm.; v. sub *P. chilensi* sp. 217.

20. *P. cafer* Vieill. Dict.; Enc. 1323. Diagn. ex *P. cafro* Gm.; — sed descr. gallica ex. Pic Promepie Le Vaill. Prom. t. 32, = *Micro-*
pogon sulphuratus Lafr. Mag. de Zool. 1836, tab. 60, *Trachyphonus*
cafer Bp. Csp. 142, quæ avis est Bucconina. — (*Cucupicus cafer* Less.
Tr. 166!)

e) Sp. arte compositæ.

21. *P. boiei* Temm. Pl. Col. 473 (nomine recentius dato quam *P. boiei* Wagl.); cutis tota composita. *P. sumptuosus* Less. Tr. 229. (Conf. Obs. Malh. I, p. 11).

22. *P. undosus* Cuv. R. A., *P. undulatus* Vieill et *P. undatus* Temm. Pl. Col. Tabl. Meth. p. 63, ex Pl. Enl. 533, v. notam sub *P. americano*, sp. 39.

23. *P. smaragdinicollis* Malh. 1849; est *P. exalbidus* cum apposita macula jugulari, viridiplumosa (Malh. II, 30).

24. *P. meriani* (Dendromus mer.) Hartl. W. Afr. 181, est *P. ictero-*
melas, cum plumis apicè rubris juxta abdomen appositis (Malh. II, 182)

Genus II. PICUMNUS Temm. Pl. Col. 371 (1824).

Cauda parva: longitudinem circiter dimidiam alae aequans; mollissima; pennis 10 angustis, linearibus, apice rotundatis. Pen-
næ laterales paullo breviores.

Rostrum rectum, capite brevius, apice compresso, leviter cuneato; carinis nasalibus obsoletis culmineque carinato (præter div. ultimam). Furca menti parum ante nares ducta, medium suturam non attingens. — Nares setulis sparsis obtectæ.

Pedes Pici. Digitus 4:tus tertio sublongior (præter Trib. ultimam). — Lingua paullo minus extensilis quam Pici. — Sexus præter picturam pilei (maris plerumque antice rubropicti) inter se similes. Juniores quoque similes, sed obsoletius, sordidius picti. Aviculæ parvæ: pleraque inter aves omnium minimas numerandæ. Scandunt in arboribus "ut Pici" (Pr. Max. Beytr.; Jerdon; Verreaux), vel potius ut Sittæ, quibus cauda non est auxilio. Habitant in partibus tropicis utriusque orbis.

I:o. Species americanæ.

Tribus I. PICUMNI ENORMES

ceteris maiores, virescentes, rectricibus fuscescentibus, unicoloribus. — Pileus in sp. cognita flavus, rubrotinctus, non albopunctatus. Alæ et proportio remigum ut in Tribu sequente; sed primariæ paullo breviores: vix cubitales posteriores excedentes. Rostrum et pedes ut in sp. typicis formatæ.

1. PICUMNUS *micromegas* n. superne laete fuscoviridis, immaculatus; subtus totus flavidо-albidus, striolis virentifuscis, longitudinalibus, apice paullum dilatatis, pictus. Frons flava; vertex flavorubidus; occiput colore dorsi paullo flavidius. Remiges fuscae, extus fulvescentivirides, intus laete fulvae. Rectrices supra subtusque viridifuscæ absque pictura pallida. Rostrum et pedes cinerascentes.

Gigas inter nanos: magnitudine fere Passeris. Longitudo totalis circiter 140 mm. Alæ 74; Caudæ 55; Rostr. a fr. 15; Tars. 18; dig. 3:us cum ungue 18.

Specimen unicum, mihi cognitum, aderat in collectione avium ditissima, in *Brasilia*, a cl. Freyreiss facta; quæ a Consule suecano

Westin in Rio Janeiro, circa annum 1817 acquisita, patriis museis dono data est. Avicula nuper descripta, ut videtur rarissima, hodie in museo stockholniensi asservatur. Magnitudine et colore subsimilis est Pico passerino Auct. vel icterocephalo, cuius pullus hornotinus interdum forte habitus esse potest, etsi forma rectricum longe differat. Alterum tamen specimeu in museis non inveni.

Tribus 2. PICUMNI NORMALES

pileo nigro punctis crebris discoloribus (præter sp. 24 jun.) ornato; rectricibus nigris, albidovittatis. *Mas* fronte verticeque rubromaculatis. — Sp. parvæ variegatae. Pileus, cum cervice, niger (r. fuscescens), in *femina* totus, in *mare* postice, punctis parvis rotundis, albis, guttatus; *maris*, antice, a rostro ultra medium, maculis apicalibus, oblongis, rubris, cerebrinæ ornatus. Rectrices purius nigrae; 2 mediae pogonio interno flavid-albo; laterales, utrinque 2, vitta externa obliqua, alba, (pogonio interno nigro, apicem versus albo; externo longius albo, ad apicem nigromarginato); 3:tia ad apicem plus minusve albomarginata. Ala sat convexa, pennis cubiti anticis ad $\frac{4}{5}$ circiter alæ, posteriores ad $\frac{7}{8}$ alæ extensis. Primariæ: 1 parva, sed tectricibus longior; 4—6 subæquales; 3 = 8; 2 brevior quam 10; 3—6 extus sinuatæ. Digi 4.

a) Sp. *rufiventres*: gastræ rufo, immaculato. — Sp. a typicis, picturâ capitis, paullo magis discedentes; ceterum vero differentias non observavi. Neque elucet cur, nuper, hæ sp., potius quam subdivisiones sequentes, ut genus distinctum a reliquis separantur; characteres enim, sive ratio separandi, pro usu hodierno, minus probando, etsi auctori commodo, nulla exposita est. *Craugiscus* Mus. Hein. IV, 2, pag. 10, typo P. cinnam.

2. PICUMNUS *rufiventer* superne fuscescens, subtus totus lœte rufus, immaculatus. — Pileus (*maris?*) niger, rubromaculatus (punctis occipitis nullis albis?). Cauda albovittata (Bp. Malh.). — *Asthenurus rufiventris* Bp. Z. Proc. 1837, 120; — Malh. Pic. II, 283, t. 118, f. 2.

Avis junior? superne virentifuscus; subtus totus, cum lateribus capitis collique, sordide rufo-fulvus; corpore immaculato. Pileus fuscus, maculis frontis verticisque rotundis, fulvescentibus, striolisque ad latera occipitis paucis, ejusdem coloris. Rectrices, solito modo, nigrae, albo-vittatae. Ala 58 mm. Rostrum et pedes, pro corpore, solito majorés; dig. 4:us 21 mm. (Unicum specimen vidi in Mus Paris. non ab auctt. citt. descriptum).

Habitat in *Brasilia occidentali*, edita, Peruviae finitima.

3. PICUMNUS *cinnamomeus* supra subtusque lœte rufus, immaculatus, fronte lorisque albidis. — Pileus niger; *maris* totus flavoguttatus, *feminæ* antice immaculatus, postice alboguttatus. Frons, cum loris, alba plumis ut in plerisque sp. rigidulis, erectis, setulosis, apicibus setarum

nigris. Alæ nigrofuscæ, tectricibus rufolimbatis; remigibus cubiti latius fulvogriseo-marginatis. Cauda ut in sp. typicis pista. Ala 55 mm. (Mus. Brem. Lugdun. Berol.). — *Junior* similis adultis, obscurius pictus, pileo fusco, postice maculis majoribus, fulvoalbidis, indefinitis picto (M. Berol.). — *Columbia*; *Carthagena*. — *P. cinnamomeus* Wagler, Isis 1829, 646; — Lafr.; — Malh. II, 277, t. 119; — *Craug. cinn.* Mus. Hein. 10.

b) Sp. *guttatae*: gastræo rufo vel nigro, alboguttato.

3. *PICUMNUS ocellatus* supra subtusque rufofuscus, alboguttatus. Guttæ corporis minus pure albæ, sed majores, quam pilei (diam. $1\frac{1}{2}$ mm); singulæ in summo apice eujusque plumæ sitæ; rotundæ, cum puncto nigro, antice adnexo et, in plerisque, margine tenuissimo nigrofusco (s. iride ocelli) cinetæ. In gula crebriores sunt guttæ; in lateribus capitis minores, oblongæ, quasi striolæ albæ; in abdomine sensim latiores et minus evidentes; in dorso pauciores. Alarum tectrices minores apice gutta ejusmodi ornatae: Remiges nigrantes; cubitales extus pallescenti limbatae. Tectrices majores distincte, pallide griseo marginatae. Pileus, cauda, proportio remigum, v. in descr. generali (Trib 2). ♂♀ 4 pollicares; Ala 52 mm; c. 31; r. fr. 13; tars. 13.

Junior guttis majoribus, indefinitis; dorsi obsoletis; ventris latissimis, fuscescentibus, interjectis lineolis transversis, nigrofuscis. In *femina* jun. pileus niger, postice tantum, guttulis oblongis, albis, pictus, ceterum immaculatus.

Habitat in *Brasilia* (plures e *Bahia* accepimus).

Picus pygmæus Licht. Verz. 1823, 12; — *Picumn. pygm.* Lafr. 1845; — Malh. tab. 105; — Mus. Hein. 23. — *Picumn. ocellatus* Wagler Isis 1829, 646; — Malh. II, 280. — (Obs. H. l. nomen recentius, aptum et facilius in memoria tenendi, pro antiquiore, minus apto, omni jure anteponendum censeo. Nomina *pygmæus*, *exilis*, *minutus*, pro pluribus sp. usurpata, facilius confunduntur).

5. *PICUMNUS asterias* n. superne fuscus, subtus, a rostro ad anum, niger, crebre alboguttatus. — Similis praecedenti, sed gastræum nigrum, guttis rotundis, majoribus crebrius maculatum. Maculæ dorsi quoque majores, sed pauciores; in *femina* (*juniore?*) parum distinctæ. Hypochondria et crissum nigra, albofasciata. Pileus, rostrum etc. ut praecedentis. Ala 50 mm. — *Brasilia* (Mus. Leydense, ubi, ante 1864, signatus *P. lichtensteinii*; sed *P. licht.* Lafr. conf. sub sp. 9).

c) Sp. *fasciiventres*

s. typicæ: gastræo (saltem antico) albido, nigrofasciato.

6. *PICUMNUS ruficollis* griseofuseus, subtus albo nigroque fasciatus, cervice, cum lateribus capitis collique, lorisque, dilute rufis. — Simillimus sequenti; differt colore colli rufo, rostroque paullo minore. Pileus, pro vario sexu; et cauda ut in reliquis. Dorsum senioris immaculatum; junioris? maculis pallescentibus, transversis, fere obsoletis. Pennæ cubiti extus sordidius, intus lætius fulvolimbatae. Fasciæ ventris et juguli ut in sequente; gula cinerascens, vix fasciata. Ala 54 mm. c. 33. — *Brasilia* (Mus. Stockh., Berol.).

P. minutus Licht. Verz. p. 11 (nec Linn.); — *P. exilis* Temm. Pl. Col. 371, 2 (nec Licht.); — Wagl. l. c. — Malh. t. 116 fig. 3, 4, et t. 120, 3; — *P. ruficollis* Wagl. Mus. Berol. — *P. temminckii* Lafr. Rev. Zool. 1845, 6; — Mus. Hein. 21. — (De nomine conf. obs. sub *P. ocellato*).

7. PICUMNUS *cirratus* superne fuscogriseus, subtus totus albus, nigro fasciatus, fasciis albis nigrisque subaequalibus. — *Mas.* Pileus pure niger, antice rubromaculatus (cf. deser. Tribus 2), postice et lateribus punctis pure albis, parvis (latit. $\frac{1}{2}$ —fere 1 millim.) guttatus. Lora fulvescentialba, plumis subrigidis, setulis nigris terminatis. Regio postocularis (auris) fusca, pallidius fasciata et pallidius cineta. R. malaris (in mare perfecto) plumulis albidis, fuscomarginatis, qs. guttata. Dorsum cum uropygio crebre, sed obsolete, fusco pallidiusque fasciatum. Gastræum sordide album, non flavescentia; usque ad caudam transversim nigrostriatum: pluma singula basi fasciisque (in jugulo 1 dein 2, ad latera ventris 3) nigris, limbo apicis albo. Fasciae 3 nigrae cum interjectis albis, in ventre 8 mm, in jugulo 6 v. 5, implet; albæ paullulo latiores quam nigrae. Fasciae in gula tenues, obsoletæ. Alæ extus dorso fere concolores; tectrices apice pallidiusculæ; pennæ cubiti extus pallide griseolimbatae; omnes intus fulvoalbidæ. Rectrices nigrae, albo-vittatae (v. deser. Tribus 2:dæ). Rostrum nigrofuscum, subtus, basi, longius pallescens; Pedes fusci. Longit. tot. 4 pollicaris; rostr. fr. 13; ala 54; c. 35; t. 15; dig. m. c. u. 17.

Femina similis mari, sed pileo toto albopunctato. Gula et regio malaris tenuius nigrovaria; macula postocularis fuscior, ad latera collis guttis pluribus, albidis cineta. Mare vix minor: ala 53 mm. c. 34.

Habitat in *Brasilia*; in parte meridionali frequens (M. Stockh.).

Picumnus cirratus Temm. Pl. Col. 371, 1; — Mus. Hein. 19; — *P. minutissimus* Pr. Max. Beytr. IV, 378 (nec Pall. ex Gm.). — *P. minutus* Wagl. Isis 1829, 645; — (et Licht Verz. 1823, cum sp. præced. confusus); — *P. cayennensis* Lafr. R. Zool. 1845, 6; — Malh. Pic. tab. 120; 1, 2. — "P. temminckii" Malh. t. 116: 1, 2.

8. PICUMNUS *azaræ* simillimus præcedenti, sed major: ala 60 mm, c. 40; fasciis ventris nigris multo angustioribus quam interjectis, albis. — *Femina* sola cognita: pileo omnibusque partibus ut in femina præcedentis pictis. Color dorsi forte paullo pallidior, sed eodem modo undulatus. Fasciae gastræi nigrae angustiores, albæ latiores; sed spatium vix minus implet Lora et regio auris ut in præcedente, ambitu hujus latius albido. Gula et regio malaris ut in femina præcedentis, vix variegata. Rostrum et pedes paullo graciliores quam præcedentis — *Brasilia merid.* (Mus. Berol.; unicum specimen). Forte etiam Paraguay?

P. azaræ Mus. Hein. 20; — (idem habetur ac. Az. n:o 260 = *Yunx minuta* Vieill. Enc. 1500, ex Az.).

9. PICUMNUS *minutus* superne virens, fuscomaculatus. subtus flavus, nigrofasciatus. — Caput, pro sexu, ut in *P. cirrato* pictum. Lora fulvescenti alba. Regio auris fuscescens, pallidifasciata. Dorsi plumæ fuscae, radiis flavidis fimbriate maculisque scapi 2, fuscis ornatae. Hæ maculæ in senioribus latiores, transversæ vel subcordatae, absque guttis

flavis; in junioribus minores, oblongæ, cum punctis 2 viridiflavis, paullo minoribus, alternae: altera intermedia, altera apicis. (Singula igitur pluma dorsi, in juniore; maculis 2 nigricantibus et 2 flavidis, secundum scapum, ornata). Maculae dorsi flavidæ minores quam maculae tectricum albæ. Plumæ gastræi flavoalbidæ, fasciis 2 v. 3 nigris, apiceque flavofimbriatae, unde venter flavidus appetet. Fasciæ nigrae gutturis infiniti et pectoris antici integræ, paullo angustiores quam fasciæ flavæ; 3 spatium 5 mm occupant. In ventre medio et posteriore, praesertim in femina, fasciæ interruptæ et in maculas transversas abbreviatae. Gula vero sordide albida, non flava, vix vel parum nigrovaria. Regio malaris albida, fuscocinereo fasciata. Alæ extus dilutius fuscæ. Macula in apice tectricum alba, major ($1\frac{1}{2}$ mm lata); rotundata, transversa, tenuissime nigromarginata et, antice, macula majore, nigra, semicincta. Maculae tectricum anticorum multo minores. Remiges intus fulvescenti albo limbatæ; cubitales extus latius flavidofimbriatae, et, ad apicem, definitius albidomarginatae. Rectrices ut in reliquis pictæ. Rostrum et pedes ut praecedentium. Sp., cum sequenti, minima inter cognitas: Long. $3\frac{1}{2}$ poll. (80—90 mm); ala 48, c. 24; tars. $12\frac{1}{2}$ mm. — Femina paullo minor: ala circa 46 mm. — Habitat in Guyana et Brasilia septemtr. (Bahia; Mus. Stockh.; specim. multa).

Motacilla minuta L. S. N. X, 189 (ex Mus. Ad. Fr.); — *Pipra minuta* L. Mus. Ad. Fr. II, 34; — et Syst. Nat. XII, 340; — Gm. 1003, et Lath., *Pipra* sp. 12. (Deinde haec sp. diu non deser.). — *Picus exilis* Licht. Verz. 1823, p. 11; — Lafr. I. c. (Picumn.); — Mus. Hein. 21; — *P. cirratus* Wagl. I. c. (nec Temm.); — *P. lichtensteinii* Lafr. I. c. — *P. hypoxanthus* R:beh. Handb. 344, fig. 4112—13 (senior); — Malh. II, 294, t. 119: 1, 2; — *P. guttatus* R:beh I. c. (junior); — Malh. tab. 116: 5, 6 (*P. buffoni*, maculis dorsi nimis definitis).

10. *PICUMNUS buffoni* superne fuscovirens, maculis majoribus, definitis, albidis guttatis; subtus totus virentialbidus, regulariter nigrofasciatus. — Similis *P. minuto*, a quo praecipue picturæ dorsi differt. Maculae dorsi albidæ; ut in praecedenti: 2 cujusque plumæ, altera in medio, altera in apice scapi sitæ; longitudinaliter ovales, 2 mm longæ; antice posticeque latius, ad latera tenue fuscescenti-cinctæ. Haec maculae in femina sordidius albidae. Maculae tectricum tantum apicales, albæ, definite nigrocinctæ, dorsalibus minores (vel non maiores); quædam, in teetr. minoribus, angustæ, 2—3 mm longæ, striolas albidas exhibentes. Fasciæ ventrales minus, quam praecedentis, interruptæ. Pileus utriusque sexus, alæ, cauda, ut in praecedenti. — *P. minuto* fere minor, ideoque minima sp. cognita: ala circiter 45—46 mm. *Cayenne* (Mus. Lugd.; Britann.).

Petit Pic de Cayenne Pl. Enl. 786: 1 (fig. a Gm. Lath., Vieill. ad Lyngem minutissimam citata); — *P. buffoni* Lafr. R. Z. 1845, 6; — Mus. Hein. 23. — (Obs. Icon Malh. t. 119, 3, *P. guttatus* appellatus, forte hujus femina? — Lafr. I. c. p. 9, eam formam, quam nos pro *P. minuto*, seniore descripsimus (maculis dorsi fuscis, nullis flavis), ad *P. buffoni* trahit).

11? *PICUMNUS lafresnayi* J. Verr. Malh. II, 282, t. 118: 4, 5; — superne virentifuscus, leviter fuscoundulatus (vel maculatus); subtus

totus albidus, lunulis maculisve fuscis interrupte fasciatus. Pileus fuscus, alboguttatus et, in *mare*, antice rubromaculatus. Alarum tectrices fulvescentes; pennæ cubiti pallidius limbatae. (Rectrices nigrae et albae; an solito modo?). Magnitudo in hoc genere media videtur. (Ex icono Malherbii; descriptio enim manca et evidenter incorrecta). Patria: *Ecuador*. — Haec sp. duabus praecedentibus et imprimis P. minuto affinis videtur, sed incerta, a me non visa.

12. *PICUMNUS pumilus* Mus. Hein. 16; — superne virentifuscus, dorso tectricibusque immaculatis; subtus totus albidus, fasciis nigris, tenuibus, latius distantibus, regularibus pictus. — Remiges fuscæ, extus plus minusve virentilimbatae. Latera capitis albido fuscoque varia. Pileus *feminae* jun:s fuscus, albopunctatus (senior et *mas* ignoti). Rectrices ut in omn. Ala (2 poll. germ. ==) 52 mm. *Patria* ignota (Mus. Hein. — Sp. mihi ignota; similis praecedentibus videtur).

13. *PICUMNUS orbignyanus* fuscogriseus, subtus sordide albus, nigrofasciatus, immixtis maculis rotundis, albis, nigrocinctis. — *Mas* similis P. cirrato; color generalis ejus. Dorsum tamen non transversim undulatum, sed maculis plumarum apicis, rotundatis, subpallidis, parum conspicuis, saltem antice, parce notatum, et tectrices alarum tenuius pallescentimarginatae. Plumæ juguli pectorisque anterioris basi fuscæ; dein fasciis 2 albis, fascia intermedia nigra separatis, et præterea: macula apicis angustioris, rotundata, alba, latius nigrocineta, ornatae. Haec macula alba, in plumis juguli, cum fascia alba, media, conjuncta et apice tenue nigromarginata; in pectore anteriore, colore nigro a fasciis mediis separata, et vix fuscomarginata. In pectore posteriore et abdomine, macula apicis, dilatata, evanescit, et, nigredo ejus' anterior maculam transversam, vel fasciam abbreviatam exhibet. Pileus, lora, latera capitis c. regione mali, gula, rostrum et remiges ut in P. cirrato. (Cauda similis caudæ illius videtur; sed rectrices 2 mediæ in specim. nostro desunt). Ala 53 mm. — *Brasilia*. (*Mas*, ex coll. supra, sp. 1, memorata, Freyreisio-Westiniana, in Mus. Stockh. asservatus; alium, etiam ex *Brasilia*, in M. Paris. vidi. *Femina* mihi ignota).

P. d'Orbignyanus Lafr. R. Zool. 1845, p. 7 (?) ex descr. mala, in Mus. Hein. p. 15 verbotim translata, nil certi concludi potest. Specimen in itinere Orbignyi, loco incerto inventum. — Haec sp., ut plures hujus generis, a Malh. confuse exposita. — Nomen, in nomenclatura latina, *orbignyanus*, vel *dorbignyanus*, scribendum censemus).

14. *PICUMNUS spilogaster* n. superne griseus, subtus albidus, gutture toto (c. parte infima) regulariter nigrofasciato, ventre longitudinaliter nigromaculato. — Similis P. cirrato, sed major. Fasciae gutturis totius ut in P. cirrato formatæ, non terminales, sed paullo angustiores. Plumæ pectoris (s. ventris anterioris) albidæ, nec flavidæ, basi maculaque minore, cordato-oblonga, pone apicem sita, nigricantibus. Maculae istæ, anteriores, in femina, striæ scapi nigræ, cum basi plumæ conjunctæ; posteriores liberae. Hypochondria parum maculata. — Caput, pro sexu, alæ, cauda, ut in P. cirrato pieta. Lora albida, minus nigrosetulosa. Dorsi plumæ non pallescenti undulatæ, sed macula apicis obsoletiore, pallescente, terminatæ. Gula feminæ, ut in sp. affinibus, vix nigrovaria.

Ala 56 mm, c. 28; femina: ala 56, c. 32. — *Guyana* (Mas. et femina, Mus. Berol.).

P. minutus Mus. Hein. p. 17 (minime vero Pipra minuta Linn.); — (*P. minutus* Cab. Schomb. Reise III, 714, non descriptus; forte alias?).

Obs. Hæc sp. ex mera conjectura, in Mus. Heineano l. c., eadem habetur ac *P. minutus* (L.), sed falso; descriptio enim Linnæi omnem dubitationem de sp. descripta tollit (conf. sp. 9 nostram, *P. minutum*). — Potius vero idem esse posset ac *Iynx minutissima* etc. auctorum subsequentium, qui avem tantum ex descriptione Brissonii novisse videntur. Quod tamen, ex eo, minus probabile fit, quod Brisson, descriptor attenus et curiosus, fascias nullas gutturus pectoris memorat, sed gastræum totum, a gula ad anum, plumis albidis, fuscomarginatis vestitum, rectricesque fuscas, neque nigras, dorsum vero rufescemt dicit. Potius igitur sp. quandam e subdiv. sequenti descriptsse videtur. Synonymia aviculæ Brissonianæ hæc erit:

Picus cayanensis minor Brisson, IV, 83, sp. 32 (fig. 0. Long. 3½ poll. gall. = 88 mm). — *Yunx minutissima* Gm. 423 (descr. ex Lath. Gen. Syn. I, 596, sp. 48, ubi deser. tantum ex Briss. c. add. ex Firmin. Nomen vero ex Pallas; v. mox infra); — Vieill. Enc. 1299 (descr. ex Briss.); — *Picus minutus* Lath. sp. 55 (ex Gen. Syn.); — *Picumnus cayanensis* Lafr. R. Z. 1845, 6 (Synonymia absq. deser.; sed *P. cay.*, ibid. p. 8 descriptus, *P. cirratus* videtur).

His omnibus accedit *Picus minutissimus* Pall. n. Nord. Beytr. III, 5; t. 1 fig. 2; ubi icon aviculam avi Brissonianæ affinem ostendit. Descriptio vero: "maculis dorsi albidis, colore generali rufescente etc." exhibet nostrum *P. squamiferum* (sp. 17) vel sp. ei affinem. Nomen vero *P. minutissimus*" male tribuitur huic sp., inter majores generis numerandæ. Novum igitur supposui.

Yunx minutissima Vieill. Gal. t. 23 videtur *P. buffoni*. — *Y. minuta* Vieill. Enc. 1300, unice ex Az. 260, forte = *P. azarae* (v. supra sp. 8).

d) Sp. *squamosæ*:

plumis gastræi (saltem anterioris) sub-parabolicis, firmioribus, pallidis, margine definitiore, plerumque nigro, insignibus.

15. PICUMNUS *guttifer* n. *Mas* superne griseofuscus, maculis dorsi rotundatis, albis, subfuscocomarginatis, (diam. fere 2 mm), cum puncto majusculo, nigro, antice adnexo; una in apice singulæ plumæ. Maculae ejusmodi in tectricibus alarum multo minores, oblongæ, nigromarginatae. Latera capitis et colli nigrofusca, albomaculata. Gastræum antice nigricans maculis crebris, rotundatis, suboblongis, albis, tenui nigrocinetis; unica, terminali, cujusque plumæ. In gutture inferiore accedunt fasciae albæ, una vel duæ, cujusque plumæ, plus minusve interruptæ. In pectore antico fasciae maculæque sensim mutantur. Plumæ ventris albæ, margine tenuissimo nigro, maculaque media longa, nigra, apice subacuta, basi latiore, sagittata et cum basi plumæ fusca conjuncta, instructæ. Plumæ gastræi apicem versus angustæ, attenuatæ. — Pileus pure niger, antice rubromaculatus, postice albopunctatus. Remiges primariae vix pallidimarginatae; cubitales posteriores extus pallide griseolimbatae. Cauda nigra, albovittata. Rostrum nigricans, infra pallescens.

Pedes cinerascentes. Major: ala 58 mm. Picturā similis *P. orbignyano*. — Ex *Brasilia* interiore media; (Prov. Goyaz; unde mas, in Mus. Paris., a Castelnau et Deville 1846 oblatus, exstat).

16. *PICUMNUS lepidotus* Mus. Hein. p. 14; — *Mas superne fuscus*, plumis dorsi macula apicis majore (lat. 2 mm) subsordide alba, rotundata, subdefinita sed non marginata, cum puncto majusculo, nigro, antice adnexo, ornatis. Alae obscurius fuscae; tectrices vix nisi puncto apicis parvo, pallescente, maculatae; remiges cubiti latius griseoalbido limbatae. Plumae gastrae parabolicæ, sordide albæ, nigromarginatae; gulae cinerascentes, margine obsoletiore; juguli pectorisque anterioris definitius pictæ, basi cinereæ cum arcu sublibero, sed obtecto, nigro, medio acuminato et, posterius, striolam nigrum emittente. Plumæ ventris posterioris levissime rufesceni-lavatae, obtusiores, margine apicis latius fuscomarginatae, basi fuscae absque areu. — Pileus *maris* pure niger, solito modo rubro alboque pictus. Regio postocularis fusca, parcus pallidipunctata; r. malaris creberrime albido guttata. Uropygium pallide fulvescens, obsoletius fusco, maculatim fasciatum. Rectrices, rostrum, pedes, solito modo picta. Ala 54 mm. c. 30. — *Mas e Surinamo*, (Mus. Stockh.) a cl. BARNET LYON, 1860 donatus.

Femina, e *Brasilia*. (Mus. Lugdun. sign. P. temminckii) maculis dorsi albidis, paullo diffusioribus quam maris, cum puncto nigro, antico, in albedine fere inclusa. Plumæ gastræ basi fuscae, limite definito nigro, medio acuminato (areus enim niger, multo minor quam in mare, a fuscedine non distinctus). Venter posterior paullo fortius rufescen-tinctus. Pileus solito modo differt.

17. *PICUMNUS squamifer* n. Mas dorso rufescensculo, maculis apicalibus minoribus, pallide fulvescentibus, antice nigrolimitatis, ceterum indefinitis. Uropygium dorso concolor, immaculatum. Alæ nigriores, tectricibus immaculatis, remigibus cubiti extus fulvolimbatis. Plumæ gastræ anterioris fulvoalbidæ, nigromarginatae, basi fuscae, areu nigro, lineolam emittente, ut in præcedente notatae; gulae sordidiores, margine nigricante minus distincto; ventris posterioris fortius rufolavatae, obtusæ, molles, indistinctius fuscomarginatae; laterales striola media nigra signatae. — Pileus *maris* solito modo pulcherrime pictus. Lora fulvescentia, nigrosetulosa; regio postocularis fusca, pallidius fasciata; malaris fulvoalbidoguttata. Rectrices nigrae solito modo albovittatae. Rostrum nigricans, basi inferiore pallescente. Ala 55 mm. c. 30. — *Mas e Surinamo*, Mus. Stockh., -cum sp. præcedente acceptus. *Femina* mihi ignota.

18. *PICUMNUS squamulatus* plumis dorsi dilutius fuscis, nigromarginatis et intra marginem latius, pallidius fulvescentibus. Gastræo albo, plumis nigromarginatis. — Senior: Pileus solito modo, pro sexu, pictus. Lateræ capitis fusca, albidiomaculata. Plumæ dorsi dilute fuscae, apicem versus obscurius fulvae, margineque latiore (fere 1 mm), nigro, cinctæ. Pars igitur fulva maculam magnam, arcuatam, intramarginalem, exhibet. Alarum tectrices minores ut plumæ dorsi pictæ; majores extus, nec apice, fulvescentes; primariae tote nigrofuscae. Remiges primariae nigrae, extus vix pallidius marginatae; cubitales sordide virentialbido-

limbatæ. Plumæ gulæ sordidiores, minus nigromarginatae; gutturis pectorisque latius parabolicæ, fere albæ, margine latius (fere 1 mm) nigræ, basi areu obiecto nigro, fere ut præcedentium, notatae. Rectrices nigræ, solito modo albopictæ. Rostrum ut in plerisque. Ala maris 57, feminæ 55 mm. e. 29.

Junior pallidior, paullo minor (ala: m. 55, f. 52; e. 28), totus pallidior, pileo minus pure nigro (sed, ut in senioribus, pro sexu differt). Margo niger plumarum gastræi multo angustior; maxilla inferior basi latius albida. — In femina seniore et in mare juniore (sub mutatione plumarum) occiput griseofuscum punctis impure albis guttatum.

Seniores et juniores ex *Caracas*, ubi freqvens videtur. (Mus. Stockh.).

P. squamulatus Lafr. R. Z. 1854, 208; — Malh. II, 282, t. 117; — Mus. Hein. p. 14.

19? *PICUMNUS albosquamatus* superne fuscescens, (dorso immaculato?); tectricibus alarum fulvescenti marginatis; subtus fulvoalbidus, ventre immaculato; plumis gutturis totius albis, nigromarginatis. — Pileus, secundum sexus, et cauda solito modo pictæ; remiges cubiti extus subvirenti-griseolimbatae. — Femina gula parum nigrovaria; crissum nigrovarium. Ala 54 mm. — *Bolivia, Peru*, a jugo alpino ad orientem, inter 10—20° lat. (avem non vidi).

P. albosquamatus Lafr. in d'Orb. Voy. IV; — Lafr. Rev. Zool. 1845, 7; — Malh. II, 283, t. 115; — R:bch Handb. 345 (e. ic.); — Mus. Hein. p. 13 (plumis gutturis perverse descriptis, ex Tschudi fn. Per. 264).

20. *PICUMNUS sagittatus* n. Femina: superne fuscogrisea, plumis dorsi macula parva (1—1½ mm), oblonga, pure alba, cum puncto nigro antice adnexo, apice ornatis. Gastræum sordide album (non flavidum), nigrosignatum; plumis gulæ tenue fuscomarginatis (margine ad latera latiore, sed vix ½ mm). Plumæ gutturis, totius reliqui, litura media, late V-formi, vel sagittata, nigra, margineque sub-definito, sed tenuissimo, fuso. In plumis ventris (pectoris—crissi) lituræ nigræ in striolas medias, subsagittatas contractæ, et margo nullus fucus. — Pileus pure niger, albopunctatus. Alæ fuscæ; tectrices minores punctis albis, ut plumæ dorsales, sed multo minoribus, nigrocinctis, ornatae. Remiges cubiti parum pallidius limbatae. Cauda, rostrum, pedes ut in reliquis. Ala 55 mm. — Ex *Rio tocantin Brasilie*, Mus. Paris. — Mas ignotus.

Hæc sp., inter sectionem hanc et sequentem media, præsertim affinis sp. 16, 17: plumis forma definitis, subparabolicis; sed ob plumas gastræi non vel vix nigromarginatas, lituraque media, nigra, non obiecta, præditas, sat similis sp. sequentibus.

e) Sp. *nebulosæ*,
gastræo pallescente, plumis latioribus, mollissime sericeis, non marginatis, immaculatis vel maculis mediis, indefinitis, notatis.

21. *PICUMNUS nebulosus* n. Femina: dorso fuscorufescente, immaculato, uropygiø concolore; gastræo fulvo (s. pallide rufescente), ad latera maculis magnis, longitudinalibus, rufofuscis, indeterminatis; ventre medio pallidiore (fulvo-albido), maeulis nigrioribus vario. Plumæ gulæ

molles, latæ, laceræ, nigræ, late cinereoalbido limbatæ. — Pileus obscure fuscus (nec niger; an juv.?) punctis majoribus, albis guttatus. Latera capitis nigra, albomaculata. Alæ obscurius fuscæ; margine tectorum vix, remigum primariarum non pallescente, cubitalium latiore, lète fulvescente. Rectrices nigræ, albovittatae, ut in reliquis. Rostrum nigricans, basi vix pallescens. Iris, sec. schedulam affixam, fusca. Ala 59 mm. c. 37. — Patria *America merid.* loco ignoto (Mus. Sthm. Specimen unicum, a:o 1842, Hamburgi emtum).

22. PICUMNUS *olivaceus* dorso fuscoviridi, immaculato, (uropygio vix discolori); plumis gulæ sordide albidis, tenue fuscomarginatis; gutturis inferioris, colore fere dorsi, sordide griseovirentibus, immaculatis; ventris flavoalbidis, vittis mediis indefinitis; fuscescentibus. — Pileus cum cervice, pro sexu, et rectrices, solido modo pictæ. Alarum tectrices virentifuscæ, parum pallidius marginatæ. Remiges nigræ; primariae extus vix nisi tenuissime, cubitales late, pallide subvirentilimbatae. Rostrum totum nigricans. Ala 57 mm. C. 30. — Hab. in *Columbia* s. N. *Granada*; (Bogota, Mus. Stockh. et fere omnium).

♂ juv. pileo ante flavidо-, postice albo- punctato (Mus. Lugdun.). — ♀ juv. (M. Berol.) pileo nigrofusco, punctis inaequalibus, sordide albidis; gutture inferiore fuscescenti pallidoque mixto.

P. olivaceus Lafr. 1845, l. c.; — R:ch l. c. 788; — Malh. tab. 120; — Mus. Hein. p. 11.

23. PICUMNUS *granadensis* dorso subvirentigriseo uropygioque flavoalbido, immaculatis; gastræo sordide flavescentialbido, ante sordidore, immaculato; ventre pallidore, maculis longitudinalibus, indeterminatis, fuscescentibus striato. — Pileus *maris niger*, ante aurantiaco-flavidomaculatus, postice albopunctatus (Mus. Hein.; an juv.); *feminae* totus albopunctatus; *juvenis* fuscus, sordide albidoguttatus (Lafr.). Remiges fuscæ; cubitales late, pallide virentigriseolimbatae. Rectrices pictura solita ornatae. Rostrum et pedes nigri. Praecedenti similis, sed minus flavidus et virens, potius grisescens. Long. tot. 90 mm (Lafr. et M. Hein.); ala 52 (M. H.). — *Nova Granada* Lafr., *Ecuador* M. Hein. (Mihi ignotus).

P. granadensis Lafr. R. Zool. 1847, 78; — Malh. tab. 118: 3; — Mus. Hein. p. 12.

24. PICUMNUS *castelnauii* (?) superne fuscovires, obsolete undulatus, (cervice distinctius undulata). Gastræum totum sordide album, flavidio (nec rufescens) lavatum, immaculatum. Alarum tectrices fuscescentes, vix pallidius marginatæ. Pennæ cubiti extus pallide griseovirentifimbriatae. Cauda nigra, albovittata. Rostrum superne et apice fuscum, lateribus albidum. Pedes cinerascentes. Magnitudo *P. olivacei*. *Femina juv.* (?) pileo toto nigro, immaculato. (Mus. Paris., ubi in schedula affixa: "Sarayacu 25 Oct. 1846" legitur. — Sarayacu est urbs Peruviae orientalis, ad fl. Ucayale, $7\frac{1}{2}$ ° lat. merid.). — Haec sp. sat affinis videtur sp. indicæ, proxime sequenti.

Specimen unicum descriptum Parisiis (sept. 1864) inveni, quod, præter picturam pilei, cum iconibus, infra citatis Malherbei, non vero cum descriptione ejus convenit, et ex codem loco allatum est. Ætate tantum

differre videtur. Specimina duo alia, a Malherbio, in Mus. Paris. descripta, non vidi, quare ex iconibus ejus hæc affero:

Mas; pileo rubromaculato, postice nigro, vix maculato; reliqua quodammodo cum deser. supra data convenient. Malh. tab. 117 fig. 1. — (In descriptione, II, 281, pileus fuscovirens, punctis rufis, quadri- fariis, ornatus dicitur. Gastræum totum rufescens describitur. quod forte permutatione quadam adnotationum oriri videtur). Hic e *Sarayacou Americæ* merid: a Castelnau et Deville allatus dicitur.

Mas junior (s. *femina*)? pileo fuscovirente, punctis albis, immixtis rufis, ornato; ibid. t. 117 fig. 2 (non describitur; icona forte mendosa?).

2:o. Species Veteris Orbis.

Tribus 3. PICUMNI SUBNORMALES.

Sp. sola cognita simillima americanis ultimis descriptis. Rectrices ut in illis pictæ. Differt pileo non nigro, nec albopunctato, et vitta postoculari nigricante, longa, immaculata. Forma præcedentium: digiti 4. (Gen. *Vivia!* Hodgs. 1837; — *Pipicus* Mus. Hein. p. 9).

25. *PICUMNUS innominatus* dorso fuscoviridi-flavescente, immaculato, gastræo toto albido maculis rotundatis, nigris ornato. — Pileus colore dorsi paullo fuscior; *maris*, fronte (ante oculos) nigriore, rufo- maculata (vel, junioris, aureoflava, nigrofasciata, M. Hein.); *feminæ* unicolor. Alæ fusce pennis cubiti late flavovirenti limbatis. Vitta postocularis lata, secundum latera colli longius ducta, fusca, unicolor, superne linea postoculari, alba, subtus albedine latiore, limitata. Maculæ gastræi: in gutture superiore minores; in ventre posteriore transversæ. Cauda paullo fortior quam in americanis videtur, sed pictura ejus, nigra, albovittata, vix differt. Rostrum nigricans, basi, subtus, pallescens. Ala 55 mm. c. 28. — *Nepal* (In Museis pluribus visus).

P. innominatus Burton. Z. Pr. 1835, 154; — Malh. II, 278, t. 117: 5, 6; — Mus. Hein. 9 (*Pip. inn.*). — *Vivia nipalensis* Hodgs. 1837; — *Piculus nip.* et *rufifrons* id. serius.

Tribus 4. PICUMNI ABNORMES.

Tridactyli, cauda nigra, unicolore, vix breviore quam cauda præcedentium. Pileus non guttatus, posterius virens, fronte discolore. — Immaculati, subtus rufi. Orbita latius nuda quam præcedentium. Rostrum paullo fortius, compressius, culmine rotundato suturaque paullulum curvatis, carinis vix apparentibus. Nares plumis paucis, sed apice longo,

Conspectus Picorum.

setaceo insignibus, incomplete obtectæ. Proportio remigum ut in plerisque americanis. Ex *Malayasia*. — Gen. *Microcolaptes* Gray, List; Mus. Hein. — *Sasia!* Hodgs..

26. *PICUMNUS abnormis* superne virens, gastræo toto, cum lateribus capitis collique, et uropygio rufis; fronte *maris* antice flavescente, postice rufa, *feminæ* tota rufa. — Cervix leviter rufescens; vertex dorso vix fuscius. Venter paullo dilutius rufus, saepe medio flavescens. Remiges extus colore dorsi, vel paullo lætius, viridi-limbatæ; intus late albolumbatæ. Cauda tota nigra. Orbita late nuda, rubra. Maxilla superior fusca, inferior tota alba. Pedes albidi (in *viva* rubidi); unguis quoque albidi. Ala 52, 53 mm. Cauda 25. Hab. in *Java* (Mus. Lugdun. Britann. Berol.) *Malacca* (Mus. Stockh., M. Hein. Blyth.).

P. abnormis Temm. Pl. Col. 371, 3. — *Picumnoides!* abn. Malh. II, 286, t. 115 (pedibus tetradactylis, cauda albopicta!); — Mus. Hein. p. 8 (Micr. abn.).

27. *PICUMNUS ochraceus* lutescentirufus dorso alisque virenti fulvis; macula pone oculum elongata, albida; remigibus cubiti intus rufis. — Frons latius rufa et, ut præcedentis, in mare antice flavescens. Pileus posterior virens; cervix rufa. Uropygium fulvum Cauda tota nigra. Similis præcedenti; major: ala 57 mm. — (Orbita nuda, *in vivo* rosea; iris dilute brunnea Jerd.). — *Nepal, Assam — Arracan.*

Sasia ochracea Hodgs. J. As. Soc. V; — Jerdon Ind. I, 301; — Malh. 287 (fig. nulla); — *Micr. ochr.* Mus. Hein. p. 8; — *Sasia lacrymosa* Lafr. R. Z. 1854, 208; — Malh. 287 (absque icona).

Tribus 5. PICUMNI INNORMALES.

Tetradactyli, digito 4:to breviore quam tertio. Cauda brevissima: long. vix $\frac{1}{3}$ alæ æqualis, unicolor. Rostrum fortius, sat compressum, culmine rotundato, carinis nasalibus parum prominulis, sed late distantibus; apice acuto, neque compresso-cuneato! Orbita latissime nuda. Pileus non punctatus. Ala ut præcedentium constructa. — Sp. *Africana*. Gen. *Verreauxia!* Hartl. — *Nannopipo* Mus. Hein.

28. *PICUMNUS africanus* dorso alisque fusco-flavido-virentibus, capite fuscior. pileo immaculato. Subtus totus virenticinereus — Superficia tenuis, albida. Alæ fuscae, pennis cubiti virentilimbatis, tectricibus inferioribus pennisque intus pallescentibus. Cauda tota fusca. Orbita nuda, rubra; pedes pallescentes. *Mas* genus leviter rufolavatis; *feminæ* caput gastræo fere concolor. — Ala 51 mm; c. 15. — Ex *Gabon*, Africa occidentalis, sub æquatore; (Mus. Bremense).

Sasia africana Verreaux R. Z. 1855, 217; — *Verreauxia afr.* Hartl. W. Afr. 176; — *Nann. afr.* Mus. Hein. p. 9; — *Picumnus verreauxi* Malh. II, 284, t. 118.

Genus III. IYNX L.

Cauda mediocris: longitudinem $\frac{3}{4}$ alae paullum excedens; leviter rotundata, pennis 10 mollibus, latis, apice obtuse rotundatis. (Pennæ spuriæ ut in Picis accedunt).

Rostrum capite brevius, sat compressum, carinis nullis. Apex rectus, acutus, depressiusculus. Furca menti longius ante nares et ante medium suturam exit.

Nares magnæ: mesorhinio angusto; nudæ, valvulâ inferiore semiclausæ. Cutis enim glabra, coriacea, valvulam formans, e margine inferiore, nec ut in avibus plerisque, e superiore, exit.

Ala passerina: tectricibus brevibus; remige prima parva. Primariæ proportione variant. — Lingua ut in Pico formata, longissime extensilis. Digihi quoque illius generis, digito 4:to æquali tertio; sed unguis minores.

Magnitudo Passeris. Color cinereus, nigro albidoque irroratus et maculatus. Remiges extus intusque rufescens imaculatae, maculis marginalibus, rufescensibus, numerosis: fere 9; 10ma enim, apicalis, raro appareat. Cauda dorso concolor, fasciis nigris, angustis, numero variis. Pictura omni tempore anni eadem; neque pro sexu, vix pro ætate differt.

Habitant in orbe antiquo; desunt in America et Australia. Non scandunt.

Iynx L. Fn. Sv., Retz., Cuvier in Tabl. Elem., Blumenb., Illiger, Gloger. — Sp. europaea ab Aristotele *iv* §, a Zoologis recentioris ævi *Iynx* dicitur, sicuti persona mythologica, a quo avis, post antiquissima tempora, nomen habuit. Nomen igitur, ut monuit Gloger (Handb. 588, et . . .), *Iynx* scribendum, et *I-ynx* legendum. — Mature vero quidam, e. gr. Johnston, et post eum ipse Linnæus, in Syst. Nat., ed. 1748 et 58, lapsu, *Jynx* scripserunt. Deinde, in ed. 1766, *Yunx* scripsit, quam morem Gmelin, Latham et plerique recentiores, secuti sunt. Hodie, in Mus. Heineano, *Iunx* scribitur, nescio quo jure.

1. IYNX *torquilla* gutture pallido, transversim nigrostriato; remigibus 2—4 subæqualibus, ceteras excedentibus; prima spuria, tectricibus primariis multo breviore.

Cinerea, superne nigro albidoque irrorata et maculata; plumis multis ad apicem nigris, macula marginali albida, simplici vel duplice, ornatis. Vitta nigromaculata, ab occipite incipiens, in dorso antico

lator, in medio desinit. Vitta scapularis nigricans, albido-lunulata. Guttur albidum, transversim cerebre nigrostriatum, plerunque leviter fulvotinctum. Venter albus, maculis parvis sagittatis nigris. Crissum vix vel parum fulvolavatum, transversim nigrostriatum. Remiges primariae nigricantes, maculis utriusque marginis pallide rufis; 2:da æqualis 4:tæ, vel etiam 3:tiæ. Cubitales extus cinerascentes, irroratæ, utrinque maculis irroratis pictæ. Rectrices cinereæ, irroratæ, striis 5 transversis, flexuosis, et irroratis, nigris albidisque, (prima et secunda a teetricibus occultatis). Rostrum et pedes pallescentes. Iris fulvescens. Mensure partium in utroque sexu æquales et paullum variables; specimina majora non raro sunt feminina. R. ab ang. oris 17 mm; ala circiter 85 (88—82; penna cub. prima ad 63 exit); cauda circa 69; t. 18.

Avis migratoria. Habitat æstate in Europa fere tota (præter Hiberniam et regionem intra circulum polarem), Asia septentrionali et media, cum China et India septentrionali. Etiam in Egypto ætestatem totam degere fertur (Rüppell), quod voro ulteriore affirmatione eget. Potius in Numidia (Algier etc.) æstivare credi licet; sed, etsi aves, ihi inventas, bene enumeratas habemus, tempora anni, qvibus ibi inveniuntur, rarius relata sunt. — Hieme in Africa interiore et in India vivit. Etiam in Europa meridionali quedam hiemare dicuntur.

Specimina, pro patria (æstivali) diversa, paullum differunt:

a) Forma septentrionalis (in Suecia, usque ad lat. 63 v. 64°): pallidior, maculis ventris minimis, non transversis, plerunque triangularibus. *Mas* vetus, gutture paullo magis fulvotincto. Latera capitis albidiora, vitta pone oculos distincta, nigrofusca, superne late albidolimitata. Stria malaris evidens, sed antice imperfecta. — *Femina* gutture minus fulvotincto; pictura capitis laterali obsoletiore. — Specimina suecica, germanica, gallica, quæ comparavi, inter se simillima. Sp. japonicum, in Mus. Leydensi, a sp. germanico, nulla re differre visum est. Specimina ex "India, Bengalia, Bombay, Nil blanc", Mus. Paris., a nostratis non differunt: (Verisimiliter hiemales, ibi migrantes?).

b) Forma meridionalis, colore ubique paullo saturatiore, quam præcedentis, tincta, sed pictura vix differt nisi maculis ventris, in latitudinem ductis, lineolas transversas, undulatas, medio acuminatas, referentibus. Mensure speciminum, quæ ad manum sunt, vel descriptorum, eadem ac minorum nostratium: Ala 82—84 mm. Specimina vidi ex Dalmatia (M. Sthm), ex Italia, ex "China" (M. Leyd.), Amoy (Svhin. M. Berol.); India (M. Francof.).

Synonymia. *Lynx torqvilla* Linn. Fn. Sv. 1761, n:o 97; — *Yunx torqv.* Syst. Nat. — Gm. etc. (v. supra); — Temm. Man. I, 403; — Gloger Handb. 468 (*Lynx*); — Schlegel Fn. Jap. 75; — Malh. II, 289, t. 121 (*Yunx torq.*); — Jerdon Ind. I, 303; — Mus. Hein. p. 4 (*Iunx*). — *Y. japonica* Bp. Conspl. I, 112; — *Picus bynx*. Pall. Zoogr. I, 416. — Nomen Iyngis ab Aristotele usque derivari supra diximus; avem vero eandem esse, quæ *Glottis* ab eo vocatur, alio loco demonstravimus.

2. IYNX *indica* vitta gutturis media, longitudinali, rufocastanea, angusta, deorsum dilatata; lateribus gutturis genisque canis, creberrime transversim nigrostriolatis. Venter, cum crissu, albus, leviter fulvo-

tinetus, nigrostriolatus. Remigum maculae externae cinerascentes fulvolavatae (nec pure rufæ). Praeterea reliquis sp. similis videtur, quasi media inter sp. præcedentem et sequentem. Icones maculas dorsi alarumque parvas, fasciasque caudæ 7 v. 8 exhibit. Rostrum et pedes, ut prioris, pallescentes. Proportio remigum non descripta. Reliquis paullo major: ala (3 $\frac{3}{8}$ poll. Angl. =) 92 mm. — Habitat in terris ab India septentrionalibus versus sitis: *Afganistan, Tibet.* (Gould; Mh., Jerd. Mihi ignota).

Y. Indica Gould. Z. Proc. 1849, 112; — Malh. II, 292, t. 121; — Jerdon, Ind. I, 304.

3. IYNX *pectoralis* vitta gutturali lata, sursum angustata, rufocastanea, immaculata; ventre (cum pectore toto) albido, vix fulvescente, striis longitudinalibus pecto; crasso pallide rufescente, striolis sagittatis, nigris. — Latera colli capitisque dilute fusca, leviter nigrovaria; genæ vero cinereæ, lineolis nigris crebre fasciatæ. Maculae remigum rufæ. Penna prima tectricibus longior; 2 = 8 vel 7; 3—5 subæquales. Caudæ fasciæ 10, vel, in penna extima 9. Pictura notæi similis eidem J. torquillæ, sed paullo obscurior. Rostrum et pedes fusci. Iris fulvescens. R. ab ang. 18 mm; Ala 88; C. 73; T. 19. — Diff. *sexus* non appetet. — *Juvenis*, habitu primo, rostro penitusque nondum perfectis (Caffr. sup., 13 Aug.; J. Wahlberg) colore similis senioribus, vel paullo sordidius pictus, maculis dorsi nigris majoribus. Fasciæ caudæ ut in seniore.

Habitat in Africa meridionali orientali, sylvatica, a limite coloniæ capensis, usque ad tropicum a J. Wahlberg inventus. Is quoque in schedula, mari affixa, notavit: sonum vulgarem exakte similem esse sono J. torquillæ. Ibi non migrare videtur: specimina prope Port Natal Februario, — Junio, — 1 Oct. occisa.

Y. pectoralis Vigors, Z. Pr. 1831, 93; — Malh. II, 291, t. 121; — Mus. Hein. p. 6.

4. IYNX *æquatorialis* gutture toto cum pectore anteriore rufis, immaculatis. — Simillimus nuper descripto, preter colorem gutturis rufum, obscuriorem et latius, usque ad medium sternum, extensem. Crissum quoque saturatius rufum. Venter medius albidus, leviter rufescens-lavatus, nigrostriolatus. Reliqua pictura omnis similis præcedentis, colore tamen paullo intensiore. Proportio remigum ut in præcedente (vel 4:ta forte duas proximas paullo magis excedit. An semper ita?). Magnitudo præcedentis. (Unicum specimen in Mus. Francof. vidi). — Habitat in *Abyssinia* meridionali. Non migrat (Rüpp.).

J. æquatorialis Rüpp. Mus. Senk. III, 121; — et Syst. Üb. 93, t. 37; — Malh. II, 291, t. 121: — Mus. Hein. p. 5.

Nomina et Synonyma specialia Picorum.

exclusis Picumnis et Iyngibus.

abingoni A. Sm. == chrysurus b.		baccha R:bch == strictus.
abingtoni Bp. == smithii Malh.?	-	badius Raffl. 250.
— Malh. conf. P. benetti.		badiosus Temm. 251.
abnormis Hodgs. == shorei.		badioides Less == castaneus.
abyssinicus Vig.	no 129.	bairdii Sclater. 46 b.
adpersus Natt. == spilogaster		— Cassin (Campoph.) 2 b.
aeruginosus Licht. Malh.	199.	barbatus Gr. == occipitalis Vig.
aethiopicus Ehr == nubicus.		bashkirensis Ver. == major.
affinis Sw. Wagl.	109.	bengalensis L. 224.
— Raffl. == vittatus.		bennetti A. Sm. 186.
africanus J. E. Gray.	123 b.	biarmicus Cuv. == namaquus.
agilis Mus. Hein.	117.	bicolor Gm. Mh. == mixtus.
agricola Malh.	215.	— Sw. == dominicanus.
albifrenatus R:bch == pollens.		blanfordi Bl. Jerd. v. obs. sub P. mahrat-
albertuli Bp. == sanguineus.		tensi (91).
albifrons Sw.	152.	boiei Wagl. 9.
albipes Sundev.	108.	— Temm. ... sp. inc. etc. 21.
albirostris Vi. == melanoleucus.		borealis Vieill. == querulus.
albolarvatus Cass.	87.	brachyrhynchus Sw. 182.
algirus Vaill.	177.	brachyrurus Vieill. Malh. 248.
altivolans Lath. ... sp. spuria 18.		brasiliensis Sw. == chryschlorus.
americanus Sw.	39.	brevirostris R:bch == major.
analis Horsf.	69.	brucei Malh. 190.
andamensis Blyth.	70.	brunneus Eyt. 253.
arator Cuv.	195.	brunneifrons Vig. == auriceps.
arcticus Sw.	40.	buffoni Kuhl, Temm. == melanochl.
assimilis Natt. Malh.	60.	cabanisi Malh. 57.
atratus Blyth.	67.	cabotii Malh. 104.
atricollis Malh.	213.	cactorum 94.
atriventris d'Orb. == Boiei.		cafer Gm. == mexicanus.
atrothorax Less. == varius ♀.		— Vieill. ... sp. inc. etc. 20.
auduboni Trud. cf. P. villosum.		calliaudi Malh. v. post. 188.
— Sw. " "		callonotus Wat. 99.
aurantius L. == bengalensis.		callopterus Lawr. 29.
— Bodd. == philippinarum.		cainpestris Vieill. 214.
auratus L.	201.	campstrodes Mh. == agricola.
— Vieil. == aurulentus.		camtschateensis Mus. H. cf. Kamtschatc. Bp.
auriceps Vig.	89.	canadensis Gm. cf. sub 41.
auricapillus Sw. v. post. 162.		cancellatus Wagl. 51.
aurifrons Wagl.	153.	candidus Wagl. == dominicanus.
— Less. == gerini?		canente Less. 27.
— Bp. == rubriventris Sw.		canena Bp. == canente.
auritus Eyt.	74.	canicapillus Blyth. 84.
aurulentus Ill.	28.	caniceps Nilss. == canus.
— Wagl. == chrysocchl. Vieill.		— Wagl. == capensis Gm.
avokera Temm.	176.	canifrons n. sp. 73.
ayresii De Kay.	201 b.	

canipileus Lafr.	196.	dorsalis Baird.	38.
canus Gm.	181.	dubius Cabot = albifrons.	
capensis Gm. = menstruus.		elliotti Cassin.	185.
— Forst. St. = cardinalis.		— Jerd. = festivus.	
capistratus Natt.	32.	elegans Sw.	160.
capricorni Str.	187.	— Fras. = rivolii.	
cardinalis Gm.	124.	erythrauchen Wgl. = carolinus.	
— Less. = caillonotus.		erythrocephalus L.	140.
carlotta Malh.	222.	erythronotus Vieill.	227.
caroli Malh.	163.	erythropes Mus. Hein.	33.
caroliuus L.	155.	erythropis Vieill. = præc.	
cassinii Malh.	113.	erythropsis Malh. = id.	
cataphorius R:bch.	63.	erythrops Wagl. = id.	
cathpharius Hdgs. = præc.		— Cuv. Mh. = melanotis.	
cayanensis Gm. = punctigula.		erythrophthalmus Licht. = albifrons Sw.	
ceciliæ Malh.	107.	erythropygus M. Hein.	228.
ceylonus Cuv. = erythronotus.		europæus Less. Mh. = tridactylus.	
— Jerd. = carlotta.		exalbidus Gm.	238.
chilensis Garnot	217.	fasciatus Gm. ... Sp. inc. 10.	
chlorio Pall. = canus.		felicie Malh.	61 b.
chloroceph Gm. = flavigula (34).		fernandinæ Vig.	218.
chlorogaster Jerd. = xanthoderus.		festivus Bodd.	223.
chlorolophus Vieill.	169.	flavescens Gm.	232.
chloronotus Cuv. = maculosus.		flavicans Lath. = exalbidus.	
chlorophanes R:bch. Blyth; v. post P. xanthodermum (170).		flavicollis Vi. v. post. 242.	
chloropus Drap. = chlorolophus.		flavifrons Vi.	144.
chlorozostus Wagl.	211.	flavigula Bodd.	34.
chrysochlorus Vieill.	30.	— Mh. Natt. = seqv.	
chrysogenys Vig. = santa cruzi.		flavigularis Sel.	146.
chrysoides Malh.	202.	flavilumbis Sundev.	208 b.
chrysomelas Malh.	209.	flavinucha Gould.	166.
chrysonotus Less.	225.	flavipes Gm. ... Sp. inc. 9.	
— Mh. = puncticollis.		flaviventris Vieill. = ruber.	
chrysurus Sw. Mh.	188: a, b.	— Sw. = santa cruzi.	
cinereicapus R:bch = rupicola.		fokiensis Swinh.	252.
cinnamomeus Gm.	235.	formicivorus Sw. = melanopogon.	
cirris Pall.	66.	fraseri Mh. = loricatus.	
cissa Pall. = major L.		freniger R:bch. v. sub. P. nano.	
citrinus Bodd. = exalbidus.		fuliginosus Licht. = syriacus.	
collaris Vig. = mexicanus.		fuligaster! Drap. = fulvus.	
— Bp. = rubricatus.		fulviscapus Ill. = cardinalis.	
concretus Temm.	26 b.	fulvus Qu. et Gaim.	24.
comatus Licht. = melanoleucus.		fumigatus Lafr.	103.
cordatus Jerd. v. sub. P. canenti.		funebris Val.	25.
coronatus Licht. = flavifrons.		fuscescens Vi. = cardinalis.	
crawfuri J. Gray = leucogaster.		fuscipeunis Sclat.	15.
crissoleucus Malh.		gabonensis Verr.	184.
eristatus Vieill. v. post. 211.		galeatus Natt. Temm.	17.
eruentatus Bodd. = hirundinaceus.		gairdneri Aud.	45.
— Antin. = syriacus.		gerini Temm.	162.
cuvieri Malh. v. sub. P. villosa.		goensis Gm. = festivus.	
cynædus Pall. = mediuss.		goertan Gm.	133 et id. b.
darjilensis Blyth.		gouldii Malh.	55.
delattrii Bp. = scapularis.		gracilis Less. = nuttalli.	
delesserti Mh. v. sub. 219.		gradatus R:bch = lignarius.	
desmursii Mh. = abyssinicus.		grammicus Natt.	241.
— Bp. = sanguinens.		grammithorax Malh.	254 b.
dilutus Blyth. v. post. 224.		grantia Mc. Clell.	136.
dimidiatus Temm. = vittatus.		grateloupeensis Less. = santa cruzi.	
diophrys Steph. = namaquus.		grayi Malh. = pollens sp. 8.	
dominicarus Vieill.	139.	griseus Vieill. = Carolinus.	

griseocephalus Bodd. = menstruus.		kaleensis Swinh.	75.
guatimalensis Hartl. Malh.	6.	katm-schatkensis Bp. Malh.	72.
guayaquilenis Less. = praece.		— Bp. = crissoleucus.	
guerini Malh.	180.	karelini Brandt v. post. 179.	
guineensis Scop. = cardinalis.	247.	kaupii Mh. = uropygialis Baird.	
gularis Jerd.		— Hartl. = lignarius.	
— Wagl. pro mentali T.		khan, Philippi v. post. sp. 63.	
guttatus Licht., Bp. = bennetti.		kingii Gray = lignarius.	
— Spix = punctigula.		kirkii Malh.	106.
gütter R:bach	207.	kirtlandi Malh.	114.
guttulatus Wagl. = punctigula.		kisuki Temm.	80.
gutturalis Val. = pulverulentus.			
gymnophthalmus	82	lafresnayi Malh.	127.
hæmasoma Wagl. = mahrattensis.		larvatus Temm = radiolatus.	
hæmatogaster Tsch.	12.	lathami Wgl. = mexicanus.	
hæmatostigma Natt.	111.	lecontei Jones, Malh. cf. sub. P. pubescen-	
hæmatribon Wagl.	221.	te (44).	
hardwicki Jerd. = nanus.		ledouci Malh. (v. sub. P. minore, 71).	
harrisii Aud.	42.	lepidus M. Hein.	128.
hartlaubi Malh. = sordidus, n:o 26.		lessonii Less. = guatimalensis.	
— id.	125.	leucogaster Reinw. Temm.	19.
hedenborgi Sundev.	93.	leucolæmus Malh.	35.
hemprichi Ehr.	126.	leucomelanus Wgl. Syst. 18 = canadensis.	
hemipodus Sw = bengalensis.		leucomelas Bodd. = id.	
herminieri Less.	149.	leuconotus B:st.	65.
hilari Mus. Hein. v. post. 111.		leucopogon Val. = boiei.	
himayalensis Jard.	59.	leucopterylus R:bch = lineatus.	
hirundinaceus L.	143.	leucorhamphus Licht. = scapularis.	
hirsutus (Vieill.) Wagl.; Mus. Hein. (cf. sp.		leucotis Licht. = querulus.	
36 et 39).		leucurus Pr. Paul	45 d.
hodgei Blyth.	21.	lichtensteinii Wgl. = funebris.	
hodgsonii Jerd. Malh.	20.	lignarius Mol.	49.
— Malh. 1845 = darjilensis.		lineatus L.	14.
hoffmanni Cab.	157.	lineatus Pr. Max. = melanotis.	
homorus Mus. Hein.	54 b.	loricatus R:bch	244.
horsfieldi Wagl. = leucogaster ♂ et guttu-		lucasanus Xanth.	47 b.
ralis ♂.		luciani Malh.	54.
humeralis Wagl. = festivus.		lugubris Natt.	233.
hybridus Baird.	20 b.	— Hartl. = gabonensis.	
hyloscopus Mus. Hein. v. sub. P. villosa.		luridus Nitzsch = brunneus.	
hyperythrus Vig.	90.		
hypopolius Wagl.	159.	macei Cuv.	68.
hypostictus M. Berol. = punctipectus.		mackloti Wgl. = pulverulentus.	
hypoxanthus Blyth = rivolii.		maculatus Vieill. Wagl. = mixtus.	
icterocephalus Lth. = flavigula 34.		maculifrons Spix = affinis Sw.	
icteromelas Vieill.	208.	maculipennis Wgl. = aurulentus.	
imberbis Sundev.	194.	maculosus Val.	183.
immaculatus Sw. v. post. P. menstruus.		macrocephalus Spix = chrysochlorus.	
imperialis Gould.	1.	magellanicus King	3.
insularis Gould.	64.	mahrattensis Lath.	91.
internedia (Tiga) Bl. post. 228.		major L.	53.
ischnorhynchus Wagl. = hirundinaceus.		majoroides Hodgs. = darjilensis.	
isidori Malh. = leucolæmus.		malaccensis Lath. = miniatus.	
jardinei Malh.	43.	malherbei Gray	5.
javanensis Ljungh.	228.	— Mus. Hein. = nigriceps.	
javensis Horsf. = leucogaster.		— Cassin = imberbis.	
jerdoni Malh. = gularis Jerd.		mandarinus Malh.	56.
— Mus. Hein.	20 b.	manillensis Gm. = menstruus.	
jubatus Lafr. = magellanicus.		marthae Audub. v. sub. P. villosa.	
jugularis Blyth. ... sp. inc. 4.		martius L.	22.
jumana Spix	237.	mauritanus Brefim. = numidicus.	
		medianus Sw. = pubescens.	
		medius L.	88.

melanocephalus Natt.	rubrifrons.	
— King.	lignarius.	
melanochlorus Gm.	210.
melanochrysus Hdgs.	bengalensis.
melanogaster Horsf. & Moore	porphyro-
melas.	melas.
melanolemus Mall.	212.
melanoleucus Lath.	4.
melanopogon Licht.	Teinm.	145.
melanopterus Pr. Max.	dominicicanus.
melanotis	16.
-melanotus Blyth	= goensis.
meniscus Malh.	81.
menstruus Scop.	132.
mentalis Temm.	167.
— Cassin (Celeus)	= pholidotus.
meriani Hartl.	sp. inc. etc.	24.
meridionalis Sw.	= pubescens.
meropirostris Wgl.	= hirundinaceus.
mesoleucus Licht.	= pollens.
mesorhynchus M. Hein.	= lincatus Var.
mexicanus Sw.	203.
mexicanoides Lafr.	204.
micropus Blyth	= puncticollis.
miniatius Forst.	171.
minor L.	71.
— Horsf.	= analis
minutus Temm.	130.
— Lath.	= Picumnus sp.
mitchelli Malh.	77.
mixtus Bodd.	50.
modestus Vig.	= funebris.
moluccensis Gm.	cf. sub.	P. nuno.
— Malh.	cf. sub.	85.
— R:bch	= analis.
mulleri Bp.	= pulverulentus.
multifasciatus Malh.	= undatus.
multicolor Gm.	231.
murinus Malh.	119.
— Sundev.	= hedenborgi.
mystaceus Vieill.	= namaquus.
namaquus Licht.	122.
nanus Vig.	83.
nataliae Malh.	= thyroideus.
nattereri Malh.	= icteromelas.
neglectus Wagl.	= erythronotus.
nesiotus Mus. Hein.	= kaleensis.
niger Vieill.	= ruber.
nigriceps Lafr. d'Orb.	120.
nigriguttatus Verr.	Bp.	= gabonensis.
nigroflavus ... sp.	Ine. et Spur.	11.
nipalensis Gr. et Hardw.	= chlorolophus.
nivosus Sw.	= pardinus.
norvegicus Lath.	= canus.
notatus Licht.	191.
nubicus Gm.	192.
nuchalis Wgl.	= bengalensis.
— Baird	98 b.
numidicus Malh.	58.
nuttalli Gamb.	47.
obscurus Gm.	= erythroceph. juv.
— Wagl.	Syst.	90 = menstruus.
pallidus Gm.	= philippinarum.
palalaca Cuv.	Wgl.
pardinus Temm., M. Hein.	164.
parvus Cabot	= nuttalli.
passerinus L. cf. ante sp.	99.	
— Malh.	= tephrodops.
— Wagl.	= olivinus?
pectoralis Lth.; Wgl.	Sp. inc.	1.
— Blyth	= analis
— Malh.	= brunneus.
peralimus Wgl.	= strictus Horsf.
percoccineus Bp.	= robustus.
percussus Temm.	138.
persicus Gm.	sp. inc. et spur.	8.
perspicillatus Malh.	v. post.	199.
peruvianus R:bch	= atricollis.
phaioceps Blyth	= rufinotus.
philippinarum Lth.	220.
philippisii Aud.	Malh.	v. sub.
pholidotus n.	P. villosa.
pileatus L.	245.
pirra Pall.	= minor.
pitius Mol. Gm.	v. post	217 (P. chilensem).
pitiguis Bridges	Gay.	= chilensis.
poicilophilus Temm.	= tristis Horsf.
poicephalus Sw.	= goertian.
poliocephalus Cuv.	Wagl.	= goertan.
pollens Bp.	1845.	8.
— id. Conspl.	= Malherbei.
polygrammus Cab.	154.
polyzonus Valenc.	Malh.
— Temm.	Wagl.	= capistratus.
porphyromelas Boie	135.
portoricensis Daud.	141.
principalis L.	2.
pubescens L.	44.
pucherani Malh.	= gerini.
pulverulentus Temm.	23.
punctatus Less.	= funebris.
— Vieill.	= namaquus ♀.
— Cuv.	Sw.
puncticeps Lafr.	193.
punctarius Malh.	= lignarius.
puncticollis Malh.	226.
punctigula Bodd.	205.
punctigularis Slater, Cat.	= punctigula Bodd.
punctipectus M. Hein.	206.
punctuligerus Wgl.	= punctatus Cuv.
punicus Horsf.	168.
pygmaeus Vig.	78.
pyriceps Hodgs.	= maezi.
pyrrhogaster Malh.	131.
pyrrhotis Hdgs.	134.

querulus Wils.	52.	spilolophus Vig. == haematribon.
quadrimaculatus Miller, ... sp. inc. 2.		sodocephalus Bp. 133 a.
radiolatus Wgl.	151.	squamatus Vig. 173.
rafflesii Vig.	165.	squamigularis 243.
rayeri Less. == boiei Temm.		squamosus Vi., Wagn. == spilogaster.
regius Bp. == guatimalensis.		— Less. == philippinum.
reichenbachi Malh.	236.	strenuus Gould == sultaneus.
— M. Hein. == rubidus.		striatus Gm. 150.
rivolii Boiss.	200.	striaticeps R:bch. == shorei.
robustus Licht.	11.	strictus Horsf. 219 b.
ruber Gm.	97.	stricklandi Malh. 48.
rubescens Vi. == sanguineus.		— Lay. == carlotta.
rubidus n.	101.	striolatus Blyth 174.
rubidicollis Vi. == portoricensis.		— Less. == tephrodops.
rubiginosus Sw. Mh.	197.	subauratus Drap. == aurulentus.
— Eyt. Sw. == porphyromelas.		subcampestris R:bch == agricola.
rubiculus Wgl. == mexicanus.		subelegans Less. == santa cruzi.
rubricatus Licht. == praeced.		— R:bch. == tricolor 158.
— Blyth == semicoronatus.		— Baird, v. post. 158.
rubricollis Gm.	10.	subfusciventer R:bch == uropygialis.
rubrifrons Spix	142.	submexicanus 204.
rubrigularis Sel. == williamsoni.		subrufinus M. Hein. 90 b.
rubriventris Sw. v. post. 158.		sultaneus Hdgs. 219.
— Vi. == flavifrons.		sumptuosus Less. == boici Temm.
rubropygialis Mh. == erythropygius.		superciliaris Temm. 161.
ruficeps Spix et M. Hein. v. post. P. haematoxistigma (111).		syriacus Ehr. 61.
rufinotus Mh.	246.	tenionotus R:bch 116.
rufoviridis Mh. == maculosus.		taneola Gould 179.
rufus Gm.	242.	temminckii Malh. 86.
rupicola Lafr.	216.	tephrodops Wagn. 115.
ruppelii Wagn. == percussus.		terrestris Burch. == arator.
sanguineus Licht.	105.	thibetanus Natt. v. post. 224.
sanguinolentus Sel.	100.	thoracinus Less. == multicolor.
santa cruzi Bp. v. post. 152.		thyroideus Cassin. 95.
scalaris Licht. Wagn.	46.	tiga Horsf. == javanensis.
— Baird, v. post. praece.		tinnunculus Wagn. 230.
scapularis Vig.	14 b.	torquatus Wils. 148.
schoensis Rüpp.	123.	trachelopyrus Malh. 10 b.
scindeanus Hdgs.	60 b.	tricolor Wagn. 158.
scintilliceps Swinh.	79.	— Gm. == erythrocephalus?
sclateri Malh.	7.	tridactylus L. 36.
scotochlorus n.	137.	tridactyla (Tiga) Sw. == tiga.
scutatus Wagn. == multicolor,		tristis Horsf. 254.
sedulus M. Hein.	112.	trisulensis, nomen pro P. mitchelli et plur.
selysii Malh.	110.	sp. aff. adhibitum.
semicinnamomeus R:bch == exalbidus.		turatal Malh. 45 c.
semicoronatus Malh.	76.	undatus L. 243.
semirostris ... sp. spurie 16.		undosus Cuv. v. sub. 39.
semitorquatus Licht. == melanotis.		undulatus Vieill. (—ta St.) sp. dub. n:o 22.
senegalensis Gm. == passerinus.		uralensis Bp. Malh. == cirris.
sericollis Hdgs. == chlorolophus.		uropygialis Baird. 156.
shorei Vig.	229.	— Cab. == yucatanensis.
similis Less. == scapularis.		vagatus Cassin. 46 c.
smaragdinicollis Mh. ... sp. spur. 23.		vagleri Malh. == cancellatus.
smithii Malh.	189.	— Hartl. R:bch == macei.
sonnerati Less. == erythronotus.		vaillantii Malh. == algirus.
sordidus Eyt.	26.	validus Reinw. Temm. 13.
— R:bch. ... sp. inc. 5.		validirostris M. Hein. 85.
speciosus Sel.	206 b.	varius L. 98.
spilogaster Wagn.	121.	variolosus Licht. == benetti.
		variegatus Lath. == mixtus.

<i>variegatus</i> Wagl.	84.	<i>viridis</i> Blyth = <i>scotochlorus</i> .
— Val. = <i>tridactylus</i> .		<i>viridanus</i> Blyth = <i>vittatus</i> .
<i>verreauxi</i> Malh.	240.	<i>vittatus</i> Vieill. 172.
— Bp. = <i>malherbei</i> Gr.		<i>xanthoderus</i> Mh. 170.
<i>vestita</i> Cass. = <i>maculosus</i> .		<i>xantholarynx</i> R:bch 147.
<i>vieilloti</i> Wagl. = <i>querulus</i> .		<i>xanthopygæus</i> Hdgs = <i>striolatus</i> .
<i>vilsoni</i> Malh. = <i>nuttalli</i> .		<i>xanthotenia</i> Wagl. = <i>aurulentus</i> Ill.
<i>villosus</i> L.	41.	<i>yucatanensis</i> Cabot 198.
<i>williamsoni</i> Newb.	96.	
<i>viridis</i> L.	175.	<i>zebra</i> Bodd. = <i>carolinus</i> L.

*Synopsis subgenerum Pici.*Series 1. *Angusticollis.*

Tribus 1; Sectio prior:

Amer. 1. *Campophilus* Gr. (P. *principalis* L.); + *Ipoecrautor* Mus. Hein. (*maganicus*); *Scapanus* M. H. (*melanoleucus*); *Phloeocastes* M. H. (*rubricollis*); *Cnipharchus* M. H. (*haematoxaster*);

As. mer. *Xylolepes* M. H. (*validus*).

Sectio posterior:

Amer. 2. *Ceophloeus* M. H. (*lineatus*); + *Phloeotomus* M. H. (*pileatus*).

Eur. } 3. *Thripoanax* M. H. (*leucogaster*).

As. } 4. *Dryocopus* Boie (*Martius*).

Tr. 2. 5. *Alphonerpes* R:bch (*pulverulentus*).

Tr. 3. 6. *Hemicercus* Sw. Str. (*concretus*).

Tr. 4. 7. *Craugastus* M. H. (*flavigula*).

Series 2. *Securirostres.*

Tribus 5.

I. 8. *Tridactylia* St. (*tridactylus*).

II. III. 9. *Dendrocopos* Koch 1816. Sp. Amer.: *Dryobates* Boie (*pubescens*); *Dictyopipo* M. H. (*scalaris*); *Threnopipo* M. H. (*querulus*); Sp. Eur. As.: *Dendrocopos* Koch (*major*); *Dendrodromas* Kp. (*leuconotus*); *Dendrotypes* M. H. (*macei*); *Xylocopus* M. H. (*minor*); *Baeopipo* M. H. (*semicoronus*).

IV. 10. *Xenocraugus* M. H. (*albolarvatus*).

Tr. 6. Eur. 11. *Dendrocoptes* M. H. (*medius*).

As. 12. *Liopipo* M. H. (*mahratt*), + *Xylurgus* M. H. (*hypertyrus*).

Afr. 13. *Ipophilus* M. H. (*obsoletus*).

Am. 14. *Cladoscopos* M. H. (*varius*), + *Cactocraugus* M. H. (*cactorum*). Tr. 7. 15. *Campias* M. H. (*passerinus* L.), + *Erythronekerpes* R:bch (*sanguineus*); *Phloeonerpes* R:bch (*fumigatus*).

Tr. 8. 16. *Thripias* M. H. (*namaquus*), + *Ipoctonus* Heine (*fulviscapus*).

Tr. 9. 17. *Scolecotheres* R:bch (*goertan*); + *Camponomus* M. H. (*pyrrhogaster*).

Tr. 10. 18. *Lepocestes* M. H. (*pyrrhotis*).

Tr. 11. 19. *Geciniscus* M. H. (*grantia*).

Tr. 12. 20. *Xiphidiopicus* Bp.; corr. *Xiphidiopicus* (percussus).

Series 3. *Ligonirostres.*

Tr. 13. 21. *Leuconerpes* Sw. (*dominicanus*).

Tr. 14. 22. *Melanerpes* Sw. (*erythroceph.*) + *Thripsurus* Sw. (*flavifrons*).

Tr. 15. 23. *Centurus* Sw. (*carolinus*).

Tr. 16. 24. *Stictocraugus* Heine (*pardinus*) + *Cnithotheres* M. H. (*caroli*).

- Tr. 17. 25. *Mesospilus* dicendus (rafflesii)
 Tr. 18. 26. *Chrysophlegma* Gould (flavinucha).
 Tr. 19. 27. *Gecinus* Boie (viridis).
 Tr. 20 b. 28. *Ipagrus* M. H. (chrysurus; nubicus).
 — a. 29. *Campothera* Gr. (brachyrhynchus); + *Ipopatis* M. H. (gabonensis).
 Tr. 21. 30. *Geocolaptes* Burch. (arator Cuv.).
 Tr. 22. 31. *Chlororhynchus* Sw. (canipileus).
 Tr. 23. 32. *Hypoxyanthus* Bp. (rivolii).
 Tr. 24. 33. *Colaptes* Sw. (auratus).
 Tr. 25. 34. *Chrysopitius* Sw. (melanochlora; punctigula).
 Tr. 26. 35. Malherbipecus! Bp.; potius *Pediopipo* (campestris).

Series 4. Nudinares.

- Tr. 27. 36. *Chrysocolaptes* Blyth (sultaneus).
 Tr. 28 a. 37. *Brachypternus* Str. (bengalensis)
 — b. 38. *Chrysonotus* Sw. (javanensis, == tiga).
 Tr. 29 a. 39. *Cerchneopicus* Bp. corr. *Cerchneopipo* (tinnunc).
 — b. 40. *Celeus* Boie (flavescens; rufus).
 Tr. 30 a. 41. *Micropterus* Bl. (badius).
 — b. 42. *Meiglyptes* Sw. (tristis).

Corrigenda et addenda.


- Pag. 1, linea, ab infima, 7ma; adde: Conf. Synopsin Subgenerum, in fine opusculi.
 — 15, lin. notæ ultima, adde: Conf. obs. de *P. auropurpureus* Sw., post sp. 162, *P. gerini*.
 — 27, lin. 15 legas: fascia postica *rubra* picta.
 — 38, *P. selysi*, linea prima legas: luteomicans.
 — — " Maculæ tectricum hujus Pici, in seniore, ut in juniore, triangulares.
 Maculæ externæ remigum majorum, interdum 3 v. 4, sed parvæ.
 — 50, linea suprema, legas: LIGONIROSTRES.
 — 65, lin. ab infima 13 et 14, legas: asser-vatum.
 — 87, n:o 244 lin. 3, legas: Malh. Mem. de Liège.. etc.

CONSPECTUM AVIUM PICINARUM

EDIDIT

CAROLUS J. SUNDEVALL
Custos Musæ Zool. Stockholmensis.

STOCKHOLMÆ 1866.
SAMSON & WALLIN.











3 9088 00336058 3

nhbird QL696 P5S8X
Conspectum avium picinarum /